

清·曾鼎撰

痘疹會通



痘疹會通·解題

清·曾鼎撰。成書於乾隆五十一年（公元一七八六年）。

曾鼎，字亦巒，號香田。江西南城人。

是書爲兒科痘疹著作。此處所錄爲卷四的『痘症藥性宜忌』、『指南賦』、『痘疹合用藥性總論』三論，『總論』中簡述了一百三十餘味痘疹常用藥的性味主治。

今據清·乾隆五十一年（公元一七八六年）忠恕堂刻本影印。

（王味咪）

痘疹會通

卷四

四

痘症藥性宜忌

一發熱狀痘疹寒增寒壯熱身痘疹疼痺痘疹流清涕如
是或服蘇葛湯或參蘇飲內去麥冬半夏恐補早助
火也亦當忌升麻引動肺氣

一泄瀉須分寒熱寒者小便清且多宜理中湯少許
乾薑或參苓白朮散木苓非泄瀉發泡不可用以利

故也恐引水下行則上枯澀不能生發然久瀉亦有津液下行渴者宜審之熱瀉小便赤且少口渴多汗而身大熱宜去桂五苓散加木通乾嘔加薑汁炒川連口渴加麥冬久瀉不止米飲調豆蔻丸

凡用紫草必用糯米以制其冷性使不損胃氣無泄瀉患惟大熱便秘不用糯米

一出痘時真紅赤掀摸過皮軟不得手者此係賊痘過三日變成水泡甚至紫泡黑泡此危症也急少下保元湯大加紫草虫退紅花解之或煎燈草木通湯調六一散利去心經蘊熱而紅紫自退或已成水泡則保元大下四苓利下此千金妙法也

痘疹會通

卷四

藥性忌

五

一痘出必氣勻血行庶出快而無餘症倘時寒涼及勞役瘦弱之人氣滯血凝痘出不快蓄于皮膚之內肌肉之上日久變成紫黑矣凡有此候當按經急與調之和劑使毒隨痘出也如頭面出不快此太陽經也用荊甘羌防天麻湯胸腹出不快此少陽經也用葉本木通升麻紫蘇湯四肢出不快此陽明經也用芍蘇乾葛甘草蓮鬚蔥白湯冬加薑引連進二服痘

出快矣

凡痘初熱時要表虛則痘易出宜疎用蘇葛湯以開其腠理忌參耆以助火既出痘要表實則痘易起漿易回無反變黑陷痒塌之患用保元湯肉桂防風引其上皮膚以固表若漿回之際要表裡皆實無遲回利攻之禍亦保元湯加六麴砂仁陳皮查肉丁香以補中夫保元一湯用之既漿之時則耆多參少以補表重而補中輕也用之結靨之時則參多耆少以補中重而補表輕也且如初時用生耆則以肉桂防風

痘疹會通

卷四

藥性

六

引使上行中用耆則以酒炒托膿結靨使用黃耆則以蜜炒使補中內實如用參必配麥冬桑皮橘紅爲監制以單肺氣使參不撓肺無痰嗽之症如用當歸必酌川芎白芍爲監制使血無泛濫浸淫之害白歸附血氣能圓能尖能光潤能紅活易漿易靨

一痘起漿時卽小便不通切忌用茯苓只可用木通恐其利水使漿不足之故

一痘回至頸切忌黃耆宜用四苓散利之耆乃托出之藥旣回而復托之升降不定毒必內攻而死也

一發熱雖忌生冷然有大熱自汗如水神昏譫語者此心火亢甚又宜用泉水漱口以降心火則痘自出蓋自汗則表已虛切不宜再表恐亡陽故也

一出痘自半歲至十三歲多有虛火可用保元湯自十五六歲至二三十歲多陰虛火實宜四物湯加牛膝菴蓉以養陰黃柏知母以降火切忌參耆以助火矣

一娠婦產後多血虛倘誤參耆反助火邪必發狂燥哭叫又首尾誤食滑石則胎自落如煩燥大熱少與痘疹會通

卷四

葉蓬忌

七

泉水漱口以從其權也

婦人不分胎前產後一見紅紫稠密此熱毒之症胎中又忌寒冷切忌紫草紅花以傷胃氣又忌參耆以補肺氣只可用茜根荔枝圓荇煎酒服之

一痘未腫面先腫者乃純陽無陰之症切忌參耆只用四物加人乳好酒和服此養陰以退陽之氣也

一痘出嘴角發泡者後必作瀉當先利小水以防之

用四苓湯加砂仁六麴

一痘出大熱不退乃血熱毒盛也宜紫草虫退紫色

是血滯宜紅花黑色乃血枯宜蘇木茜根白色乃氣虛宜參耆灰白乃氣滯宜山查見白色當下肉桂紅花又忌桂而退癰又用桂者以其能行血也

指南賦

人參益內甘草和中用黃耆而實腠得蟬退以開肌紅花有活血養血之功生地有涼血行血之効痘若乾紅便宜加入紫草滑肌通竅毒癰堪行熱症賴之而有益虛寒誤用以溏便山查善遏瘡疼能消食積兼理氣滯於補益湯中且解鬱結于透肌湯內輕其痘疹會通

卷四

藥性

八

表而涼其內功在荆翹疏其肌而發其壅妙在蟬木利咽喉而清氣道能發散而善開提功必資于桔梗分清濁而利小便消痘母而去膨脹効莫大乎腹皮川芎引清陽而達表勿缺于未滿之前芍藥斂陰氣以濟陽可多于漿足之後牡丹皮去血中之毒壯熱煩紅爲聖藥地骨皮去氣中之毒毛焦熱甚是良方官桂有鼓動陽氣之能神倦而不振者用之以收實効丁香有贊助元陽之力內虛而不起者得之以奏奇功木香順氣而理脾寒泄瀉湯中必用乾葛療肌

而退胃熱煩渴方內須加白朮茯苓能健胃佐參耆而益氣當歸生地補陰虛君枳殼而潤堅解蘊毒于犀角黃連惟熱甚則前後堪用定心煩于麥冬用之不宜過多有渴症則終始宜加大附子反本回元能理虛寒而收戰慄天花消痰清胃且收肺氣以發聲音白芷疎風痘毒惡之而發散紫蘇疎氣寒邪賴是以驅除羌活有運毒達表之功防風有散邪逐毒之妙僵蚕只利于肌膚消風定痒如神枳殼能平乎胸膈下氣寬中至連開滕定喘以麻黃壅遏憑之而發

痘疹會通

卷四

葉健思

九

散平胃溫中以厚朴腹脹用是以消磨龍骨枯礬權行澁泄猪苓澤瀉暫用安便乾薑溫中氣而止嘔吐是以胃寒而虛瀉則宜用大黃蕩腸胃而潤燥堅是以熱壅而便秘則當加鼠粘清利咽喉透肌解毒升麻升發元陽堪散瘡瘍柴胡解肌安表黃芩黃柏退熱消癰止嗽開痰于浙貝清便降熱于山梔牛中黃化風熱而療顛癇誠扶危救急之能龍腦葉凉心血而起黑陷有撥亂反正之才麝香開竅于毫毛亦能發汗雄黃解毒于臟肺并可消痰辰砂鎮心定志而

有養血涼血之用珍珠透裡入堅而解骨中髓中之熱訶梨勒欬肺氣而澁腸肉豆蔻溫脾胃而止瀉天靈人齒但能發鬆肌肉過用則肉裂皮崩蟬退山甲實可振揚痘毒多施則虛招空發藥味不救于異人取效每存乎常品明此篇思其過半

痘疹合用藥性總論

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味氣味陰陽不同浮沉升降各異辛甘發散爲陽酸苦湧泄爲陰濁之濁者走于五臟清之清者發其腠理清之濁痘疹會通

卷四

藥性

十

者四肢可實濁之清者六腑堪至淡則滌而酸則收辛散可識鹹則軟而苦則泄甘緩須知橫行直達治法不同稍降根升製宜尤異故藥性爲立方之大旨治病之樞機也欲立良方先識藥性開具于后
防風 甘辛微溫風熱盛者必用痘症中要藥也
蘇葉 辛溫初發痘時乾熱無汗者暫用

薄荷 辛溫消風熱清頭面之火

羌活 苦甘溫傷寒門大陽厥陰表裡熱俱用發痘時腰痛必需與獨活全用

藥本。辛溫利頭痛行血滯不宜多用恐其辛散。
荊芥。辛苦溫疏風退上焦之火爲至要治痘發狂
譫語起貫時不宜用。

麻黃。苦甘性溫發熱惡寒者用散寒邪見點後不
用冬令重用麻疹症要藥。

細辛。辛溫開竅止嗽療齒痛散頭面諸風。
生薑。辛溫止嘔和中助陽發表又助參耆。

陳皮。辛苦溫健脾胃溫中化痰理氣退熱俱可用。
圖安。辛溫微毒發痘之要藥也。

痘疹會通

卷四

藥性

十一

觀音柳又名西河柳味辛甘麻疹初發之要藥也

白芷。辛溫去頭痛皮膚之風除身熱瘡痒之痺

升麻。苦辛微寒解熱毒發散瘡癰初熱當用

葛根。甘平寒解肌表熱口乾渴者宜用見點之後

忌之。

柴胡。苦平性寒解肌表熱毒用之以托痘毒務要

酒炒。

前胡。苦微寒無毒傷風咳嗽痰涎者宜用

黃芩。苦寒瀉肺火解肌熱上焦熱者必用

梔子 苦寒涼心腎治衄血散客熱療虛煩務要炒黑用

桔梗 苦辛溫寬胸膈理咳嗽利咽喉爲諸藥舟楫

蘇子 辛溫寬胸下氣止嗽消痰

藿香 辛溫止嘔開胃進食溫中

木香 苦辛溫和胃健脾痘癰散諸滯氣而神

青皮 苦寒破下焦滯氣除熱消食

枳殼 苦酸微寒破滯氣大腸經熱盛結者必用

枳實 苦酸鹹寬胸下氣小腸熱者可用

痘疹會通 卷四 癰

十一

山查 甘溫行氣化痰起痘消食有製麥耆之功

厚朴 苦辛溫消腹脹健胃寬中泄瀉亦用

麥牙 甘溫消食健脾

腹毛 辛微溫消浮腫除腹脹散毒氣

神麴 甘溫開胃進食中焦停滿可用

檳榔 辛甘溫墜滯氣治厚重如神大便閉者暫用

瓜蒌 苦甘無毒潤肺下氣寬胸膈止嗽定喘

丹皮 辛苦寒去脾胃腸中積血

桑皮 甘寒瀉肺定喘下氣寬胸

紫苑 苦溫無毒清理肺氣

橘紅 辛甘微寒無毒

杏仁 苦溫潤肺止嗽潤大腸

冬花 辛溫無毒能開肺清燥

天冬 苦平無毒清肺寧神

麥冬 甘平止虛渴煩燥退肺中伏火及心火其性

亦帶收斂不宜多用初起風火之症忌之

浙貝 辛苦微寒消痰止嗽利心肺除風熱痘症之

書多寫川貝其無考耳

痘疹會通

卷四

養

十三

牛黃 苦寒解心經之毒狂譫宜用

龍胆 苦寒解熱毒利小便散煩熱

牽牛 苦寒無毒用分黑白氣血兩行之藥

地皮 苦平寒治脾蒸之熱

瞿麥 苦寒無毒去濕熱

元參 酸苦微寒消癰毒治頸中痰熱退無根之火

青黛 鹹寒無毒能去肺胃二經實火

川連 苦寒瀉心火厚腸胃解痘中毒止驚悸痘中

血熱必用務要酒炒或人乳炒

犀角、苦酸鹹去心火解熱毒痘血熱者磨用

羚羊角、苦寒清肺肝解熱毒痘紅盛者可用但得

五六日方可亦須磨用、

赤小豆 苦平有小毒除煩清燥

銀花 甘平解諸熱毒痘紅紫毒盛者可用

連翹 苦平退五心煩熱散痘中熱毒

皂角、辛微寒解熱毒用引諸直達瘡所

山豆根、甘寒無毒利咽喉解火毒

牛蒡子 辛溫治頭痛解風熱毒痘紅紫盛者必用

痘疹會通

卷四

毒

十四

地丁草 苦平托毒外出

川貝 辛燥能去心經之痰心經無痰引痰入心不

宜亂用風火之痰俱忌之

半夏 辛溫化痰涎和脾胃止嘔吐俱可用

膽星 苦辛除風痰利胸膈破堅消腫

僵蚕 鹹辛微溫除風熱解毒定痒

蟬蛻、甘溫退風熱解發痘紅紫熱盛者必用七日

之後不宜用、

天麻 辛甘治風熱頭眩癱瘓痺驚癇

勾藤勾、甘微寒無毒風已傳入內經可用

天竹黃、甘寒無毒清火利痰、

石膏、酸辛淡寒降胃火消痰止煩渴、

竹葉、甘寒無毒清胃去實熱、

知母、苦寒滋陰升水散下焦之熱邪入少陰瀉腎

火必須用秋石丹化水拌炒

黃柏、苦寒瀉以補腎降龍雷之火痘症中必與知

母同用能解毒潤色必須用童便浸一日再炒黑

大黃、苦大寒通大腸燥結瀉實火虛寒者必須酒

痘疹會通

卷四

雜

十五

製北方之氣火毒尤甚生用亦可

膽草 苦澁大寒無毒

兒茶 苦寒無毒清胃除積熱

寒水石 辛寒無毒

滑石 味淡大寒利小便解心火之毒熱閉者可下

必須飛過寒冬忌之、

甘草 甘平生瀉火解毒炙健脾和諸藥常用

小生地 苦平寒涼心經之血熱瀉脾胃之濕熱

乳香 辛苦溫調血氣定諸經之痛痘餘毒用

紫草 苦寒能散血解痘毒紅紫熱盛者非此不能
轉退酒蒸用

沒藥 苦辛平破血理氣止痛療癰疽後餘毒用

茜草根 味平去瘀活血痘色焦黑者必用

糯米 甘溫理脾胃之中氣製紫草之微寒

桑虫 大能發痘隨出隨沒者必用

蚯蚓 鹹寒無毒透經絡托毒發引毒盛者宜用

穿山甲 辛微寒解熱毒大能起痘防燥咽喉

芍藥 苦酸微寒赤能破堅積白能伐肝養血消癰

痘疹會通

卷四

藥

十六

毒除腹脹

人參 甘溫止渴生津痘症氣虛頂陷者必用

當歸 辛溫養血質漿時宜用歸尾能行血活血痘

起發時血熱可用泄瀉忌之

黃耆 甘溫實腠理排膿補氣虛起質時氣弱者必

用、

白朮 甘溫健脾消痞止渴補虛熱盛煩渴者忌之

山藥 甘溫補脾質漿時必用

赤芍 苦酸微寒攻血痺止腹痛解熱毒

淫羊 辛溫能起虛寒之痘

麝香。辛溫辟穢氣開竅少用藥內能起痘

鹿茸。甘溫痘色灰白不起用之能起頂貫膿

川芎。辛溫利頭痛扶氣養血宜用

菴絲 辛甘平無毒

鷄冠血 冠頂血最清高屬巽風和白酒漿服起漿

者可用、

黃米。甘溫益真氣和胃氣宜用

大棗 甘溫和中養脾助十二經胃氣

痘疹會通

卷四 藥

七

烏藥 辛溫無毒

鬱金 辛苦寒無毒能開鬱散火

香附 辛微熱開鬱行滯消食助胃

首烏 苦澁溫生者治血熱痒塌製者舒肝養腎

牛膝 苦酸平活血生血引諸藥下行

人牙 淡鹹灰白黑陷火煨一二釐少加麝香大能

起痘

熟地 甘平滋腎水補血益直陰痘前用恐滯氣宜

用生地黃漿時則宜