

活人慈航

百
煎
忠
靈
靈
藥
論
卷
之
一
第
一
回

二十

柴胡^{半斤} 黄芩^{三兩} 半夏^{半升} 芍藥^{三兩} 枳實^{一枚} 大黃^{三兩}
生薑^{五兩} 大棗^{十二枚}

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎温服一升日
三服

黃連湯

黃連^{三兩} 甘草^{三兩} 乾姜^{三兩} 人參^{三兩} 桂枝^{三兩} 半夏^{半升} 大棗^{十二枚}
右七味以水一斗煮取六升去滓温服晝三夜二

黃芩湯

黃芩^{三兩} 甘草^{二兩} 芍藥^{三兩} 大棗^{十二枚}
右四味以水一斗煮取三升去滓温服一升日再服夜一
服

柴胡桂枝湯

柴胡^{四兩} 桂枝^{兩半} 人參^{兩半} 甘草^{三兩} 半夏^{半升} 黃芩^{兩半} 芍藥^{兩半}



大棗 六枚 生姜 兩半

右九味以水七升煮取三升去滓温服一升

理中湯

人參 白朮 甘草 乾姜 各三兩

右四味搗篩蜜和為丸如雞子黃許大以沸湯數合和丸碎研温服之日三服夜二服腹中未熟益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓温服一升日三服

若臍上築者腎氣動也去白朮加桂四兩吐多者去白朮加生姜三兩下多者還用白朮悸者加茯苓二兩渴欲得水者加朮是前成四兩半腹中痛者加人參是前成四兩半寒者用乾姜是前成四兩半腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微自温勿發揭衣被



厚朴生薑半夏甘草人參湯

厚朴半斤 生薑半斤 半夏半斤 甘草二兩 人參二兩

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

乾姜黃芩黃連人參湯

乾姜 黃芩 黃連 人參 各二兩

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

桂枝加大黃湯

桂枝三兩 大黃二兩 芍藥三兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

麻黃附子細辛湯

麻黃二兩 附子一枚 細辛二兩 右三味以水一斗先煮麻黃減

二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

麻黃附子甘草湯



麻黄^{二两} 附子^{一枚} 甘草^{二两} 右三味以水七升先煮麻黄一

二萍去上沫内诸药煮取三升去滓温服一升日三服

吴茱萸汤

吴茱萸^{一斤} 人参^{三两} 生姜^{二两} 大枣^{十二枚}

右四味以水七升煮取二升温服七合日三服

附子汤

附子^{二枚} 茯苓^{二两} 人参^{三两} 白术^{四两} 芍药^{三两}

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

白通汤

葱白^{四茎} 乾姜^{二两} 附子^{一枚}

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

通脉四逆汤

甘草^{二两} 乾姜^{二两} 附子^{一枚}



右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服其脉即出者愈

四逆散

甘草^炙枳实^{水渍炙乾}柴胡芍药

右四味各十分捣筛白饮和服方寸匙日三服

咳者加五味子乾姜各五分并主下利悸者加桂枝五分
小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚炮令折
瀉利下重者先以水五升煮薤白三升煮取三升去滓以
散三方寸匙内汤中煮取一升半分温再服

桃花湯

赤石脂^{一斤半全用}乾姜^{二兩}糯米^升

右三味以水七升煮米令熟去滓温服七合内赤石脂末
方寸匙日三服若一眼愈餘勿服



黃連阿膠湯

黃連^{四兩} 黃芩^{二兩} 芍藥^{二兩} 雞子黃^{二枚} 阿膠^{三兩}

右五味以水六升先煮三物取二升去滓內膠烱盡小冷
內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

豬膚湯

豬膚^{一斤} 右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升

白粉五合熬香和令相得分溫六服

甘草湯

甘草^{二兩} 右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合

日二服

桔梗湯

桔梗^{二兩} 甘草^{二兩} 右二味以水三升煮取一升去滓分溫

再服



半夏散及湯

半夏 桂枝 甘草 各等分

右三味各剉搗篩已合治之白飲和服方寸匙日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散二方寸匙更煮三沸下火令小冷少少嚥之半夏有毒似不當散服

苦酒湯

半夏 五枚 雞子 一枚去黃內上苦酒著雞子殼中

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去滓少少嚥之不差更作三劑

烏梅丸

烏梅 三百枚 細辛 高 乾姜 高 黃連 高 當歸 高 附子 高

蜀椒 高 桂枝 高 人參 高 黃柏 高

右十味異搗篩合治之必苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五



升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下
丸如梧桐子大先食飲服十九日三服稍加至二十九禁
生冷滑物臭食等

當歸四逆湯

當歸^{三兩} 桂枝^{三兩} 芍藥^{三兩} 細辛^{三兩} 通草^{三兩} 甘草^{三兩} 大棗^{二十五枚}
右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

白頭翁湯

白頭翁^{三兩} 黃連^{三兩} 黃柏^{三兩} 秦皮^{三兩}
右四味以水七升煮取三升去滓溫服一升不愈更服一
升

旋覆花代赭石湯

旋覆花^高 人參^高 生姜^高 半夏^{半升} 代赭石^高 甘草^高
大棗^{十五枚} 右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升

温服一升日三服

小建中湯

桂枝三兩芍藥六兩甘草二兩生姜三兩膠飴一升大棗十五枚
右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解
温服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

炙甘草湯

甘草四兩生姜三兩桂枝三兩麥冬半升麻仁半斤大棗十五枚
人參二兩阿膠二兩生地一斤

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內阿
膠烱消盡温服一升日三服一名復脉湯

桂枝新加湯

桂枝二兩芍藥四兩甘草二兩人參三兩生姜四兩大棗十五枚
右六味以水一斗二升微火煮取三升去滓温服如桂枝



法

桂枝甘草湯

桂枝四兩 甘草二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂一斤 禹餘糧一斤

右二味以水六升煮取二升去滓分溫三服

麻黃升麻湯

麻黃二兩半 升麻二兩一分 當歸二兩分 知母六銖 黃芩六銖

姜蕤六銖 石膏六銖 白朮六銖 乾姜六銖 芍藥六銖

天冬六銖 桂枝六銖 茯苓六銖 甘草六銖

右十四味以水一斗先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三升米頃令盡汗出愈

柴胡加龍骨牡蠣湯



柴胡^{四兩} 半夏^{半斤} 石龍骨^{半斤} 人參^{半斤} 大黃^{三兩} 牡蠣^{半斤} 茯苓^{半斤}

鉛丹^{半斤} 桂枝^{半斤} 生薑^{半斤} 大棗^{三枚}

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更煮一
二沸去滓溫服一升

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝^{三兩} 甘草^{二兩} 生薑^{三兩} 牡蠣^{五兩} 龍骨^{四兩} 大棗^{十二枚} 蜀漆^{三兩}

右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三
升去滓溫服

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝^{二兩} 甘草^{二兩} 龍骨^{二兩} 牡蠣^{二兩}

右四味為末以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三
服

甘草乾姜湯



甘草四兩 乾姜三兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓

分温再服

芍藥甘草湯

芍藥四兩 甘草四兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓

分温再服

陽旦湯補

桂枝三錢 芍藥二錢 甘草二錢 黃芩三錢 生姜三片 大棗二枚

右水煎去滓温服無時日二三服本方加乾姜名陰旦湯

牡蠣澤瀉散

牡蠣熬 澤瀉 栝蒌根 蜀漆煨水洗 商陸根熬 海藻

苦苧藤熬 右七味異搗下篩為散更入白中治之白

飲和服方寸匙日三服小便利止後服

竹葉石膏湯



竹葉菝石膏斤半夏半升人參三兩甘草二兩粳米半升麥冬三升
右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去
米溫服一升日三服

燒
視散

婦人中視近隱處取燒作灰
右一味水服方寸匙日三服小便即利陰頭微腫此為愈
矣 婦人病取男子視燒服



傷寒中風

霜降以後雨水以前冬寒冰冽水冰地凍霜雪疊至人有觸犯寒氣謂之傷寒然春應溫而反大寒夏應熱而反大涼秋主涼三時觸患寒涼亦傷寒也但稍輕耳又謂之寒疫蓋少陽相火少陰君火陽明燥金司令非其時而有其氣三陽皆受其邪不獨傷太陽寒水之經也輕者曰感冒重者曰傷寒又重者曰中寒

四時皆有中風惟冬為甚以其寒從風至風從寒來故寒多夾風風亦每夾寒非中不能獨傷太陽經若中寒則直入三陰經風為陽邪故輕寒為陰邪故重也

有傷寒 中風 中寒 二感、感冒

有夾陰 夾食 夾虛 夾氣 夾血 夾痰

經曰脉盛身寒得之傷寒又曰凡傷於寒者則為病熱熱雖



感不死

風為陽邪中人則入太陽衛分為虛邪桂枝湯為主方
寒為陰邪傷人則入太陽榮分為實邪麻黃湯為主方

四時傷寒頭痛骨節疼發熱惡寒無汗脈浮緊者宜羌活湯
以發汗代麻黃湯

四時中風頭痛項強發熱惡風自汗脈浮緩者宜羌活湯去
蒼朮加白朮以解肌代桂枝湯

風寒在表發熱惡寒頭痛項強無汗脈浮者宜敗毒散主之
太陽陽明合病頭痛目痛鼻乾不眠發熱惡寒無汗脈微洪
者宜柴葛解肌湯主之

頭痛身疼發熱惡寒無汗口渴目痛鼻乾不得臥宜升麻葛
根湯主之

少陽陽明合病壯熱惡風頭痛體疼口渴鼻塞咳嗽者宜柴

