


兒科痘疹



兒科痘疹卷下

收靨症治

一班云按痘之收靨落痂全視貫膿何如膿足則收靨落痂自可無虞間有發熱咳嗽等症小症易藥耳若膿不足卽有蘊毒或自內出或自外入後患種種雖有善者亦難爲力矣當見早預圖勿遺害於收落之時致無措手也

收靨上症謂痘有次第收有遲速大率至七八日十三四日之間當收靨之時自上而下次第花靨皮漸鬆緩痘漸蒼老痂結高厚色兼紫黃不喘嗽不寒熱

不脹滿腹疼不咬牙寒戰此時卽咬牙而不寒戰飲食言笑二便皆如常是好候上吉亦有微瀉三五次乃熱毒解也亦吉勿恐

收靨下症謂膿不滿足或少有漿形延綿至將靨之日收靨不由次第痂薄而黑偏貼於皮膚之間如蕎麥皮或喘嗽痰壅或腹脹疼或作驚發搐或口唇乾裂或返睛直視或腫毒傾起或狂言不食或坐臥不安或舌捲腎縮或頭溫足冷或寒戰咬牙凶

收靨中症謂痘至半靨之時雖無內外雜症有留滯熱毒當服清涼解利之藥二三劑以洗滌之斯無後

患

連翹

黃連

錢各一

荊芥穗

分六

山查

麥冬

川芎

升麻

分各七

牛蒡

錢一

甘草

分六

白芍

錢一

蟬退

分六

柴胡

羌活

前胡

獨活

梔仁

分各七

右水煎

有痰

加橘紅貝母喘加桑皮嗽加桔梗五味飽加枳殼

收靨時有水泡多者漿不足也可滲之仍加補藥以

足膿

陳皮

白朮

白茯苓

猪苓

澤瀉

木通

各一

錢

甘草

炙六分

梔仁

山查

錢各一

蒼朮

分七

當歸

人

參

錢各一

黃芪

錢一分

糯米

撮一

右水煎泡收止藥

膿僅半漿者至靨時或生發熱喘嗽之症

當歸

一錢五分

橘紅

七錢

白芍

六錢

連翹

一錢

升麻

山查

七分

川芎

六分

人參

一錢半

麥冬

一錢

牛蒡

一錢五分

黃芪

錢半或三錢

糯米

撮

木香

三分

葱薑水煎膿

色淡白多倍參芪

心法云痘出八九日膿漿充滿顏色蒼臘者上也若

無他症勿藥可也此時漿滿或為寒所薄一時痘俱

紫黑如紫葡萄色不必驚恐急以上好肉桂磨湯或

煎湯服之立見如舊

九日十日之間膿漿足而色蒼臘者必且發熱薰蒸

此回水之候也蓋眞陽運化其水自然消爍而收靨也其元氣不足者則不能及時回水而當靨不靨矣此虛寒症也必身涼而手足冷須大補氣血而助之收結宜用

溫表調中湯

黃芪

蜜炙二錢

白朮

人參

白茯苓

官桂

大川

芎

當歸身

甘草

炙

乾薑

炒各一錢

防風

八分

白芷

丁香

附子

各五分

生薑一片同煎溫服

其有發熱蒸蒸而當靨不靨者毒氣未解也退其熱而痘自收宜清表散毒湯

花粉酒炒八分地骨皮八分麥門冬八分牛蒡連翹當

歸各五分猪苓澤瀉黃芩酒炒木通甘草生各四分

水煎溫服

或用沙糖半酒盃百沸湯調作一碗溫服謂之甘露

回天飲能令熱退痘收但毒盛者恐未必效

調治吐瀉分別寒熱用藥俱同前

當靨時有外潰而膿水淋漓者謂之水靨宜用新瓦

爲末篩令極細用絹袋包撲患處若乾痂堆積不落

內又害膿卽以瓦粉用鴨蛋調敷立收而落

當靨時或忽然腹痛其痛著在中脘此熱毒凝滯瘀

血作痛也用

消毒散血湯

牛蒡

白芷

洗生酒

桃仁

炒去皮尖研碎

大黃

酒炒各錢一

紅花

酒洗沒藥

乳香

俱用燈心同研細煎藥將熟投入各五分

水煎溫服

一服立愈

結痂厚實無他症者不必服藥

如結痂後發熱或煩渴者當辨其虛實寒熱調治發熱壯盛胸腹手足頭面俱熱大便秘澁小便赤澁者餘毒盛也即當解毒大連翹飲主之若解毒遲則痂落後必發癰毒

大連翹飲

連翹

牛蒡

柴胡

去蘆

當歸

赤芍

防風

各八分

木通

車前子

荊芥

黃芩

酒炒

山梔

酒炒

滑石

甘草

蟬退

各五分

生薑一片同煎大便秘者加

酒炒大黃一錢五分

若其發熱稍緩頭熱面不甚熱手心腳心熱手背腳背不熱精神困倦大小便利者虛熱也宜用

補中益氣湯

人參

八分

黃芪

蜜炙一錢

白朮

當歸身

各八分

柴胡

升

麻

川芎

各四分

甘草

炙五分

陳皮

四分

渴者加麥門

冬錢五味子

九粒

生薑一片同煎溫服

妙訣云收靨後身熱表毒未退也升麻湯一劑可愈身不熱而內熱作渴傷食也三仙散滾水服食化渴熱自去收後月餘痂白而作熱手足戰動氣血不足也一時難復全十全大補湯八物湯用一二劑若大小便秘宜清利之四苓散加黃芩梔子酌量加重木通十全大補湯

人參 白朮 茯苓 當歸 生地 川芎 白

芍各五分

甘草

陳皮各三分

官桂二分

水煎服

八珍散

即八物湯

卽十全去陳皮官桂

四苓散

猪苓

木通

各八分

澤瀉

赤苓

各七分

升麻湯

升麻

甘草

葛根

赤芍

等分

薑水煎服

三仙散

山查

神麴

麥芽

等分

爲末少入白糖滾水調

服

落痂症治

一班云落痂上症痂落遲緩其盤高聳其色紅紫相



南京中医药大学图书馆藏书

兼遠視之如一身見痘次第退落其盤四圍有碎小白皮無內外雜症飲食如常吉

落痂下症謂痂薄且黑拘貼不落如蕎麥皮其癢光潤色白全無血痕眼目無神困倦不食二十日以後周身有落有不落者俱凶

痘後有腫毒者任其自發不必攻擊只宜解散慎勿輕補亦勿貼膏藥蓋痘後肉虛貼藥則毒入內也宜服三五劑以解其毒

川芎

七分

當歸

赤芍

生地

甘草

黃連

黃

栝

各一錢

防風

八分

金銀花

二錢

天花粉

連翹

各一錢

羌

活 柴胡

各七分

荊芥

六分

皂角針

一錢

水煎痛加乳

香沒藥各七分不見火腿腫加牛膝防已各一錢

痘後瘡爛有坑坎者取古牆上螺螄燒存性爲細末

摻之

若痘盤色白此膿未足血色不走皮用白芍一兩爲細末早晚各一錢酒湯任下

心法云痂落還元後或痂落一半後忽然遍身大熱者餘毒欲發癰也或手足四肢頭項胸背有一二處熱更甚者卽癰之所在也此在膿漿不滿而結痂浮薄者速收速落者多有之急宜用前大連翹飲以退



其熱大便秘者加酒炒大黃微利之如熱不退須連服幾劑必須熱退身涼癰毒方可內消

此時又有忽然頭頂大痛者餘毒上攻也或因多服熱藥所致若不急治其毒必注於兩目而目病大作矣宜用大連翹飲去木通車前滑石加升麻桔梗各六分川芎薄荷各四分服數劑以解上攻之毒庶可免目患

大連翹飲

連翹

牛旁子

柴胡

去蘆

當歸

赤芍

防風

各八

分

木通

車前子

荊芥


黃芩

酒炒

山梔子

酒炒

滑



石漂甘草

蟬退去泥各五分

生薑一片便秘加酒

炒大黃一錢五分

痲落後有精神困倦飲食減少胸腹頭頂手足心發熱而煩渴者內虛也仍用補中益氣湯主之

補中益氣湯

人參八分黃芪蜜炙一錢

白朮

歸身各八分

柴胡

升麻

川芎

各四分

炙甘草

五分陳皮

四分

渴者加麥冬一錢

五味子九粒

生薑一片水煎溫服

或有雖不發熱而倦怠嗜臥不思飲食或手足冷或津液少而渴或癥白不紅皆內虛之候也亦宜用補



中醫藥大學圖書館藏

中益氣湯調治不然恐生他症

痘毒發於肌膚而血氣不能悉運化以成膿結痂則有鬱熱不散赤腫而成癰者其發於未收以前者少而發於既收以後者多未收以前必膿漿少而薄者有之若膿漿滿者無有也既收以後必結痂浮薄而速結速落者有之若結痂厚實而緩結緩落者無有也此毒氣發泄盡與不盡之明驗也又有不虛而服補劑不寒而服熱劑以致發癰者醫之悞也凡此俱以前大連翹飲主之但當其初發熱發腫時內外夾攻急消散之爲上至於成膿則幼小之兒多難堪而

在頭項胸腹腰背者甚險也慎之慎之外治塗以三

豆漿

黑豆 萊豆 赤小豆 各用一合以醋浸脹搗

研濃漿時時以鵝翎刷之紅腫退去其效如神

又方用赤小豆爲細末清水調敷乾卽易之

痘瘡原多潰爛收結後或手足等處仍作熱臭爛膿
水不止搽以生肌散

地骨皮

黃連

炒

黃栢

炒

五倍子

生甘草

各等分爲細末乾搽之卽熱退結痂而愈其有仍
作熱作膿而不卽愈者內毒未淨也仍用大連翹