

雜病篇

積聚

浮腫

脹滿

消渴

黃疸

東醫寶鑑

卷六  
下上



東醫寶鑑雜病篇卷六上

東醫勤負亮扈

聖功臣崇祿大夫陽平君

臣許浚奉

教撰

積聚

積聚之因

靈樞曰喜怒不節則傷臟臟傷則虛風雨襲虛則病起於上畱着於脉稽畱不去息而成

積。着於陽明之經則挾臍而居飽食則益大飢則益小。着於緩筋也以陽明之積飽食則痛飢則安。着於腸胃之膜原痛而外連於緩筋飽食則安飢則痛。着於齊筋在腸後者飢則積見飽則積不見按之不得。清濕襲虛則病起於下積之始生得寒乃生厥乃成積厥氣生足惋足惋生脛寒脛寒則血脉凝澁血脉凝澁則寒氣上入於腸胃入於腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚



不得散日以成積△卒然多飲食則脹滿起居不  
節用力過度則陽絡脉傷陽絡傷則血外溢陰絡  
傷則血內溢血內溢則後血下膿也腸胃之絡傷  
則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合  
凝聚不得散而積成矣△帝曰人之善病腸中積  
聚者何以候之少俞答曰皮膚薄而不澤肉不堅  
而淖澤如此則腸胃惡惡則邪氣畱止積聚乃成  
腸胃之間寒溫不次邪氣稍至蓄積畱止大聚乃  
起△內經曰寒氣客於小腸膜原之間絡血之中  
血澁不得注於大經血氣稽畱不得行故宿昔而  
成積

矣

## 論五積六聚

病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚

者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所  
積名曰積氣之所聚名曰聚積者五臟所生聚者  
六腑所成積者陰氣也其始發有常處其痛不離

其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所畱止其痛無常處故以是別知積聚也  
經△病有積有聚有滯氣何謂也師曰積者臟病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移爲可治滯氣者脇下痛按之則愈復發爲滯氣  
仲△肝之積名曰肥氣在左脇下如覆孟有頭足久不愈令人發咳逆脇痛痠連歲不已○心之積名曰伏梁  
加梁之橫起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心△脾之積名曰痞氣臍右稍在胃脘覆大如盤孟作久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚△肺之積名曰息賁  
喘積上在右脇下覆大如孟久不已令人洒淅寒熱喘咳發肺癰△腎之積名曰奔豚  
塔下無鱗也發於小腹上至心下若脉狀或下或上無時久不已令人喘逆骨瘦少氣  
繼△肝積面青脉弦而長細作定在左脇下△心積面赤脉數而實定在心



下△脾積面黃脉大而虛而難沉定在中脘△肺積面白脉數而浮定在右脇下△腎積面黑脉寸

口大實而難沉

定在小腹

# 伏梁有二證

帝曰病有小腹盛上下左右皆有根此為何病可治否岐伯曰病名曰伏梁裹大膿

血居腸胃之外不可治治之無功按之致死△帝

曰人有身體髀股胫皆腫環臍而痛是為何病岐

伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而着於

盲膜之原在臍下故環臍而痛不可動之動之為

水尿酸之病此二病

同名而實異也

經內

# 脉法

鬱脉多沉伏或結或促或代軀△鬱脉沉瀦積脉

弦堅○病在右脇有積氣得肺脉結結甚則積

甚結微則積微肺脉雖不見右手脉當沉伏△  
心肺有積其脉當喘數肝有積其脉弦長脾腎有



積其脉皆大綱△脉弦緊爲積脉弦緊而微細者  
癥也夫癥瘕積聚之脉皆弦緊在心下卽寸弦緊  
在胃脘卽關弦緊在臍下卽尺弦緊△內有積不  
見脉難治見一脉相應爲易治△診積聚其脉堅  
強惡者生虛弱者死○脉弦而伏者腹中有癥不  
可轉也必死不治纏○五臟爲積六腑爲聚積在  
本位聚無定處駛緊浮牢小而沉實或結或伏爲  
聚爲積實強者生沉小者死○△五臟屬陰沉伏  
附骨肝弦心芤腎沉急滑脾實且長肺浮喘卒○  
六聚結沉痼則浮結△又有癥瘕其脉多弦弦急  
癥疾弦細癥堅△沉重中散食成癖瘕左轉沉重  
氣癥胃前若是肉癥右轉橫旋△積聚癥瘕緊則  
痛纏虛弱者死實強可痊○腹中有積脉忌虛  
弱○△診婦人疝瘕積聚之脉弦急者生虛弱小  
者死

經脉

# 六鬱爲積聚癥瘕痞之六

氣血冲和百病不生一有

不散也

○熱鬱而成痰痰鬱而成痞血鬱而成

癥食鬱而成痞滿此必然之理也○又氣鬱而濕

滯濕滯而成熱熱鬱而成痰痰滯而血不行血滯

而食不消化而遂成痞塊此六者相因而爲病也

軀○鬱者積聚而不得發越也當升者不得升當

降者不得降當變化者不得變化也此爲傳化失

常六鬱之病見矣○一曰氣鬱二曰濕鬱三曰

熱鬱四曰痰鬱五曰血鬱六曰食鬱此六鬱也六

鬱不言風寒者風寒鬱則爲熱故也○治鬱之

法順氣爲先降火化痰消積分多少而治蒼木蕪

芎總解諸鬱○內經曰木鬱達之火鬱發之土

鬱奪之金鬱泄之水鬱折之張子和曰木鬱達之

謂吐之令其條達也火鬱發之謂汗之令其疎散

也土鬱奪之謂下之令無壅碍也金鬱泄之謂滲

也

泄解表利小便也水鬱折之謂抑之制其衝逆也此治五鬱之大要耳

九麩麩保和丸  
加味麩麩丸

### 六鬱湯

通治六鬱香附子二錢川芎蒼朮各一錢半陳皮半夏製各一錢赤茯苓梔子仁各七分

縮砂甘草各五分右剉作一貼薑三水煎服

氣鬱加木香檳榔烏藥紫蘇葉○濕鬱加白朮羌

活防已○熱鬱加黃連連翹○痰鬱加南星瓜蒌

仁海粉○血鬱加桃仁牡丹皮韭汁○食鬱加山

楂子神麩

麥芽

### 六鬱湯

開諸鬱火便香附蒼朮神麩梔子連翹陳皮川芎赤茯苓貝母枳殼紫蘇葉各一錢甘草

五分左右剉各一貼

薑三片水煎服





麩麩丸

解諸鬱蒼术便香附川芎神麩炒梔子炒各等分右為末水和丸如菜豆大溫水下七丸

十九丸

○麩麩

麩

麩丸二名芎术丸凡願欲不

遂如寡婦僧道之類名利不遂或先富後貧或久

病不愈者皆

宜服此門

麩麩保和丸

開鬱行氣消積散熱白术三兩山楂肉二兩蒼术川芎神麩炒便香附陳皮半

夏白茯苓枳實黃連酒炒當歸酒洗各一兩梔子

炒連翹蘿菴子炒木香各五錢右為末薑汁泡蒸

餅和丸梧桐子大

薑湯下五十丸

醫

加味麩麩丸

解諸鬱開胃膈進飲食蒼术泔浸薑汁炒蕪芎便香附神麩炒梔子炒各四兩

陳皮去白白术炒黃芩炒各一兩半山查肉蒸二

兩右為末稀糊和丸梧桐子大白湯下五六十九丸

醫



氣鬱

胃滿脇痛脉沉澁宜用香附蕪芎蒼朮門○宜服木香調氣散解鬱調胃湯麩麴丸○二陳湯煎水

吞下交感丹

方見神門

濕鬱

周身關節走痛首如物蒙足重遇陰寒便發脉沉濡宜用蒼朮川芎白芷赤茯苓門○宜服滲濕湯

散方觀平胃

散方觀平胃

熱鬱

目蒙口乾舌燥小便赤濁脉沉數宜用青黛香附蒼朮川芎梔子門○宜服升陽散火湯火鬱湯方

散方觀平胃

痰鬱

胃滿動則喘急起卧怠惰寸脉沉滑宜用海石香附子瓜蒌仁南星門○宜服瓜蒌枳殼湯升發二

湯



血鬱

四肢無力能食小便淋大便紅脉沉芤澁宜用桃  
仁紅花青黛川芎香附子凡○宜服生韭飲順氣

九當歸

活血湯

食鬱

噫酸惡食黃疸鼓脹痞塊脉氣口緊盛宜用蒼朮  
香附山查子神麴鍼砂醋炒凡○宜服香砂平胃

散散

鬱湯

木香調氣散

治氣鬱烏藥香附枳殼青皮陳皮厚朴  
蕪芎蒼朮各一錢木香縮砂各五分桂

皮甘草各三分右剉作

一貼薑三片水煎服翻

解鬱調胃湯

治氣分之火壅遏於中時作刺痛皆由  
怒憂思慮勞心所致也梔子鹽水炒當

歸酒洗各一錢二分白朮陳皮白茯苓各一錢赤  
芍藥酒浸生乾地黃酒洗薑汁炒香附米各八分



神麴炒麥芽炒各七分川芎六分桃仁生甘  
草各四分右剉作一貼薑三片水煎服剉

### 瓜蘊枳殼湯

治痰鬱瓜蘊仁枳實桔梗川芎蒼朮香  
附杏仁片苓酒炒貝母炒陳皮各一錢

縮砂木香各五分甘草三分右剉  
作一貼水煎入竹瀝薑汁調服春

### 升發二陳湯

治痰鬱半夏二錢陳皮蕪芎赤茯苓各  
一錢半柴胡防風升麻甘草各一錢左

剉作一貼入薑  
三片煎服門

### 生韭飲

治血鬱胃脘有瘀血作痛生桃仁七箇  
連皮細嚼以生韭汁一盞送下即效剉

### 順氣丸

治血鬱香附子八兩以童便浸  
曬乾為末以粟米糊和丸服剉

### 當歸活血湯

治血鬱當歸赤芍藥川芎桃仁各一錢  
牡丹皮香附子烏藥枳殼青皮各八分



紅花五分桂皮乾薑炮甘草各三分  
分右剉作一貼入薑三水煎服

### 香附平胃散

治食鬱蒼朮厚朴陳皮便香附各一錢  
山查肉縮砂枳殼麥芽神麴乾薑木香

各五分甘草炙三分右剉作一貼  
入薑三蘿菹子炒研一撮煎服

### 散薑湯

治食鬱陳皮赤茯苓各一錢半蒼朮白芍藥  
川芎枳各一錢二分枳殼香附各一錢甘

草五分右剉作一貼入薑三煎服  
散則上焦行下脘通水穀之陰自滋沛身中之陰

氣自生

矣

### 痞塊積聚所屬部分

凡痞塊積聚在中為痰飲△在右  
為食積△在左為血積△夫左

為血塊右為食積中為痰飲此言誠然夫左關肝  
膽之位主藏血液右關脾胃之位主藏飲食中間



則爲水穀出入之道路所以左爲血塊右爲食積中爲痰飲其理昭然

# 痞塊證治

塊是有形之物氣不能成塊乃痰與食積死血也宜用化塊丸

俱宜二陳湯加補氣行氣藥先須斷厚味。治塊當降火消食積。痢痰行死血塊去後須大補之。研。凡婦人有塊多屬是血。痞塊一名瘕瘕其不能移動者是瘕塊也或有或無或上或下或左或右者是瘕塊也俱用潰堅湯丸爲主。下有塊宜當歸龍薈丸。加桃仁薑黃各一兩。蜜丸服之。驚氣成塊者妙應丹。麝加穿山甲炒鱉甲燒各三錢。玄胡索蓬朮各四錢。每服五七十丸以利爲度。痞塊宜用連蘿丸消塊丸。加味柴平湯消積保中丸開懷散柴香散保和丸。化痞丹兼用膏藥外貼之。凡腹中有塊不問積聚癥瘕俱爲惡候切勿視爲尋常若脹滿已成

胃腹鼓急雖倉扁復生亦莫能救其萬一也傳

化塊丸

治痞塊及血塊海粉酒煮三稜蓬朮並醋煮紅花桃仁五靈脂香附子各一兩石礮五錢

右為末醋糊和丸梧子大白朮湯下三五十丸心

連蘿丸

治食積死血痰飲成塊在兩脇作痛雷鳴嘈雜眩暈黃連一兩半取一半以吳茱萸五錢

同炒去茱萸一半以益智五錢同炒去益智白芥子蘿菔子並炒各一兩半梔子川芎三稜蓬朮桃

仁香附子山查肉神麴各一兩青皮五錢右為末蒸餅和丸梧子大白湯吞下五六十九丸門一名

白芥丸門今名消積丸裕

消塊丸

治痞塊癥瘕大黃四兩硝石三兩人參甘草各一兩半右為末陳醋三升置瓷器內先納



大黃煎不住手攪使微沸盡一升下餘藥末熬至可丸則丸如梧子大米飲下三十丸當利如鷄肝

惡物一。

名消石丸一。

### 加味柴平湯

治積塊有熱柴胡黃芩半夏蒼朮厚朴陳皮山楂肉青皮枳殼神麴三稜蓬朮

各七分甘草五分右剉作

一貼入薑三棗二煎服一。

### 消積保中丸

散痞除塊白朮土炒三兩陳皮去白二兩半夏白茯苓香附醋炒蘿菔子炒白

芥子炒神麴炒黃連薑汁炒梔子薑汁炒各一兩

檳榔七錢蓬朮三稜並醋炒各八錢麥芽炒六錢

乾漆炒五錢青皮香油炒縮砂炒各四錢木香阿

魏各三錢右爲末以薑汁酒糊和丸梧子大白湯

下八十

丸醫鑑





開懷散

治心下積塊痞悶或發熱柴胡草豆蔻各一錢三稜蓬朮並醋炒青皮陳皮半夏白茯苓

香附子檳榔枳實紅花甘草各七分右剉作一貼薑三煎服

柴香散

治心腹有氣一塊畧通或臃脹寒熱枳實地骨皮三稜蓬朮各一錢柴胡黃芩各七分

芍藥厚朴香薷黃連玄胡索各五分甘草三分右剉作一貼水煎服

保和丸

治一切飲食所傷及積聚痞塊久服自消白朮五兩陳皮半夏茯苓神麴山楂肉各三兩

連翹香附子酒炒厚朴羅菡子炒各二兩枳實麥芽黃連酒炒黃芩酒炒各一兩右末薑汁糊和丸

梧子大清茶下五七十九

化痞丹

消積塊專攻之劑大黃四兩醋浸七日日晒夜露又七日川山甲土炒二兩木鱉子去油



北京中医药大学图书馆版权所有