

小便不利

小便自利

小便數

遺溺

噫氣

噦

瘧狀

舌胎

杜清碧驗證舌法

動氣

漱水不欲嚥

衄

吐血

便膿血

畜血

腹中雷鳴

蹇

四肢拘急

瘰癧

風濕相搏

奔豚

腫

身痒

除中

下重

身熱惡寒身寒惡熱

表熱裏寒表寒裏熱

熱多寒少寒多熱少

發斑

狐惑

百合病

兩感

準繩寒科

準繩寒科六

傷寒證治準繩帙之六

金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

小便不利

小便難

成小便不利有數種被下而小便不利者津液耗於內也因汗而小便不利者津液亡於外也發黃與痞及夫熱病小便不利者熱鬱所致風濕相搏與夫陽明風中其小便不利寒邪所乘其小便難者亦多由汗下而然宜詳辨之

太陽傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯去麻黃

加茯苓

方見

太陽病大發汗後胃乾煩躁不得眠欲

飲水小便不利脉浮者五苓散不浮者猪苓湯本以

下之心下痞與瀉心湯痞不解渴而口燥煩小便不利

者五苓散服桂枝湯或汗或下之仍頭項強痛翁翁

發熱無汗心滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白

朮湯太陽病飲水多必心下悸小便少者茯苓甘草

湯

方見

若兼身黃而小腹鞭脉沉結者茵陳湯

方見

若表未解反下之不結胸但頭汗出小便不利者必

發黃亦茵陳湯

梔子柴皮湯

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

陽明病小便不利若中寒不能食手足澀然汗出大

便初鞭後溏者此欲作固瘕 若能食大便自調其人

骨節疼翁翁如有熱狀奄然發狂澀然汗出而解者此

水不勝穀氣與汗共併脉緊則愈 或無汗心中懊憹

或被火額上微汗出或頭汗出身無汗劑頸而還渴引

水漿皆欲發黃之候 若脉浮發熱渴欲飲水小便不

利者猪苓湯主之 此浮字誤也活人云脉浮者五苓散

脫一不字也按太陽篇內五苓散乃猪苓澤瀉茯苓三

味中加桂白朮也陽明篇內猪苓湯乃猪苓澤瀉茯苓

二味中加阿膠滑石也桂與白朮味甘辛為陽主外阿

膠滑石味甘寒為陰主內南陽之言亦可謂不失仲景

文之有闕也更詳太陽證固當脈浮而陽明爲表之裏故其脈不曰浮而曰長蓋長者不浮不沉之中脈也成氏直以脈浮釋之而朱氏却以脈沉言之胥失之矣若曰脈浮者五苓散不浮者猪苓湯則得仲景之意矣又詳少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯一條雖不言脈沉然少陰之脈必沉也豈活人以少陰對太陽一證而言與以此病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯

湯 得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至

四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後必澹須小便

利尿定鞭乃可用大承氣攻之

少陽傷寒五六日中風往來寒熱胸脇痛不欲食心煩

喜嘔或心下悸小便不利者小柴胡湯 傷寒五六日
已汗復下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗心
煩往來寒熱爲未解柴胡桂薑湯 傷寒八九日下之
胸滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側柴胡加龍骨
牡蠣湯

少陰小便不利而大便自利腹痛爲少陰病 兼四肢
沉重有水氣者真武湯 兼便膿血者萎花湯 兼四
逆者四逆散加茯苓

厥陰傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈
前部爲小便小便不利脉浮者五苓散不浮者猪苓湯

小便不利關節疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫者屬風濕宜甘草附子湯方見身痛若脉沉緩大便反快者屬濕痺活人用五苓散方見渴

○附

活陰證小便不利手足厥冷脉微細者不宜服利小便冷滑藥但服返陰丹并取臍下石門穴灸之方論見陰毒

集傷寒小便不通取陰谷 陰陵泉

吳凡傷寒小便不通刺任脉二穴在臍下一寸用長針入八分又次支溝二穴在手腕後三寸兩骨之間陷中針入二分凡傷寒小便不利當分六經治之太陰少陰

詳見本條太陰腹滿自利小便不利無熱脉沉者理中湯合五苓散更加厚朴木香分利其小便而大便自止厥陰寒閉厥冷脉伏囊縮入腹小便不利宜四逆湯通草茯苓或灸氣海石門穴或以蔥熨法治之若陰虛火動小便赤澀不利者加木通生地知母黃蘗凡內熱盛大便不通小便赤澀不利者八正散治之凡不渴小便不利者熱在血分也宜知母黃蘗生地之類夫膀胱爲津液之府氣化而能出也若汗多者津液外泄小便因少不可利之恐重亡津液待汗止小便自行又小便自利不可妄利之恐引熱入膀胱則變畜血又爲害也

汗後小便難

小便難汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風

小便難四肢難屈伸宜桂枝附子湯方論見若太陽

證中風以火劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身黃陽

盛陰虛欲衄小便難也方論見若少陰以火劫汗者

則欬而不利譫語小便難也論見

下後小便難

下後小便難有二若脉遲浮弱惡風寒下之者則脇滿

身黃項強小便難也見脇痛若陽明胃實發熱惡寒脉

浮緊下之者則腹滿小便難也論見

脇痛身黃小便難

脇痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若

下後不食項强者忌柴胡論見

難

脇痛

下後不食項强者忌柴胡

趙傷寒小便難仲景論有發汗漏不止桂枝加附子湯者有陽明中風或脈弦浮大而潮熱噦者或脈浮而緊誤下而成腹滿者又有陽明脈浮遲飽則微煩頭眩者活人問中當以傳經邪熱與漏風亡陽分作兩條其桂枝加附子湯證乃亡陽經虛所致豈得均謂之陰虛陽湊爲有熱耶要當以小柴胡證及誤下證穀疸證次於陽湊傳邪之下却別出一條云外有汗多亡陽津液不足亦有小便難者還以桂枝加附子湯證屬之

十戰餘風之
 升多古
 節殊自
 隨之
 兩
 東
 而
 德
 出

小便自利

小便數

成小便自利有在表者有在裏者有熱而利者有寒而利者六經俱有之證難以槩治宜考經條分之可也小便數者三陽有在表者有在裏者三陰並無小便數之證宜詳察之

太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂以熱在下焦小腹當鞭滿小便自利者下血乃愈抵當湯 太陽病身黃脉沉結小腹鞭小便自利其人如狂血證也抵當湯 傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當丸 傷寒

十三日不解過經譫語小便利而大便亦下利脉反和

調胃承氣證

詳論語

太陽中風火劫汗後發黃欲衄小

便難頭汗出腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讖語

甚者至噦捻衣摸牀小便利者可治

詳論語

太陽病小

便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急小便

不利甘草茯苓湯

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩

不能轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯若其

人小便自利去桂枝加白朮湯

傷寒發熱惡寒大渴

欲飲水其腹必滿自汗小便利為欲解此肝乘肺名曰

橫刺期門

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必

苦頭痛

詳頭痛

得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁

心下鞭以小承氣微和之不大便六七日小便少者雖

不能食但初鞭後溏未可攻小便利大承氣湯 傷寒

脉浮而緩手足自温係在太陰當發身黃若小便自利

不能發黃至七八日大便鞭為陽明病也大承氣湯

陽明病自汗更發汗小便自利為津液內竭屎雖鞭不

可攻之宜蜜煎導而通之猪膽汁或土瓜根皆可為導

太陰傷寒脉浮而緩手足自温係在太陰當發黃小便

自利不發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止

按以上數條皆以小便自利為病蓋以驗病之下與
 不當下也若小便不利而少腹鞭者尿也當滲泄之
 若小便自利而少腹鞭者非血則糞也當通利之且
 病之發黃與不發黃及病之成與不成皆可於此而
 驗之焉

少陰病二三日至四五日腹滿小便不利四肢沉重疼

痛自下利者為有水氣或小便利真武湯詳下既吐

且利小便復利而大汗下利清穀內寒外熱脈微欲絕

者四逆湯

厥陰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小

便利色白者此熱除也欲得食爲病愈

小便數傷寒脉浮自汗小便數心煩微惡寒脚攣急者

慎不可行桂枝湯

甘草乾薑湯芍藥甘草湯

趙太陽病自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡寒脚

攣急若小便數者慎不可行桂枝也宜與甘草乾薑

湯芍藥甘草湯此虛寒所致與上文客熱等證全不

相合又多四肢拘急難以屈伸八字即係前篇小便

難之證今却添入於此問小便數之下何耶又云傷

寒脉浮便數若胃中不和譫語者少與調胃承氣湯

盖仲景論中此論專主胃氣不和譫語未嘗兼治脉