

1986年第2期

醫學文選

實用新藥集

53

· 廣西醫學科學情報研究所

目 录

一、抗微生物药物

头孢哌酮钠	(1)
羟氨苄头孢菌素	(1)
羟苄四唑头孢菌素 (头孢羟唑)	(1)
吡硫头孢菌素钠 (头孢吡硫钠)	(2)
噻吩甲氧头孢菌素	(2)
呋后头孢菌素	(3)
头孢氨苄胶囊	(3)
复方头孢氨苄片	(4)
头孢孟多钠 (甲酰苄四唑头孢菌素钠)	(4)
注射用氧哌嗪青霉素钠	(5)
羧苄青霉素钠 (羧苄青霉素苄满酯钠)	(5)
缩酮氨苄青霉素钾 (海他西林)	(5)
羧噻吩青霉素钠 (的卡西林)	(6)
氨基青霉素钠	(6)
异丁基哌嗪力复霉素	(6)
威他霉素	(6)
丁胺卡那霉素	(7)
西梭霉素 (紫苏霉素)	(7)
庆大霉素珠链	(7)
美西林	(8)
麦迪霉素片	(8)
乙酰螺旋霉素	(8)
竹桃霉素	(9)
硬脂酸红霉素片	(9)
交沙霉素	(9)
益康唑 (氯苯咪唑硝酸盐)	(9)
制霉菌素片	(10)
硫酸核糖霉素	(10)
磷霉素钙	(10)

磷霉素	(11)
甲氧苄氨嘧啶	(11)
小儿复方新诺明干糖浆	(11)
增效联磺片	(12)
复方磺胺甲基异恶唑注射液	(12)
吡哌酸	(12)
盐酸乙胺丁醇片	(12)
卷曲霉素	(12)
异丁哌力复霉素 (利福定)	(13)
抗结核片	(13)
复方抗结核片	(13)
无环鸟苷	(14)
三氮唑核苷 (病毒唑)	(14)
抗病毒注射液	(14)
小儿流感糖浆	(14)
呋喃妥因栓	(15)
苦木注射液	(15)
炎见宁糖衣片	(15)
炎肿化毒片	(15)
消炎生肌膏	(15)
了哥王	(15)

二、抗寄生虫药物

复方硝唑片	(16)
吡喹酮	(16)
咪唑酸酯 (751)	(16)
甲唑醇	(17)
盐酸左旋咪唑肠溶片 (肠虫净片)	(17)
间酚嘧啶	(17)
枸橼酸哌嗪糖浆	(17)
双羟萘酸噻嘧啶片 (痢病痊片)	(18)

三、抗肿瘤药物和免疫增强剂

注射用更生霉素	(18)
嘧啶亚硝脒	(19)
猪苓多糖	(19)
复方氟尿嘧啶干糖浆	(19)
氟脲脱氧核苷	(20)
复方氟脲嘧啶—多相脂质体注射液	(20)
卫康醇(1.2:5.6—二去水卫矛醇)	(20)
羟基胍(硫酸羟胍)	(21)
三尖杉酯碱	(21)
溴乙酰乙烷雌酚(HL 286)	(21)
足叶乙甙	(21)
甲基斑蝥胺	(22)
双呋喃氟脲嘧啶(FD—I)	(22)
宣乌	(22)
野艾	(22)
喃氟啶	(23)
胸腺素	(23)
去甲斑蝥素	(23)
鸦胆子乳注射液	(23)
香薷油	(24)
华蟾素注射液	(24)
葫芦素片	(24)
银耳孢糖	(24)
核葵注射液	(24)
复方木鸡冲剂	(25)
平消片	(25)
莲花片	(25)
鳖甲煎丸	(25)
溶链菌制剂	(26)
灵菌素	(26)
伤寒杆菌脂多糖	(27)
胎盘脂多糖	(27)
云芝多糖K	(27)
白山云芝多糖	(27)
异丙肌苷	(28)
硫唑嘌呤(依木兰)	(28)

苯丁酸氮介	(28)
青霉胺	(29)
抗淋巴细胞球蛋白	(29)
昆明山海棠	(29)
右旋苯丙胺	(30)

四、作用于中枢神经系统药物

1、中枢兴奋药	
匹莫林	(30)
奈福潘注射液	(30)
硝酸一叶萩碱注射液	(31)
乙酰谷酰胺注射液	(31)
乙酰胺吡咯酮(脑复康)	(31)
瞻立苏注射液	(32)
醒脑静注射液	(32)
马前子酊	(32)
2、镇痛药	
三丁酸钠注射液	(32)
克痛宁注射液	(33)
氢溴酸高乌甲素	(33)
富马酸异丙吡胺	(33)
盐酸平痛新	(34)
安络痛片	(34)
痛灭定	(34)
强痛注射液	(34)
3、解热镇痛及抗风湿药	
3—乙酰乌头碱	(35)
双氯灭痛	(35)
注射用阿斯匹林精氨酸	(35)
注射用赖氨酸匹林	(35)
双水杨酸酯(水杨酰水杨酸)	(36)
苯氧布洛芬钙	(36)
痛灭定	(36)
丁苯乙脞	(37)
布洛芬	(37)
芬布芬(联苯丁酮酸)	(37)
萘普生	(37)
卫矛醇	(38)
安热静注射液	(38)
吲哚拉新	(38)

酮基布洛芬.....(38)
 麦角胺咖啡因片.....(39)
 戊烯松.....(39)
 炎痛喜康.....(39)
 丹皮酚磺酸钠注射液.....(39)
 速效感冒片.....(40)
 感冒通.....(40)
 4、抗精神失常药
 五氟利多.....(40)
 舒必利.....(40)
 碳酸锂片.....(41)
 盐酸阿米替林.....(41)
 氟奋乃静癸酸酯.....(41)
 安乐律棕榈酸酯.....(42)
 三甲氧咪.....(42)
 三唑氮安定.....(42)
 氟硝安定.....(43)
 5、抗癫痫药
 丙磺草酰胺.....(43)
 香荚兰醛.....(43)
 氯硝安定.....(44)
 卡马西平片.....(44)
 癫痫安胶囊.....(44)
 6、镇静、催眠及抗惊厥药
 卡比多巴(乙一甲基多肽).....(45)
 氟哌啶醇注射液.....(45)
 氟安定(妥眠灵).....(45)
 舒乐安定(三唑氮安定).....(46)
 盐酸氟安定.....(46)
 佳静安定片.....(46)
 小儿牛黄片.....(47)
 牛黄宁宫片.....(47)
 石菖蒲注射液.....(47)
 天麻片和注射液.....(47)
 安宫牛黄丸.....(48)
 珍珠末.....(48)
 养心片.....(48)
 灵芪精.....(48)

脑力宝丸(健脑益智丸).....(48)
 脑灵片.....(49)
 脑乐静.....(49)
 密环菌片.....(49)
 眩晕停片.....(49)
 雪蛤参精口服液.....(49)
 薄芝注射液和薄芝片.....(49)
 神效紫雪丹.....(50)
 晕可平糖浆.....(50)
 僵蛹.....(50)
 7、其它
 脑复康片.....(50)

五、清热、消炎、止痛中成药

红茴香注射液.....(51)
 骨宁注射液.....(51)
 风湿宁注射液.....(51)
 野木瓜注射液.....(51)
 丹皮酚注射液.....(51)
 健骨注射液.....(51)
 抗风湿注射液.....(52)
 热毒平注射液.....(52)
 牛黄酸.....(52)
 牛黄醒脑注射液.....(52)
 热可平注射液.....(52)
 清热解毒注射液.....(53)
 防己关节丸.....(53)
 龙虎人丹.....(53)
 更年安.....(53)
 腰肾膏.....(53)
 脑立清.....(53)
 王氏保赤丸.....(54)
 犀黄丸.....(54)
 金毛狗脊丸.....(54)
 玉石茶.....(54)
 三金片.....(54)
 石淋通片.....(55)
 前列通片.....(55)
 小儿奇应丸.....(55)

保嬰散.....(55)
 惊风七厘散.....(55)
 盐蛇散.....(55)
 消痰灵片.....(56)
 琥珀抱龙丸.....(56)
 绿石滚痰丸.....(56)
 万应至宝丹.....(56)
 银翘解毒颗粒.....(56)
 解毒感冒片.....(56)
 愈智消胶囊.....(57)
 愈感片.....(57)
 复方感冒宁片.....(57)
 内消瘰癧丸.....(57)
 益元散.....(57)
 高丽清心丸.....(57)
 强力银翘片.....(58)
 新雪丹.....(58)
 川芎茶调片.....(58)
 九分散.....(58)
 加味灵仙跌打片.....(58)
 雪上一枝蒿片.....(58)
 正骨紫金丸.....(59)
 消肿止痛精.....(59)
 昆明山海棠片.....(59)
 驱风痛片.....(59)
 抗风湿灵片.....(59)
 风湿灵.....(59)
 虎骨大活络丸.....(59)
 风湿草药.....(60)
 驱风药水.....(60)
 舒筋活络液.....(60)
 蛇胆追风丸.....(60)
 大活络丸.....(60)
 天麻杜仲丸.....(60)
 稀签风湿丸.....(61)
 防风通圣丸.....(61)
 桂龙药膏.....(61)
 当归龙荟丸.....(61)
 黄连片.....(61)

九制大黄丸.....(61)
 龙眼泻肝片.....(62)

六、作用植物神经系统药物

甲烷磺酸酚拉明(酚胺唑啉、立其根心丁、羊胺唑啉).....(62)
 安腹痛注射液.....(62)
 氯化美斯的明.....(62)

七、作用于循环系统药物

1、强心药
 β-甲基狄戈辛.....(63)
 多巴酚丁胺注射液.....(63)
 强心素片.....(64)
 2、抗心律失常药
 安搏律定.....(64)
 盐酸胺碘酮.....(64)
 异搏定(戊脉安).....(65)
 丙吡胺(双异丙吡胺).....(65)
 安律酮(乙胺吡酮).....(66)
 安他林(安他唑啉, 安他心).....(66)
 室安卡因.....(66)
 心律平.....(66)
 天冬钾镁注射液.....(67)
 3、防治心绞痛药
 三甲氧苄啶.....(67)
 心脑健.....(67)
 心血通注射液.....(68)
 克冠草(克冠二氮草).....(68)
 丹参酮II-A磺酸钠.....(68)
 安心酮(安蒙痛、盐酸麻黄苯丙酮).....(68)
 血脉宁(吡醇氨酯、安近宁).....(69)
 复方硝酸戊四醇酯片.....(69)
 心乐片(大豆总黄酮片).....(69)
 心脑康.....(69)
 青心酮.....(70)
 速效救心丸.....(70)
 冠心丹.....(70)
 维脉路通注射液.....(70)

舒胸片(糖衣).....	(71)
复方冠心宁片.....	(71)
菊花冠心片.....	(71)
益心丸.....	(71)
冠心丹参片.....	(71)
活心丸.....	(71)
黄杨宁片.....	(72)
保心灵.....	(72)
麝香保心丸.....	(72)
4、周围血管扩张药	
双环己哌啶(沛心达、心舒宁)...	(72)
硝苯吡啶(心痛定、利心平).....	(72)
盐酸异可利定片.....	(73)
妥拉苏林注射液.....	(73)
甲氧酮(甲苯氧丙酮、脑脉宁).....	(73)
培他啶盐酸盐(培他胺).....	(74)
维脑路通(羟乙芦丁).....	(74)
戴芬逸多.....	(74)
脑脉康(烟胺羟丙萘碱).....	(75)
脑脉宁(甲苯氧丙酮).....	(75)
脑心舒片.....	(75)
脑络通胶囊.....	(75)
消栓再造丸.....	(76)
磷酸川芎嗪.....	(76)
盐酸川芎嗪.....	(76)
灯盏细辛注射液.....	(77)
祖师麻注射液.....	(77)
抗栓丸.....	(77)
5、降血压药	
甲氧乙心安.....	(77)
注射用硝普钠.....	(77)
柳胺苄心定.....	(78)
巯甲丙脯酸.....	(79)
盐酸咪唑嗪(脉宁平、降压嗪).....	(79)
盐酸咪唑嗪膜.....	(79)
利降平片.....	(80)
氨酰心安糖衣片.....	(80)
山绿茶片.....	(80)
安降片.....	(81)

复方罗布麻片.....	(81)
葛根黄豆甙元片.....	(81)
葛藤降压片.....	(81)
(六)其它	
鱼脂酸.....	(81)
非诺贝特(普鲁脂芬).....	(82)
硫酸恢压敏注射液.....	(82)
降酯灵胶丸.....	(82)
泽泻降酯片.....	(82)
降脂平.....	(82)
降脂宁片.....	(83)
蛹油脂肪酸.....	(83)
八、作用于呼吸系统药物	
(一)止咳祛痰药	
压咳定(咳乃定、沃克拉丁).....	(83)
愈创木酚磺酸钾(知阿可尔).....	(83)
胆酸止咳片(糖衣片).....	(84)
双苯氧丙醇(镇咳嗪).....	(84)
咳特灵.....	(84)
咳吗宁(咳必定).....	(84)
双氧异丙嗪(克咳敏).....	(84)
胺酰苯吗啉(福米诺苯).....	(85)
合成杜鹃素.....	(85)
复方木瓜酶片.....	(85)
樟叶油丸.....	(85)
牡荆油滴丸.....	(85)
黄荆油.....	(85)
艾叶油胶丸.....	(86)
消痰咳片.....	(86)
芒果止咳片.....	(86)
巯乙磺酸钠.....	(86)
羧甲半胱氨酸.....	(86)
木犀草素.....	(86)
螺癸酮喘通.....	(87)
胡椒喘定.....	(87)
白葡止咳片.....	(87)
蛤蚧养肺丸.....	(87)
黄柏果片.....	(87)
新碧桃仙.....	(88)

贝羚散.....	(88)
百花油.....	(88)
雪梨膏.....	(88)
贝母雪梨膏.....	(88)
八宝惊风散.....	(88)
鲜竹沥口服液.....	(89)
咳宁糖浆 (咳宁冲剂)	(89)
(二) 平喘药	
喘敌素.....	(89)
酚丙喘宁.....	(89)
嗽喘定 (立灭喘)	(89)
茶丙喘宁.....	(90)
六甲双喘定 (臭喘酚)	(90)
溴化异丙阿托品.....	(90)
香叶醇.....	(90)
盐酸氯丁喘氨 (盐酸丁氯氨)	(91)
溴化异丙基东莨菪碱.....	(91)
双氧异丙嗪.....	(91)
螺癸酮喘通.....	(91)
胡椒喘定.....	(91)
喘舒 (NAB365) 膜.....	(91)
新喘静 (AEA) 片.....	(92)
喘安片 (原名喘咳灵片)	(92)
海珠喘息定片.....	(92)
α -细辛脑片.....	(92)
安尔喘胶丸.....	(93)
息喘酚.....	(93)
舒喘灵气雾剂.....	(93)
一滴慢支油.....	(93)
百花定喘片.....	(94)
珠贝定喘丸.....	(94)
蛤蚧定喘丸.....	(94)
首乌喘息灵.....	(94)
粉尘螨注射液.....	(94)
喘定注射液.....	(95)

九、作用于消化系统药物

(一) 胃肠道疾病用药

溴丁东莨菪碱.....	(95)
-------------	--------

服止宁.....	(96)
胃铋镁.....	(96)
甲氰咪胍.....	(96)
雷尼替丁盐酸盐.....	(96)
丙谷胺片.....	(97)
胃友双层片.....	(97)
生胃酮 (甘珀酸钠)	(97)
盖胃平片 (口嚼片)	(97)
乐得胃片.....	(98)
溃疡愈康 (三甲硫苯嗪)	(98)
胃丙胺.....	(98)
溴化丙胺太林片.....	(98)
促菌生片.....	(99)
复方地芬诺酯片.....	(99)
獐牙菜苦甙.....	(99)
溃疡灵胶囊.....	(99)
红古豆醇酯.....	(100)
克痢痧胶囊.....	(100)
肠通粉 (外用粉剂)	(100)
补脾益肠丸.....	(100)
灭吐宁注射液 (盐酸胃复安)	(101)
珍珠胃安丸.....	(101)
胃灵.....	(101)
玉桂油.....	(101)
胃肠宁冲剂 (胃肠宁片)	(101)
胃药.....	(101)

(二) 助消化药

胰酶片 (肠溶片)	(102)
复方胰酶片.....	(102)
消食灵 (冲剂)	(102)
健脾糖浆.....	(102)
楂曲合剂.....	(102)
健脾糕丸.....	(102)
脾约麻仁丸.....	(103)

(三) 胆道疾病用药

利胆素.....	(103)
胆酸钠片 (糖衣片)	(103)
舒胆灵.....	(103)
利胆排石片.....	(104)

乌曷治胆片	(104)
胆石通胶囊	(104)
复方胆通	(104)
4. 肝脏疾病用药	
联苯双酯片	(104)
莱菔片	(105)
胆绿醇片(护肝片)	(105)
益肝灵(西利马灵)	(105)
齐墩果酸片	(105)
猴菇菌片	(105)
金酸草	(106)
复肝宁	(106)
老山香云片	(106)
云蕊肝泰冲剂	(106)
健肝灵胶囊	(107)
益肝冲剂	(107)
熊胆丸	(107)
逍遥丸	(107)
青叶胆片	(107)
鸡骨草丸	(108)
强肝丸	(108)
大力王糖浆	(108)
连香冲剂	(108)
五酯胶囊	(108)
肝悦片	(108)
肝舒注射液	(109)
维丙胺注射液(维丙肝注射液)	(109)
大青根注射液	(109)
谷氨酸钠注射液	(109)
L-氨基酸注射液	(109)
注射用核糖核酸	(110)
精氨酸注射液	(110)
复方麝香注射液	(110)
岩黄连注射液	(110)

十、作用于泌尿系统药物

丁尿酚	(111)
乙酰唑胺	(111)

氧化淀粉(尿素氮吸附剂)	(112)
结石通糖衣片	(112)
金钱草冲剂	(112)

十一、作用于血液及造血系统

(一) 药物

小檗胺	(113)
茴香烯(升白宁、茴香脑)	(113)
补血糖浆	(113)
肾上腺色腺片	(113)
硫酸鱼精蛋白注射液	(113)
甲酰四氢叶酸钙注射液	(114)
羟乙基芦丁(维脑路通)	(114)
咖啡酸片	(114)
氨肽素片	(115)
健血冲剂	(115)
升血膏	(115)

十二、作用于内分泌系统药物

甲巯基咪唑片	(115)
消渴降糖丸(胶囊)	(116)
玉泉丸	(116)
消渴丸	(116)
醋酸去氧皮质酮注射液	(116)
注射用促皮质素	(117)

十三、抗过敏药

吡咯醇胺	(117)
苯噻啶	(117)
双氯异丙嗪(克咳敏)	(118)
色甘酸钠	(118)
黄芩甙	(118)
甲氧嗪庚酮(哮喘酮)	(118)
羟苯苯酮	(119)
苯氮唑啉酮(敏喘宁)	(119)
肉桂氨基萘酸	(119)

(841)

十四、调节电解质平衡药物

口服补液盐(ORS) (119)

东口福钙糖片 (120)

(841)

十五、营养药

盐酸赖氨酸片 (120)

L-赖氨酸 (120)

赖氨酸-B₁₂ (120)

11氨基酸注射液-833 (121)

六合氨基酸注射液(肝醒灵) (121)

氮复命14 S注射液 (121)

14氨基酸800注射液 (122)

十六、维生素类药物

腺苷辅酶维生素B₁₂ (123)

复合维生素B (123)

维生素补血露 (123)

(841)

十七、补益中成药

壮血片 (123)

花粉素片 (124)

花粉健美酥 (124)

高维灵 (124)

天麻首乌片 (124)

补天灵 (124)

肝肾膏 (125)

两仪膏 (125)

金樱子片 (125)

补神补脑片 (125)

健儿膏 (125)

蛤蚧党参膏 (125)

维尔康 (126)

药制龟苓膏 (126)

黑锡丸 (126)

琅玉膏 (126)

洋参胶囊 (126)

人参香茶片 (127)

清宫八仙糕 (127)

复方胎盘片 (127)

参鹿补膏 (127)

阿胶补血膏 (127)

力加寿片 (127)

健神片 (128)

还少丹 (128)

补肝丸 (128)

人参再造丸 (128)

参茸鞭丸 (128)

虎潜丸 (128)

滋阴补肾丸 (129)

壮腰安神丸 (129)

耳聋佐磁丸 (129)

金鸡虎补丸 (129)

生龙活虎丸 (129)

雄狮丸 (130)

河车大造丸 (130)

封髓丸 (130)

樱黄丸 (130)

骨碎补丸 (130)

参茸补肾丸 (130)

巴戟丸 (131)

全鹿丸 (131)

龟鹿补肾丸 (131)

金樱子膏 (131)

七宝美髯冲剂 (131)

鹿尾巴精 (132)

四君子冲剂 (132)

还精煎口服液 (132)

人参花粉素口服液 (132)

人参银耳晶 (132)

参芪鸡精 (133)

杞菊地黄口服液 (133)

人参精口服液 (133)

虫草人参鸡精 (133)

肥儿糖浆 (133)

人参注射液 (133)

养荣液 (134)

蛤蚧精	(134)
维他鹿尾精	(134)
仙茸壮阳精	(134)
杜仲冲剂	(135)
首乌冲剂	(135)
欢乐灵	(135)
龟龄集	(135)
微达康	(135)
贞芪扶正冲剂	(136)

十八、生化制剂

硫酸软骨素注射液	(136)
注射用核糖核酸	(136)
溶菌酶	(136)
注射用蝮蛇抗栓酶	(136)
核酪注射液	(137)
热藏犬脑组织液	(137)
胰弹性酶	(137)
尿激酶	(137)
脑酶水解片	(138)

十九、麻醉科用药

盐酸氯胺酮注射液	(138)
安氟醚	(139)
左旋氯甲箭毒注射液	(139)
布比卡因注射液	(139)
氢溴酸高乌甲素注射液	(140)
氯化筒箭毒碱注射液	(140)
广肌松	(140)

二十、妇产科用药物

氟烯雌酚醚(泰舒)	(140)
黄藤素注射液	(141)
花红冲剂	(141)
金鸡冲服剂	(141)
妇炎康	(142)
妇炎灵	(142)
妇治栓	(142)
阴道炎栓	(142)

益康唑栓	(142)
洗必泰栓	(143)
鹤草芽栓(滴虫栓)	(143)
参茸白凤丸	(143)
女宝	(143)
驴胶补血膏	(144)
大黄蛰虫丸	(144)
化症回生片	(144)
妇科十味片	(144)
嫦娥加丽丸	(144)
妇康宁片	(144)
鹿胎膏	(145)
白带丸	(145)
止血灵胶囊	(145)
宫血宁胶囊	(145)
乌鸡白凤丸	(145)
安年康片	(146)
更年灵胶囊	(146)
乳康片	(146)
月经棉塞	(146)
外用避孕药膜	(146)
硅橡胶缓释避孕环	(147)
复方苯酚糊剂	(147)
芫花蕊(芫花酯甲)	(147)
前例腺素 E ₂	(148)

二十一、眼科用药物

眼宁滴眼剂	(148)
氨肽碘滴眼剂	(148)
噻吗心安眼药水	(149)
治障宁眼药水	(149)
夏天无眼药水	(149)
疱疹净	(149)
安妥碘注射液	(150)
眼宁注射液	(150)
田七人参(801)注射液	(150)
消膜眼膏 I 号、II 号	(150)
拨云散	(151)
八宝眼药	(151)

消腺片	(151)
益视冲剂	(151)
鸡肝散	(151)
障眼明片	(152)
石斛夜光丸	(152)
增光片	(152)
羊肝糖衣片	(152)
丁公藤硷Ⅱ滴剂	(152)

二十二、口腔、耳鼻喉

科用药物

双山冲剂	(153)
牙周宁片	(153)
耳聋佐磁丸	(153)
鼻渊丸	(153)
苍鹅鼻炎灵片	(153)
鼻咽灵	(153)
藿胆丸	(154)
鼻炎片	(154)
丹参酮胶囊	(154)
炎肿化毒片	(154)
牛黄消炎丸	(154)
消炎解毒丸	(154)
锡类散	(155)
清咽喉合剂	(155)
麝香喉症丸	(155)
珠黄吹口散	(155)
喉康散	(155)

二十三、皮肤科用药物

火烫药膏	(156)
克瘟隐酮霜	(156)
熊胆散毒丸	(156)
益康唑	(156)
乙双吗啉	(157)
乌蛇止痒丸	(157)
复方青黛丸	(157)
银屑灵	(157)

克银丸	(158)
白蚀丸	(158)
黄花油	(158)
肤炎净软膏	(158)
顽癣净	(158)
华佗膏	(159)
克霉唑癣药水	(159)
醋酸去炎松尿素乳膏	(159)
白癬净	(159)
乐得华止痒香粉	(159)
肤美净药膏	(160)
疥灵霜	(160)
新脚气药水	(160)
新脚气膏	(160)
斑秃丸	(161)
生发片	(161)
积雪貳	(161)
康肤裂药水	(161)

二十四、外科用药

克念菌素	(162)
安尿通	(162)
柳胺霜	(162)
红花油	(162)
伤友擦剂	(162)
痔全息注入液	(163)
蟾蜍膏	(163)
伤湿解痛膏	(163)
豆叶九里香油软膏	(163)
痛肿灵	(164)
紫草油	(164)
冲和散	(164)
月白珍珠散	(164)
独活止痛搽剂	(164)
消肿止痛精	(164)
中华跌打丸	(164)
骨友灵搽剂	(165)
伤痛舒	(165)
海马万应膏	(165)

河东祖师麻膏	(165)
海马追风膏	(166)
海马舒活膏	(166)
麝香跌打风湿膏	(166)
麝香风湿油	(166)
复方油蛇酊	(166)
熊胆痔疮膏	(167)
痔速宁	(167)
痔特佳片	(167)
骨刺片	(167)
骨仙片	(167)

二十五、诊断用药物

碘卡明	(168)
碘番酸片	(168)

二十六、特殊解毒药物

碘解磷定	(168)
依地酸钙钠	(169)
克脑迷	(169)
广西蛇药	(170)

二十七、药酒类

参茸药酒	(170)
参茸虎骨药酒	(170)
参茸追风酒	(170)
豹骨酒	(170)
人参天麻酒	(171)
特制虎骨酒	(171)
鹿尾巴酒	(171)
人参百岁酒	(171)

太湖珍珠酒	(171)
桂参酒	(171)
琼浆药酒	(172)
十二红药酒	(172)
参茸多鞭酒	(172)
虎骨参茸酒	(172)
天麻健脑酒	(172)
灵芝桂圆酒	(173)
神农药酒	(173)
豹骨追风药酒	(173)
万年春酒	(173)

二十八、其他

唾液素	(173)
刺五加(刺拐棒)	(174)
减肥茶	(174)
防风通圣散	(174)
氟苯丙胺	(174)
芬氟拉明	(175)
吐温-80	(175)

附录

一、中华人民共和国卫生部(82) 卫药字第21号通知中所列淘 汰药品172种名单	(175)
二、纠正代谢性酸中毒的补给公式	(177)
三、年龄、体重与药物剂量的折算 法	(178)
四、中文索引	(179)
五、八十种常用静脉滴注化学性配 伍变化表	(181)

一、抗微生物药物

头孢哌酮钠

Gefoperazone Sodium

〔作用〕本品是第三代广谱的半合成头孢菌素，对革兰氏阳性和革兰氏阴性菌均有较强的抗菌活性，对绿脓杆菌的抗菌活性为其特点之一。对厌氧菌如脆弱拟杆菌、厌氧球菌、非芽胞杆菌、芽胞杆菌也有抗杆菌作用。对大多数硝酸盐阴性杆菌无作用。

〔适应症〕适用于由敏感菌引起的败血症、胆囊炎、胆管炎、腹膜炎及腹腔内、呼吸道、尿路、皮肤软组织、妇产科感染等。

〔用法与用量〕成人剂量：轻、中度感染，每日2克，每24小时肌注一次；中重度感染，每日4克，每12小时肌注或静注一次；严重感染，每日6~8克，每12小时肌注或静注一次。儿童剂量：每日50~150毫克/公斤，分数次肌注或静注。

肌注以注射用水或氯化钠注射液2毫升冲化0.5克本品，作深部肌肉注射。静注以5~10%葡萄糖注射液或葡萄糖盐水40~60毫升稀释，推注5~10分钟。静滴以5~10%葡萄糖水或葡萄糖盐水100~250毫升稀释后滴1~2小时。与氨基糖甙类抗生素联合应用有协同作用，但忽置于同一针筒或输液瓶中使用。

〔副作用〕可引起皮疹、嗜酸粒细胞增多、药物热、一过性GPT增高，偶有大便习惯改变。应用大剂量(>10克/天)长疗程时，个别患者由于本品胆汁浓度高，使合成维生素K的肠道菌受抑制而引起维生素K缺乏，在术后禁食病例、营养不良患者、肾功能不全、肿瘤患者等病例中

有导致凝血功能异常的可能。适当补充维生素K可防治此种反应发生。

〔制剂〕粉针剂0.5克、1克。

〔贮藏〕密封，置于5℃以下保存。

〔生产厂〕上海第三制药厂。

羟氨苄头孢菌素

Cefadroxil Monohydrate

〔作用〕能抑制细菌细胞壁的生物合成。对葡萄球菌、肺炎链球菌、β-溶血性链球菌、痢疾杆菌、沙门氏菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌、流感嗜血杆菌及产生青霉素酶的致病菌敏感。

〔适应症〕适用于急性支气管炎、肺炎、肺脓肿等；肾盂肾炎、膀胱炎等；急性化脓扁桃体炎、扁桃体周围脓肿、痢疾、急性蜂窝织炎、伤口并发感染、急性乳腺炎等，同时对骨髓炎及化脓性脑膜炎也有良好的治疗作用。

〔用法与用量〕口服：成人一般每天1.5克，各种严重感染病例每日可用2~4克，2~3次分服。小儿一般每日每公斤50毫克，各种严重感染可增至每日每公斤75~100毫克，2~3次分服。

〔副作用〕肾功能不全者，视情况适当延长给药时间间隔，肌酸酐清除率超过50毫升/分者可正常治疗。

〔制剂〕胶囊：每个胶囊含125毫克，片剂：每片含250毫克。

〔生产厂〕河北省石家庄第一制药厂。

羟苄四唑头孢菌素(头孢羟唑)

Cefamandolum (Mandol)

本品为半合成的头孢菌素类抗生素。每1克(按效价计)药物添加有63毫克的碳酸钠。

〔作用〕本品的抗菌谱与先锋霉素Ⅰ近似,对革兰氏阳性菌的作用比先锋Ⅰ弱,但抗革兰阴性菌的作用则较头孢唑啉(先锋V)为强。对流感杆菌的作用与氨苄青霉素相近。对于普通变形杆菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌、摩尔根氏变形杆菌、柠檬杆菌等均有良好的抗菌作用。对产生青霉素酶的金黄色葡萄球菌作用良好,用于急性呼吸道感染、消化道、骨和关节、皮肤和软组织、胆道、腹腔等部位感染,也用于败血症。由于本品的尿药浓度高,因此对尿路感染有效率高。

〔用法及用量〕成人每日量为2~6克,重症可用到12克。儿童每日量为50~100毫克/公斤。上述量分成3~4次,加入输液中滴注。可以应用的输液有生理氯化钠溶液、葡萄糖溶液或M/6乳酸钠液。通常将1克药物溶于10毫升液体中,于3~5分钟内静注,或加入点滴器的麦菲氏滴管中。若为轻症也可深部肌注(1克溶于3毫升注射用水或生理氯化钠溶液中)。

〔副作用〕①本品的不良反应有血小板或中性白细胞减少、SGOT、SGPT和碱性磷酸酶升高、肾损害等。②可偶致过敏,对高敏体质或对青霉素过敏的病人慎用。③肌注可致局部疼痛。④与氨基糖甙类抗生素有相加或协同作用,可同时用药,但应分开给予,不宜在同一注射器皿中混合应用。⑤本品稀释后,可在室温存放24小时,在冰箱(5℃)中存放96小时,在放置过程中,由于产生CO₂,容器内部压力增高。

〔制剂〕粉针:每支0.5克、1.0克、2.0克。

吡硫头孢菌素钠(头孢吡硫钠;
先锋霉素VⅢ)

Cephapirin Sodium (BL-P1322)

本品为半合成的头孢菌素类抗生素。

〔作用〕本品的抗菌谱与先锋霉素Ⅰ号、Ⅱ号相似,对许多革兰阳性细菌和一些革兰阴性细菌有抗菌作用,其中对肺炎球菌和肠球菌的作用较为突出。主要应用于尿路、呼吸系统和软组织等部位的感染。优点是局部刺激性较小,肌注疼痛较轻,静注较少引起静脉炎。

〔用法与用量〕肌注或静注,每日2~6克,分4次给予。对于重症可用到每日12克,分次静注或加到输液中点滴(每次用量加入输液200毫升中给予)。儿童剂量为50~80毫克/公斤/日,分次给予。溶剂可用注射用水、生理氯化钠溶液或5%葡萄糖液溶解。溶解后如不即时用,可贮放冰箱中,保存24小时效价几无损失。

〔副作用〕①本品对少数病人可致转氨酶、转肽酶升高,并偶有白细胞和血小板减少(骨髓抑制)等副作用,停药后可恢复。②本品有致过敏反应的可能,对青霉素过敏者慎用。③本品与20%甘露醇液、多粘菌素类注射剂、庆大霉素、卡那霉素等配伍、经过放置可产生混浊,因此不宜置于同一注射器中。

〔制剂〕粉针:每支0.5克,1克。

噻吩甲氧头孢菌素

Cefoxitinum (Mefoxin)

本品是一种新型的头霉素类半合成抗生素。

〔作用〕具有高度抗β-内酰胺酶(由革兰阳性和阴性菌所产生的)性质,并对厌氧菌有良好作用,对于葡萄球菌、多种链球菌(包括肺炎链球菌)、奈瑟氏

菌、大肠杆菌、克雷伯杆菌、奇异变形杆菌、普通变形杆菌、摩尔根氏变形杆菌、流感杆菌、赛氏杆菌、沙门氏杆菌、志贺氏菌、产气荚膜杆菌和其它梭状芽胞杆菌、脆弱类杆菌等均有良好的抗菌作用。对于假单胞菌、多数的肠球菌和肠杆菌类等则无效。

〔适应症〕敏感菌所致的腹膜炎、败血症、心内膜炎、尿路感染、呼吸道炎症、以及骨和关节、皮肤和软组织等感染。

〔用法〕成人用量，轻症每次1克，每日3~4次。重症每次用2~3克，每日量可达12克。肌注可用0.5%利多卡因液作溶剂。静注1克用10毫升注射用水溶解，缓缓推注。本品可与下列液体配伍：生理氯化钠液、5~10%葡萄糖液、葡萄糖盐水、碳酸氢钠注射液和M/6乳酸钠液，作静脉点滴用。本品可与庆大霉素、妥布霉素、羧苄青霉素或丁胺卡那霉素相配伍。

〔副作用〕①曾有报导本品与其他 β -内酰胺类抗生素（青霉素类、头孢菌素类）有交叉过敏反应，遇此情况必须谨慎使用。②不良反应有胃肠道反应、白细胞减少、氮血症、血SGOT、SGPT、乳酸脱氢酸和硷性磷酸酶升高，以及过敏症状。注射局部可有疼痛。③主要由肾排泄，个别病例可致肾功能衰退。对于肾功能不全的患者应予减量。

〔制剂〕粉针：每支1克、2克（按效价计）。

呋肟头孢菌素

本品为合成的头孢菌素族抗生素。

〔作用〕具有广谱抗菌作用，对金黄色葡萄球菌、链球菌、脑膜炎双球菌、流感杆菌、克雷伯菌、大肠杆菌、梭状芽胞

菌、奇异变形杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、奈瑟氏菌等有高度的抗菌作用，对普通变形杆菌、脆弱类杆菌等中度抗菌作用。本品有抗 β -内酰胺酶的性质，对抗青霉素的金葡菌有效（抗新青霉素的金葡菌除外），并对能产生 β -内酰胺酶的球菌有效。

〔适应症〕用于敏感菌所致的呼吸道、五官、骨和关节、软组织、女生殖器部位的感染，并对败血症和上述细菌引起的脑膜炎有效。本品在尿中有高浓度，尤适用于尿路感染。

〔用法与用量〕成人剂量为750毫克，每日3次，严重感染时可加倍，即3~6克/日。儿童剂量为30~100毫克/公斤/日，平均用60毫克/公斤/日，分成3~4次。肌内注射时，每750毫克本品加注射用水3毫升，振摇使成混悬液，用粗针头作深部肌注。静脉给药的注射用水量应加倍或更多，使成澄清溶液，缓慢作静注或加入麦菲氏管中。

〔副作用〕①青霉素过敏者对本品不一定过敏，但也有交叉过敏的报告，因此须慎用。②使用本品时，若并用高效利尿剂（如速尿）可致肾损害，宜注意。③妊娠早期应慎用。④对头孢菌素类过敏者禁用。⑤肾功能不全者应减量。⑥本品的副作用与其他头孢菌素类相似，有皮肤瘙痒、胃肠道反应、血色素降低、血胆红素升高、肾功能改变等。肌注时可致局部疼痛。⑦本品不可与氨基糖甙类抗菌素合并于一个射器内应用。

〔制剂〕粉针：每支0.25克、0.5克、1.5克。

头孢呋喃

〔适应症〕用于支气管炎、肺炎、肾

炎、尿道炎；急性扁桃腺炎、咽峡炎、中耳炎和鼻旁窦炎；胃肠炎、胆囊胆道炎、腹膜炎；产褥热、乳腺炎、盆腔炎、败血症、细菌性心内膜炎；淋病、梅毒、疖病、脓疱病、脓肿、淋巴结炎、伤口感染等。

〔用法与用量〕成人每次服2~4粒，每日3~4次，儿童酌减。

〔副作用〕少数病人可有胃肠道反应，如恶心和腹部不适等症状。

〔制剂〕胶囊：每粒含头孢氨苄125毫克，每盒10粒。

〔生产厂〕广州第八制药厂。

复方头孢氨苄片

〔适应症〕咽喉炎、咽炎、扁桃腺炎、支气管炎、支气管扩张、肺炎、肾盂肾炎、尿路感染、胆囊炎、胆囊周围炎、胆管炎、毛囊炎、脓疱炎、痤疮、感染性粉瘤、创伤感染、汗腺炎、疖肿、蜂窝炎、麦粒肿、泪囊炎、眼睑炎、结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、齿周炎、腭骨骨髓炎、牙根周围炎、外耳炎、中耳炎、副鼻窦炎等。

〔用法与用量〕成人口服每次1~2片，每日4次，儿童酌减。

〔副作用〕①偶有白血球和血小板减少、呕吐、恶心、下痢、食欲不振等现象，停药后症状自行消失。②有青霉素过敏史、有支气管喘息、荨麻疹等变态反应、肾功能不全、叶酸缺乏症、孕妇等患者忌用。③发现颤动、不快感、口腔异常感、喘鸣、眩晕、便急、耳鸣、发汗等症状或发现皮疹、荨麻疹、红斑、发热、淋巴腺肿胀、关节痛等过敏症状时停用。④对甲氧苄氨嘧啶过敏者慎用。

〔制剂〕片剂：每片含复方头孢氨苄150毫克。

〔贮藏〕密闭避光、室温存放。

〔生产厂〕东北制药总厂。

头孢孟多钠〔甲酰苯四唑类抗菌素钠盐〕
Cefamandole Nafate

〔作用〕本品对各种革兰氏阳性菌如：金葡菌、表皮菌和多种链球菌的抗菌作用相当强，平均MLC低于0.6微克/毫升，MBC与MLC基本相同，抑菌率90~100%、大肠杆菌、奇异变形杆菌、流感杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、雷极氏形杆菌、普鲁威登菌、产气杆菌和肺炎杆菌对本品相当敏感，其中流感杆菌特别敏感，药敏<1微克/毫升，对莫根氏变形杆菌、枸橼酸杆菌和多形模仿菌也具有杀菌作用，但平均MLC接近临界血浓度。本品对β-内酰胺酶（腊样芽胞杆菌605号提取）有很强的稳定性。

本品由肾排出，无论肌注、静注后高峰尿浓度可达3000~4000微克/毫升，给药后12小时排出给药量的60~80%。丙磺舒可延迟其排泄及提高血浓度。

〔适应症〕适用于由敏感菌所致的败血症，下呼吸道、肝胆系统、腹膜炎，泌尿系统与皮肤软组织感染等。

〔用法与用量〕本品供肌注或静注。一般感染每日2~6克，严重感染每日8~12克，分3~4次注射。儿童剂量视感染程度，每日50~150毫克/公斤，分3~4次注射。有肾功能损害者，根据损害程度酌减剂量。

本品可与氨基糖甙类抗生素联合使用。

〔副作用〕有皮疹，嗜酸性细胞增多等过敏反应，较少发生血小板减少及凝血酶元时间延长，偶见肝肾功能损害，肌注局部偶有短暂胀痛。对青霉素高度过敏者应用本品时需严密观察。对其它头孢菌素过敏者，不宜用本品。治疗期间应随防血小板及凝血酶元时间。

〔制剂〕针剂：每支0.5克、1克、2克。

本品【生产厂】 上海第三制药厂。

【制剂】 针剂：每支0.5克、2克。

【用法与用量】 肌注：成人每日4~8克。儿童每日80~100毫克/公斤。分3~4次注射。肌注时每克药物用生理盐水或注射用水3毫升稀释。因血浓度较低，肌注仅适于轻度感染。静脉滴注：轻、中度感染者成人剂量每天4~12克，严重感染者则需12~16克/天。儿童剂量为每天100~300毫克/公斤。分3~4次给予。静滴溶液可用生理盐水，5%葡萄糖盐水或5%葡萄糖溶液100~200毫升稀释，浓度以2%为宜，在半小时至1小时内注射完毕。静脉推注：用量同静脉滴注。每日量分4~6次给予，每次使用时，可用25%或5%葡萄糖溶液40~60毫升溶解后，于10~15分钟内缓慢推注。配制溶液浓度约每克药品溶解于5~10毫升液体中。

【副作用】 副作用轻微，且大多为可逆性，停药后即消失。少数患者在用药过程中可能出现皮疹或发热症状。偶可引

起血液嗜酸性细胞增多，白细胞减少，血清转氨酶升高等。①使用药前需先做青霉素皮试，阳性者不可使用；②如发生过敏反应，应即停药，给予适当处理；③不适用于对青霉素G耐药的葡萄球菌所致的感染；④肾功能严重损害者，应用本品需适当减量，疗程中应定期检查肝、肾功能。

【制剂】 针剂：每支0.5克、2克。

【生产厂】 上海第三制药厂。

【用法与用量】 肌注：成人每日4~8克。儿童每日80~100毫克/公斤。分3~4次注射。肌注时每克药物用生理盐水或注射用水3毫升稀释。因血浓度较低，肌注仅适于轻度感染。静脉滴注：轻、中度感染者成人剂量每天4~12克，严重感染者则需12~16克/天。儿童剂量为每天100~300毫克/公斤。分3~4次给予。静滴溶液可用生理盐水，5%葡萄糖盐水或5%葡萄糖溶液100~200毫升稀释，浓度以2%为宜，在半小时至1小时内注射完毕。静脉推注：用量同静脉滴注。每日量分4~6次给予，每次使用时，可用25%或5%葡萄糖溶液40~60毫升溶解后，于10~15分钟内缓慢推注。配制溶液浓度约每克药品溶解于5~10毫升液体中。

【副作用】 副作用轻微，且大多为可逆性，停药后即消失。少数患者在用药过程中可能出现皮疹或发热症状。偶可引

起血液嗜酸性细胞增多，白细胞减少，血清转氨酶升高等。①使用药前需先做青霉素皮试，阳性者不可使用；②如发生过敏反应，应即停药，给予适当处理；③不适用于对青霉素G耐药的葡萄球菌所致的感染；④肾功能严重损害者，应用本品需适当减量，疗程中应定期检查肝、肾功能。

【制剂】 针剂：每支0.5克、2克。

【生产厂】 上海第三制药厂。

【用法与用量】 肌注：成人每日4~8克。儿童每日80~100毫克/公斤。分3~4次注射。肌注时每克药物用生理盐水或注射用水3毫升稀释。因血浓度较低，肌注仅适于轻度感染。静脉滴注：轻、中度感染者成人剂量每天4~12克，严重感染者则需12~16克/天。儿童剂量为每天100~300毫克/公斤。分3~4次给予。静滴溶液可用生理盐水，5%葡萄糖盐水或5%葡萄糖溶液100~200毫升稀释，浓度以2%为宜，在半小时至1小时内注射完毕。静脉推注：用量同静脉滴注。每日量分4~6次给予，每次使用时，可用25%或5%葡萄糖溶液40~60毫升溶解后，于10~15分钟内缓慢推注。配制溶液浓度约每克药品溶解于5~10毫升液体中。

【副作用】 副作用轻微，且大多为可逆性，停药后即消失。少数患者在用药过程中可能出现皮疹或发热症状。偶可引

起血液嗜酸性细胞增多，白细胞减少，血清转氨酶升高等。①使用药前需先做青霉素皮试，阳性者不可使用；②如发生过敏反应，应即停药，给予适当处理；③不适用于对青霉素G耐药的葡萄球菌所致的感染；④肾功能严重损害者，应用本品需适当减量，疗程中应定期检查肝、肾功能。

【制剂】 针剂：每支0.5克、2克。

【生产厂】 上海第三制药厂。

【用法与用量】 肌注：成人每日4~8克。儿童每日80~100毫克/公斤。分3~4次注射。肌注时每克药物用生理盐水或注射用水3毫升稀释。因血浓度较低，肌注仅适于轻度感染。静脉滴注：轻、中度感染者成人剂量每天4~12克，严重感染者则需12~16克/天。儿童剂量为每天100~300毫克/公斤。分3~4次给予。静滴溶液可用生理盐水，5%葡萄糖盐水或5%葡萄糖溶液100~200毫升稀释，浓度以2%为宜，在半小时至1小时内注射完毕。静脉推注：用量同静脉滴注。每日量分4~6次给予，每次使用时，可用25%或5%葡萄糖溶液40~60毫升溶解后，于10~15分钟内缓慢推注。配制溶液浓度约每克药品溶解于5~10毫升液体中。

【副作用】 副作用轻微，且大多为可逆性，停药后即消失。少数患者在用药过程中可能出现皮疹或发热症状。偶可引

起血液嗜酸性细胞增多，白细胞减少，血清转氨酶升高等。①使用药前需先做青霉素皮试，阳性者不可使用；②如发生过敏反应，应即停药，给予适当处理；③不适用于对青霉素G耐药的葡萄球菌所致的感染；④肾功能严重损害者，应用本品需适当减量，疗程中应定期检查肝、肾功能。

【制剂】 针剂：每支0.5克、2克。

【生产厂】 上海第三制药厂。

【用法与用量】 肌注：成人每日4~8克。儿童每日80~100毫克/公斤。分3~4次注射。肌注时每克药物用生理盐水或注射用水3毫升稀释。因血浓度较低，肌注仅适于轻度感染。静脉滴注：轻、中度感染者成人剂量每天4~12克，严重感染者则需12~16克/天。儿童剂量为每天100~300毫克/公斤。分3~4次给予。静滴溶液可用生理盐水，5%葡萄糖盐水或5%葡萄糖溶液100~200毫升稀释，浓度以2%为宜，在半小时至1小时内注射完毕。静脉推注：用量同静脉滴注。每日量分4~6次给予，每次使用时，可用25%或5%葡萄糖溶液40~60毫升溶解后，于10~15分钟内缓慢推注。配制溶液浓度约每克药品溶解于5~10毫升液体中。

【副作用】 副作用轻微，且大多为可逆性，停药后即消失。少数患者在用药过程中可能出现皮疹或发热症状。偶可引

起血液嗜酸性细胞增多，白细胞减少，血清转氨酶升高等。①使用药前需先做青霉素皮试，阳性者不可使用；②如发生过敏反应，应即停药，给予适当处理；③不适用于对青霉素G耐药的葡萄球菌所致的感染；④肾功能严重损害者，应用本品需适当减量，疗程中应定期检查肝、肾功能。

【制剂】 针剂：每支0.5克、2克。

【生产厂】 上海第三制药厂。

【用法与用量】 肌注：成人每日4~8克。儿童每日80~100毫克/公斤。分3~4次注射。肌注时每克药物用生理盐水或注射用水3毫升稀释。因血浓度较低，肌注仅适于轻度感染。静脉滴注：轻、中度感染者成人剂量每天4~12克，严重感染者则需12~16克/天。儿童剂量为每天100~300毫克/公斤。分3~4次给予。静滴溶液可用生理盐水，5%葡萄糖盐水或5%葡萄糖溶液100~200毫升稀释，浓度以2%为宜，在半小时至1小时内注射完毕。静脉推注：用量同静脉滴注。每日量分4~6次给予，每次使用时，可用25%或5%葡萄糖溶液40~60毫升溶解后，于10~15分钟内缓慢推注。配制溶液浓度约每克药品溶解于5~10毫升液体中。

【副作用】 副作用轻微，且大多为可逆性，停药后即消失。少数患者在用药过程中可能出现皮疹或发热症状。偶可引

起血液嗜酸性细胞增多，白细胞减少，血清转氨酶升高等。①使用药前需先做青霉素皮试，阳性者不可使用；②如发生过敏反应，应即停药，给予适当处理；③不适用于对青霉素G耐药的葡萄球菌所致的感染；④肾功能严重损害者，应用本品需适当减量，疗程中应定期检查肝、肾功能。

【制剂】 针剂：每支0.5克、2克。

【生产厂】 上海第三制药厂。

【用法与用量】 肌注：成人每日4~8克。儿童每日80~100毫克/公斤。分3~4次注射。肌注时每克药物用生理盐水或注射用水3毫升稀释。因血浓度较低，肌注仅适于轻度感染。静脉滴注：轻、中度感染者成人剂量每天4~12克，严重感染者则需12~16克/天。儿童剂量为每天100~300毫克/公斤。分3~4次给予。静滴溶液可用生理盐水，5%葡萄糖盐水或5%葡萄糖溶液100~200毫升稀释，浓度以2%为宜，在半小时至1小时内注射完毕。静脉推注：用量同静脉滴注。每日量分4~6次给予，每次使用时，可用25%或5%葡萄糖溶液40~60毫升溶解后，于10~15分钟内缓慢推注。配制溶液浓度约每克药品溶解于5~10毫升液体中。

【副作用】 副作用轻微，且大多为可逆性，停药后即消失。少数患者在用药过程中可能出现皮疹或发热症状。偶可引

起血液嗜酸性细胞增多，白细胞减少，血清转氨酶升高等。①使用药前需先做青霉素皮试，阳性者不可使用；②如发生过敏反应，应即停药，给予适当处理；③不适用于对青霉素G耐药的葡萄球菌所致的感染；④肾功能严重损害者，应用本品需适当减量，疗程中应定期检查肝、肾功能。

【制剂】 针剂：每支0.5克、2克。

【生产厂】 上海第三制药厂。

【用法与用量】 肌注：成人每日4~8克。儿童每日80~100毫克/公斤。分3~4次注射。肌注时每克药物用生理盐水或注射用水3毫升稀释。因血浓度较低，肌注仅适于轻度感染。静脉滴注：轻、中度感染者成人剂量每天4~12克，严重感染者则需12~16克/天。儿童剂量为每天100~300毫克/公斤。分3~4次给予。静滴溶液可用生理盐水，5%葡萄糖盐水或5%葡萄糖溶液100~200毫升稀释，浓度以2%为宜，在半小时至1小时内注射完毕。静脉推注：用量同静脉滴注。每日量分4~6次给予，每次使用时，可用25%或5%葡萄糖溶液40~60毫升溶解后，于10~15分钟内缓慢推注。配制溶液浓度约每克药品溶解于5~10毫升液体中。

【副作用】 副作用轻微，且大多为可逆性，停药后即消失。少数患者在用药过程中可能出现皮疹或发热症状。偶可引

起血液嗜酸性细胞增多，白细胞减少，血清转氨酶升高等。①使用药前需先做青霉素皮试，阳性者不可使用；②如发生过敏反应，应即停药，给予适当处理；③不适用于对青霉素G耐药的葡萄球菌所致的感染；④肾功能严重损害者，应用本品需适当减量，疗程中应定期检查肝、肾功能。

【制剂】 针剂：每支0.5克、2克。

【生产厂】 上海第三制药厂。

【用法与用量】 肌注：成人每日4~8克。儿童每日80~100毫克/公斤。分3~4次注射。肌注时每克药物用生理盐水或注射用水3毫升稀释。因血浓度较低，肌注仅适于轻度感染。静脉滴注：轻、中度感染者成人剂量每天4~12克，严重感染者则需12~16克/天。儿童剂量为每天100~300毫克/公斤。分3~4次给予。静滴溶液可用生理盐水，5%葡萄糖盐水或5%葡萄糖溶液100~200毫升稀释，浓度以2%为宜，在半小时至1小时内注射完毕。静脉推注：用量同静脉滴注。每日量分4~6次给予，每次使用时，可用25%或5%葡萄糖溶液40~60毫升溶解后，于10~15分钟内缓慢推注。配制溶液浓度约每克药品溶解于5~10毫升液体中。

起血液嗜酸性细胞增多，白细胞减少，血清转氨酶升高等。①使用药前需先做青霉素皮试，阳性者不可使用；②如发生过敏反应，应即停药，给予适当处理；③不适用于对青霉素G耐药的葡萄球菌所致的感染；④肾功能严重损害者，应用本品需适当减量，疗程中应定期检查肝、肾功能。

【制剂】 针剂：每支0.5克、2克。

【生产厂】 上海第三制药厂。

羧苄青霉素钠（羧苄青霉素苄满脂钠）
Carindacillinum Natricum (Carindapen, Carindacillin Sodium, Indanylcardenicillin Sodium)

【作用】 本品口服吸收后，在体内释出羧苄青霉素。适用于绿脓杆菌、大肠杆菌和变形杆菌所致尿路感染。但本品不能用于全身感染，因血药浓度过低而不能奏效。

【用法与用量】 口服，每次0.5~1克，每日4次。

【副作用】 ①本品1.4克相当于羧苄青霉素1克。②可引起恶心、呕吐、腹泻、眩晕等。

【制剂】 胶囊：每个0.25克。

缩酮氨苄青霉素钾（海他西林）
Hetacillinum Kalicum (Hetacillin Potassium)

【作用】 本品为半合成的广谱青霉素。应用后在体内水解成氨苄青霉素，其抗菌作用与之相同，但在水解前则无抗菌作用。口服吸收好，与同剂量的氨苄青霉素相比，血浓度高峰约高20%。临床上用于各种氨苄青霉素适应症。

【用法与用量】 口服，肌注或静