

編註醫學入門 外集卷之五

婦人門

經候

經病百端血滯枯

婦人以血為主。天真氣隆。壬癸水合。腎

月盈則虧。故曰月經。經行與產後一脈。常以三句一見。以象
未淨。或外被風寒。及濕冷暑熱。邪氣。或內傷生冷。七情鬱
結。為痰。為瘀。凝積於中。曰血滯。或經止後。用力太過。入房
太甚。及服食燥熱。以致火動。邪氣盛而津血衰。曰血枯。良
方云。經後被驚。則血氣錯亂。妄行逆於上。則從口鼻而出。
逆於身。則水血相搏。變為水腫。恚怒則氣血逆於腰腿心
腹。背脇手足之間。重痛。經行則發。過期則止。怒極傷肝。則
有眩暈。嘔血。瘰癧。血風。瘡瘍等病。加之經血滲漏於其間。
遂成竅穴。生瘡。淋瀝不斂。濕熱相搏。遂為崩帶。血結於內。
變為癥瘕。凡此變症。百出。不過血滯與枯而已。但血滯亦

有虛熱。血枯亦有虛熱。故重則經閉不通。以滯宜破血枯。
滯枯分言。輕則經水不調。止言虛與熱而已。
補虛。血滯經閉。宜破者。原因飲食熱毒。或暴怒。或痰積。或
也。若氣旺血枯。起於勞役憂思。知宜溫和滋補。或熱有痰
火濕熱。尤宜清之。涼之。每以肉桂為佐者。然則血行也。但
不可純服峻藥。以所陰道至於耗氣益血之說。雖女科要
法。但血為氣配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降則降。
氣行則行。氣滯則滯。如果鬱火氣盛於血者。方可單香附
丸散。抑氣散。常加木香。檳榔。枳殼。以開鬱行氣。若氣亂則
調。氣冷則溫。氣虛則補。男女一般。陽生則陰自長。氣衰則
血亦涸。豈可專耗其氣耶。論者多泥收和血旺氣衰。不知
收和論肝肺二脉。則宜肝旺於肺。其實氣血平和。有孕故
繼曰。兩臟通和。但婦人見偏性。即婢妾志。不得使鬱怒無
時不起。故香附為女人仙藥。經曰。邪滯因外感傷冷鬱。經
氣盛則實。正氣奪則虛。可不悟諸。
滯因外感傷冷鬱。經
登。則風寒入內。以致凝滯。若小溫經湯。經行適來。或得寒
熱。就閉不通。或寒或暑。俱謂之熱。入血室。小柴胡湯加生

地。或黃芩芍藥湯加生地。經行不通。食生。或黃芩芍藥湯加生地。經行不通。食生。

致。血凝結者。五積散去麻黃加牡丹皮。紅花。○七。或黃芩芍藥湯加生地。經行不通。食生。

氣鬱結不行者。分心氣飲去羌活半。復桑皮。青皮。加川芎。或黃芩芍藥湯加生地。經行不通。食生。

當歸香附。我術。玄胡。索。有火者。更加黃芩。或小調經散。或黃芩芍藥湯加生地。經行不通。食生。

香附。也有盛實。欠宣。疏。單。大黃。膏。或馬鞭草。取汁。熬膏。為丸。或燒存性。紅。枯。傷。勞。食。或作泄。內。傷。飲食。勞。倦。損。傷。脾。

丸。或燒存性。紅。枯。傷。勞。食。或作泄。內。傷。飲食。勞。倦。損。傷。脾。胃。氣。弱。體。倦。發。熱。腹。痛。

花。當。歸。煎。湯。下。枯。傷。勞。食。或作泄。內。傷。飲食。勞。倦。損。傷。脾。胃。氣。弱。體。倦。發。熱。腹。痛。

腸。鴉。飲。食。減。少。而。不。生。血。者。補。中。益。氣。湯。加。川。芎。生。地。天。花。粉。有。腸。鳴。月。水。不。來。者。病。在。胃。胃。虛。不。生。血。氣。宜。單。厚。

朴。五。錢。空。心。水。煎。或。單。蒼。朮。膏。朮。世。少。食。者。升。陽。益。胃。湯。無。泄。少。食。者。二。陳。湯。加。白。朮。黃。芪。便。製。香。附。當。歸。芍。藥。牡。

丹。皮。麥。門。冬。山。查。麥。芽。因。濕。痰。胃。熱。分。胖。癰。海。濕。痰。粘。住。血。飲。食。積。者。更。加。義。朮。枳。壳。濕。痰。胃。熱。分。胖。癰。海。濕。痰。粘。住。血。

者。導。痰。湯。加。川。芎。黃。連。不。可。服。地。黃。泥。膈。故。也。如。用。須。姜。汁。炒。過。○。胃。熱。消。渴。善。食。漸。瘦。津。液。為。熱。燥。渴。者。宜。瀉。胃。

熱。四。物。湯。合。調。胃。承。氣。湯。名。王。燭。散。再。合。涼。膈。散。名。三。散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。

散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。

散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。

散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。

散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。

散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。

散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。

散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。散。輕。者。小。柴。胡。湯。合。四。物。湯。去。人。參。半。夏。加。天。花。粉。○。三。

虛形瘦口燥善食厚味鬱為痰火有潮者遺淫散加黃芩

無潮者四物湯加桃仁紅花或加味養榮丸大槩肥人多

氣弱有濕痰瘦脫血入房胞氣竭少年大脫血或醉後入

人多血怯有火者烏或產育過勞劬墮胎及多產有傷血或誤服汗下

賊丸或產育過勞劬墮胎及多產有傷血或誤服汗下

十全大不通大槩只如此虛熱痰氣四症而已不調亦大

補湯血氣流通更有凝滯然後可用紅花當歸散以通之通後又須養血

丸導經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血

益陰使津液流通苟不務氣血充和而惟以毒藥攻逼是

求千金於乞丐必死而後已以上言經水不通以下言

經水不調前後色何如

或以期言之對期者性不為害以色

言之心主血陰從陽故以色紅後期來少血不足後期三

為正雖不對期而色正者易調後期來少血不足後期三

為血虛四物湯加參芪白朮陳皮升麻瘰人只是血少四

赤滑石等歸香附○來少色和者四物湯點滴欲閉潮煩
 脉數者四物湯去等地加澤蘭葉三倍甘草少許十味香
 附丸內寒血逆來少或日少五六日以先期來多血有餘
 上者四物湯加桃仁紅花牡丹皮莢花
 先期三五日者為血熱四物湯加黃芩連胡香附肥人加痰藥先十
 數日者血氣俱熱也四物湯加黃芩來多或日多五六日以上者內熱
 蒼朮散也四物湯加參朮瘦人有火者固經丸肥人多痰者
 血散也四物湯加參朮瘦人有火者固經丸肥人多痰者
 清海蒼朮或前或後氣血亂或前或後或一月再至當歸散調經散
 淡丸
 車用淋瀝不斷邪未疎寒熱和氣客於胞中留滯血海外
 參散淋瀝不斷邪未疎寒熱和氣客於胞中留滯血海外
 疼也如有積下利不定有所去則愈臍下逆氣上攻胸膈
 欲嘔者挑仁散或開當歸四錢乾漆三錢蜜丸服如腰膝
 腹痛者牛膝散或行或止心痛者失笑散經水適來適斷
 往來寒熱者先服小柴胡湯加地黃後以四物湯和之有
 月事頻數者四物湯倍芍藥加黃芪有經行不止者風熱
 四物湯加地榆阿膠荆芥熱者倍黃芪或否固經丸風熱

色紫甚則黑淡因痰滯濕模糊色紫者風也黑者熱甚也

以混之也。如烟塵水。如屋漏水。如豆汁。或帶黃混濁模糊

者濕痰也。成塊作片。色不變者氣滯也。或風冷乘之也。色

變紫黑者血熱也。大繫紫者四物湯加防風白芷荆芥

黑者四物湯加芩連香附淡白者古芎歸湯加參芪白芍

香附有痰者二陳湯加芎歸如烟塵者二陳湯加芩附

風蒼朮如豆汁者四物湯加芩連成塊者四物湯加香附

玄胡索枳壳陳皮隨症選用。通川

琥珀調經丸百子附歸丸墨附丸

外症潮熱內腹痛水

循環織病不作而有子若熱潮夜重則加之咳血汗嘔或

瀉有朝汗則血愈消耗有咳嘔則氣往上行瀉則津偏於

後寒則積結於中是以必先去病而後可以滋血調經就

中潮熱夜痛尤為婦女常病蓋血滯積入骨髓便為骨蒸

血滯積瘀於中與日生新血相搏則為疼痛血枯不能滋

養百骸則蒸熱於外血枯胞絡火盛或挾痰氣食積寒冷

外邪則為疼痛。潮熱有時為內傷為虛無時為外感為

實虛者大溫經湯熱者四物湯加芩附

經閉者滋血湯

骨

湯

湯

湯

湯

湯

湯

蒸者。大胡連丸。大烏雞丸。五心潮者。四物湯加黃連。胡連。連。魚汗者。茯苓補心湯。有汗者。逍遙散。經前潮者。血虛有滯。逍遙散。加牡丹皮。桃仁。玄胡索。經後潮者。血虛有熱。逍遙散。去柴胡。換地骨皮。加生地。便炒黃芩。此方能加減。退熱。聖藥。有咳。加桑白皮。貝母。桔梗。便知。毋麥門冬。咳血。加生地。山梔。牡丹皮。嘔吐。加陳皮。半夏。旋覆花。嘈雜。加姜。炒黃連。或芩連二陳湯。尋常潮熱者。腎氣丸。大造丸。或四物湯。料。加便炒黃芩。各一兩。四製香附。一斤。蜜丸。服。痛滯。

經前虛後呼

此言腹痛也。經事欲行。臍腹絞痛者。為血滯。四物湯料。四錢。加玄胡索。苦練水。香檳。柳。各

一兩。痛甚者。萬痛丸。經水臨行時痛者。為氣滯。烏藥湯。氣滯。血瘀者。大玄胡索散。或四物湯。加桃仁。紅花。莪朮。玄胡索。香附。木香。發熱。加柴芩。經水將來。陣痛。陣止者。為血實。四物湯。加玄胡索。木香。黃連。香附。腿腹痛者。內補當歸丸。經水將行。被風冷。相搏。繞臍。痼痛者。乃寒氣客於血室。大溫經湯。桂枝。桃仁。湯。經水已來。時痛者。四物湯。加陳皮。玄胡索。牡丹皮。甘草。○經後痛者。為血虛。八物湯。小烏雞丸。歷年血寒。積結。胞門。嘔吐。涎唾。臍脇。疝痛。陰冷。微引腰脊。

而痛者。酒煮當歸丸。大溫經湯。通用。水腫經前血腫後

交加。地黃丸。滋陰百補丸。七製香附丸。經水斷而後腫。名曰血分。乃瘀血化水。閉塞胞門。比水腫

更難治。但能調其經。則水自消。小調經散。奪歸丸。先浮腫

而後經水不通。名曰水分。乃脾不能制血。與水并浮。肌肉

為之虛腫。紅礬丸。通用。腎氣丸。水。分。君。澤。瀉。加。防。已。葶。藶

木通。血。分。君。牡。丹。皮。加。牛。膝。紅。花。有。經。閉。脚。腫。者。桑。皮。散。血。風。身。痛。痺。皮。膚。血。虛。而。襲

風。冷。身。體。歷。節。痛。者。大。芎。藭。散。麒。麟。竭。丸。經。閉。身。痛。溺。瀉。陰。虛。濕。熱。甚。也。四。物。湯。加。蒼。朮。陳。皮。牛。膝

丸。草。水。煎。頗。服。間。用。蒼。朮。加。蒼。耳。白。芍。經。先。期。者。蒼。朮。加。蒼。耳。白。芍。龜。板。金。毛。狗。脊。經。後。期。者。逍。遙。散。皮。膚。搔

痒者。四物湯加荆芥。或古烏荊丸。肌肉頑麻者。烏頭丸。上

攻頭目暈倒者。單蒼耳散。頭項脊痛者。柴胡調經湯。頭身

痛寒熱咳嗽。怔忡。一切雜症。人參荊芥散。素

虛者。女金丹。史國公浸酒方。胎前產後皆同。養胃通心真

要法。起於胞內。為經絡之海。與手太陽小腸。手少陰心。為

養血主上為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣盛則血依時而下。憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出納之用已竭母令子虛脾亦不磨而食少食少則肺金失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心為氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃為氣血之運飲食勞倦損其中氣以血少不行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也室女扶陰抑寡居女子十四衝任盛而月事下必近二十方可匹配可見陰氣之難成也。或恣食鹹酸煎炒熱燥以致氣血上壅不通者紅花當歸散紫葳散單大黃膏如逾年未嫁或年未及而思男思傷心血火炎脾虧肺燥腎枯而血閉成癆者十分難治宜四物湯加黃芩紫芎或逍遙散加山梔芩連以養血涼血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰栝子丸亦好因怒逆者四製香附丸加黃芩生地。因驚者抱膽丸。經絕不通者左松散。寡婦鬱悶百端或慕夫不能頃忘或門戶不能支持或望子孫昌盛心火無時不起加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自

汗。肝脉弦長。當抑肝之陰氣。柴胡抑肝湯。抑陰地黃丸。如貧苦淡食者。四製香附丸。主之。有每日上午神思昏憤。怕見明處。惡聞人語。至午後方可及頭昏。腹痛驚惕。稍涉勞動。與月經來時。其症尤劇。此不得遂志之故也。宜清神養榮。四物湯加人參。茯神。陳皮。柴胡。羌活。甘草。香附。有與鬼交通者。由神不守舍。或時獨笑。或泣。脉遲伏。或如雀啄。不知度數。顏色不變者。宜茯神。羌活。蔓荊子。防風。意以仁黃芪五味子。麥門冬。石菖蒲。黃芩。甘草。水煎服。

崩漏

崩漏有虛亦有熱。熱則流通。虛則滯。血熱則流。虛則滯。凡

謂之崩下。忽然暴下。若山崩然。虛多。房勞。挾火。邪。經行犯

後。過度損傷。衝任。氣血俱虛。不能制約。經血忽然暴下。宜大補氣血。大溫經湯。氣虛者。四物湯加參芪。血虛者。四物

湯加膠艾。炒乾姜。久不止者。百子附歸丸。墨附丸。虛寒。臍冷痛者。伏龍肝散。一切虛症。內炙散。虛火涼血。地黃湯。

生地參連湯補陰丸。久者熱只飲食不調節。有因膏梁厚

下流於腎與相火合為濕熱。迫經下漏。其色紫黑腐臭。宜

鮮毒四物湯。涼血地黃湯。膠艾四物湯。加黃芩。或單芩心

丸。四物湯。或離丸。固經丸。有因飲食失節。火乘脾胃。下陷

顏容似魚病者。外見脾困。倦煩熱不卧等症。經水不時暴

至。或適來適斷。只宜舉養脾胃。加以鎮墜心火。或因四氣

之藥。補陰瀉陽。自止。升陽調經湯。升陽舉經湯。或因四氣

苦相侵。子宮為四氣相搏。則血亦難停。大槩風冷搏動者

芩官桂。或四物湯加荊芥。寒冷所棄。及年老久崩者。伏

龍肝散。加附子。鹿茸。阿膠。蒲黃。糯米糊丸服。暑月。單芩

心丸。或益元散。加百草霜。或為悲憂心痛切。悲哀甚。則胞絡

氣內動。發則心下崩。數洩血也。宜倍金散。四製香附丸。烏

藥湯。古橘歸丸。憂鬱因先富後貧。先順後逆。心事不足。

鬱火旺於血脉之中。宜四物湯加香附。白朮各一錢。地榆

黃芪。人參各五分。升麻二分。甚者加棕攔灰酒調服。心

痛甚者名殺血心痛。小產後血過多心痛。勢急須宜止且。

行。經曰。陰搏陽謂之崩。言屬熱者多也。崩乃經血錯亂。不。

昏暈。必先服五靈脂末一錢。其性能行能止。然後分虛熱。

用調和氣血之藥一二貼。後再服單五靈脂散去。故生新。

如更不止。烏紗帽散。十灰散。古黑神散。單養胃安心還舊。

血。血崩止後。宜四物湯加炒乾姜調之。氣弱加參芪。有鬱。

加香附。挾火加芩連。少許。更服二宜丸。四物湯以還。舊。

血。免致孤陽防其再發。如脾胃氣弱者。補中益氣湯。心神。

不安者。寧神膏。滋陰寧神湯。此疾有心血不足者。有心火。

帶下

帶下赤白皆濕熱。臍腹痛甚濕熱結。經曰。小腹寃熱。溲出。

下。故曰帶下。赤屬血。白屬氣。其症頭昏目眩。口苦舌乾。但盛大便。或閉或瀉。小便便澀。皆熱症也。如赤白痢濁。一服燥熱。性行垂戾。以致肝旺脾虧。而生濕熱。熱則流通。古人有用導水丸下之。繼以淡劑滲之。或苦練丸。大玄胡索散。調之。如臍腹痛者。暫以辛溫開導。如大熱多瘦婦必潮煩。溫經湯。補經固真湯。龜栢姜梔丸。是也。瘦人多熱。脉數。外症潮煩。乃陰虛火盛也。芩栢樗皮丸。帶不止者。用地骨皮一兩。生地五兩。酒十盞煎至三盞。分三次服。或白芷散。單益母丸。○白帶無痛風者。二陳湯加蒼栢南星。牛膝川芎。蕪頭風鼻涕者。蒼栢辛芎散。蕪七情者。側栢樗。濕勝肥黃痰作孽。或痛。白帶。并陽燥濕湯。四故固皮丸。○濕痰流下。滲入膀胱。宜二陳湯加二朮。升麻。柴胡。或蒼栢樗皮丸。如結痰白帶淋瀝不已者。先以小胃丹。半錢半飽。津液下數丸。候鬱積開。服芩朮芎葵丸。○通用五苓散。合四物湯。或單樗白皮炒為末。酒糊丸。血虛加四物。

湯氣虛加參朮陳皮火動加黃柏滑久加龍骨赤石脂性燥加黃連腹痛加乾姜

腥陰中冷痛何曾歇

虛因月水淋瀝不已或崩中暴下或產後去血過多以致陰虧陽竭榮氣

不升經脉凝泣衛氣下陷精氣累滯於下焦溫積而成白滑如涕下流腥臭者黃芪建中湯去桂加當歸水煎吞若

練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯

有火加黃柏有寒加桂附○寒始因亡血復亡其陽陽氣虛極帶下腥臭多悲不藥附桂湯腹痛陰冷者四物湯加

桂附常用酒煮當歸丸小鳥外感風邪傳各經胞門或中

經脉流傳臟腑若傷肝經青如泥色心經赤如紅津肺經白形如涕脾經黃如爛瓜腎經黑如衄血宜胃風湯或五

積散去麻黃主之一種白淫思慮切意思淫於外入房太甚

通用單地榆散發為筋痿久為白淫謂白物淫如白精之狀不可誤作白

帶過服熱藥又有日夜流津如清米泔或如痴膠者謂之

白崩與白淫大同多憂思過度所致。誠難治療。宜平補鎮心丹。因思傷脾胃者。四七湯下。白丸子。或歸脾湯。痞悶少食者。沉香降氣湯。因勞傷腎氣。心腎不交者。室女胎產法金鎖正元丹。小兒絲子丸。威喜丸。疏苓丸。

相同。

室女經水初下。一時驚悸。或浴以冷水。或當風取涼。故經水止而即患帶下。宜琥珀硃砂丸。孕婦帶下。

全是濕熱。宜芩朮樗皮丸。平時陰陽過多。及產後亡血下。虛風邪乘虛入於胞絡。宜煖宮丸。加姜附吳萸。或黃芪建中湯。去桂加當歸。水煎吞苦練丸。補衛調脾。循故轍。凡崩中帶下。或用升歸水煎吞苦練丸。補衛調脾。循故轍。提。如升陽調經湯。或用收澁。如伏龍肝散。白芷散。然暫止而終不止者。蓋衛司開闔而為榮血之主。脾胃為血海水液之會。衛氣與胃氣俱虛。則血液無所約制。是以古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者。四君子湯加草菓丁香木香以燥水健脾者。或用理中湯加陳皮半夏。或單半夏丸用芎歸煎湯下。或補中益氣湯平胃散。皆補衛厚脾。使氣血自循故轍。而不專於收澁也。

切奪之也。

癥瘕 與男子積聚條叅看

癥瘕冷熱都是瘕或因食積或鬱怒 瘕者堅而不移瘕者

經亦不詳雖有蛇蛟鱉肉髮虱米等名偶因食物相感假血而成形耳瘕比癥稍輕其為病所以異於男子者皆由產後及經水行時或飲食生冷以致脾虛與臟氣相結或七情氣鬱生瘕皆必挾瘀血而後成形要知癥瘕瘕瘕癥石耳○經云大腸移熱於小腸小腸移熱於大腸兩熱相搏則血溢而為伏瘕月事不利以此推之瘕瘕皆有熱者蓋瘕血亦有熱燥逼成况陽氣怒火蘊聚飲食濕熱相鬱結成未可專以寒冷論也大槩虛冷者內灸散琥珀丸溫白丸熱者消塊丸連蘿丸外貼三聖膏神効阿魏散久不愈者猪肝丸辰砂一粒用神聖代針散○瘕血四物湯加桃仁韭汁甚者加蜀葵根入玄明粉下之或桂枝桃仁湯外以韭菜搗餅熨痛處或萬痛丸桃奴散○食積三稜煎保和丸紅九子虛者白朮膏補中益氣湯熱者大承氣湯

黃連芍藥川芎乾姜甘草。或單黃連丸。小調中湯加貝母。

姜汁糊丸服。○鬱氣。白葱散。蟠葱散。七製香附丸。當歸龍。

蒼丸。○痰飲。潤下丸。或二陳湯加香附。腹痛經閉如懷胎。

枳壳桔梗。痰聚食積者。白芥丸。海石丸。附。腹痛經閉如懷胎。

面黃寒熱。夢無數。引。四肢疼痛。月事不調。如懷胎之狀。邪。

氣甚盛。令人恍惚。夜多異夢。寒熱往來。四肢不舉。陰中生。

瘡。甚者小便淋瀝。或兼帶下。小腹重痛。面色黃黑。入枚子。

臟則絕產。入於胞絡。則經閉。宜人參。荆芥散。小溫經湯。道。

逢散。通經丸。古奕玄丸。選用。○血與氣併。心腹痛連腰脇。

背脊甚。則摘搦。經候不調。謂之血氣。玄胡索散。手拈散。咳。

失笑散。單乾漆丸。數症。因痰聚氣積者。與上諸方通用。咳。

癖病治頗相同。痛。如臂。如指。如弦之狀。各曰。痲。痲者。偏僻。

在兩肋之間。有時而痛。各曰。痲。皆陰陽不。腹脹不食亦可。

和。飲食停滯。冷氣相搏而成。亦得。發。腹脹不食亦可。

懼。紅丸。子。猪肝丸。小。腸覃可。按血自通。大腸。與胃相搏。大。

腸。與胃相搏。大。腸。與胃相搏。大。腸。與胃相搏。大。腸。與胃相搏。大。

腸。與胃相搏。大。腸。與胃相搏。大。腸。與胃相搏。大。腸。與胃相搏。大。

腸。與胃相搏。大。腸。與胃相搏。大。腸。與胃相搏。大。腸。與胃相搏。大。