

序

王叔和傷寒例云今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病真  
方擬防世急則知傷寒論當時已無成書乃叔和之所搜集者雖  
分定六經而語無註次陽經中多陰經治法陰經中多陽經治法  
參錯不一後人各生議論每成一書必前後更易數條互相訾議  
各是其說愈愈亂終無定論不知此書非仲景依經立方之書  
乃救誤之書也其自序云傷寒積之莫救所以尋求古訓博採眾  
方蓋因誤治之後變症錯雜必無循經現症之理當時著書亦不  
過隨症立方本無一定之次序也余始亦疑其有錯亂乃探求三

十年而後悟其所以然之故於是不類經而類方蓋方之治病有  
定而病之變遷無定知其一定之治隨其病之千變萬化而應用  
不爽此從流溯源之法病無遁形矣至於用藥則各有條理解肌  
發汗攻邪散痞逐水驅寒溫中除熱皆有主方其加減輕重又各  
有法度不可分毫假借細分之不外十二類每類先定主方卽以  
同類諸方附焉其方之精思妙用又復一一注明條分而縷悉之  
隨以論中用此方之症列於方後而更發明其所以然之故使讀  
者於病情藥性一目顯然不論從何經來從何經去而見症施治  
與仲景之意無不吻合豈非至便之法乎余纂集成帙之後又復

鑽窮者七年而五易其稿乃無遺憾前宋朱肱活人書亦曾彙治  
法於方後但方不分類而又無所發明故閱之終不得其要領此  
書之成後之讀傷寒論者庶可以此爲津梁乎

乾隆二十四年歲在庚申閏陽月上浣洞溪徐大椿序

傷寒論類方目錄

桂枝湯類一  
十九方

桂枝湯

桂枝加附子湯

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚朴杏仁湯

小建中湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝加大黃湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

麻黃湯類二

六方

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

大青龍湯

小青龍湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

葛根湯類三

三方

葛根湯

葛根芩連湯

葛根加半夏湯

柴胡湯類四六方

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加桂枝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡加芒硝湯

梔子湯類五七方

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子乾薑湯

梔子厚朴枳實湯

梔子檗皮湯

枳實梔子豉湯

承氣湯類六十二方

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

抵當湯

抵當丸

十枣湯

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白散

麻仁丸

寫心湯類七

十一方

生姜瀉心湯

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

黃連湯

黃芩湯

黃夢加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

旋復代赭石湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

白虎湯類八方

白虎湯

白虎加入參湯

竹葉石膏湯

五苓湯類九方

四

五苓散

猪苓湯

文蛤散

茯苓甘草湯

四逆湯類十

十一方

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

四逆散

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

理中湯類十一九方

理中丸

眞武湯

附子湯

甘草附子湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

桂枝人參湯

雜方十二

廿二方

赤石脂禹餘糧湯

炙甘草湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

茵陳蒿湯

麻黃連軻赤小豆湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

黃連阿膠湯

吳茱萸湯

半夏散及湯

桃花湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

烏梅丸

白頭翁湯

牡蠣澤瀉散

蜜煎導方

瘡膿汁方

以上共一百十三方

燒棍散

傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類一

桂枝湯一

桂枝

三兩去皮

芍藥

三兩

甘草

二兩炙

生姜

三兩

大棗

十二枚擘

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服

已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力

桂枝本不能發汗故須助以熱粥內經云穀入於胃

以傳於肺肺主皮毛汗所從出飲粥充胃氣以達於肺也觀此可知傷寒不禁食矣溫覆令一時許遍身

熱微似有汗者益佳不可令如水流漓病不必除法也若如

水流漓則動營  
氣衛邪仍在

若一服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗更

服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者

一曰一夜服周時觀之服一劑盡病証猶在者更作服若汗不

出乃服至二三劑

桂枝湯全料謂之一劑三分之一謂之一服古一兩今二錢零則一劑之藥除姜棗僅一

兩六錢零一服不過五錢零矣治傷寒大症分兩不過如此一

服卽汗不再服無汗服至二三劑總以中病爲主後世見服藥得效者反令多服無效者卽疑藥誤又復易方無往不誤矣

禁生冷粘滑肉麩五辛酒酪及

臭惡等物

太陽中風陽浮而陰弱

風在外故陽脈浮衛氣有邪則不能護營故陰脈弱

陽浮者熱自發

風爲陽邪故發熱桂枝之辛以散之

陰弱者汗自由

芍藥之酸以收之甘草之甘以緩之

審惡寒浙

浙惡風

惡風未有不惡寒者但惡寒甚輕非若中寒及陰經之甚也

翕翕發熱

其熱亦不如陽明之甚

鼻

鳴乾嘔者

鼻鳴似屬陽明乾嘔似屬少陽蓋三陽相近故略有兼病但不甚耳

桂枝湯主之

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

此桂枝湯總症

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法

誤治若不上衝

者不可與之

此誤下之症誤下而仍上衝則邪氣猶在陽分故仍用桂枝發表若不上衝則其邪已下陷變病不一當隨宜施治論中誤

治諸法詳觀自明

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府卻與桂枝湯則

愈此非誤治因風邪凝結於太陽之要路則藥力不能流通故刺以解其結蓋邪風太甚不僅在衛而在經刺之以洩經氣○風

府一穴在項上入髮際一寸大筋內宛中督脈陽維之會刺入四分留三呼風池二穴在顱顫後髮際陷者中足少陽陽維之會

針入三分  
留三呼

太陽病外症未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯

病雖過期脈症屬太陽仍不離

桂枝

法

太陽病外症未解者不可下也

此禁下總訣

下之爲逆欲解外者宜服

言雖有當下之症而外症未除

亦不可下仍宜解外而後下也

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宣服

脈浮而下此爲誤下後仍浮

則邪不因誤下而陷入仍在太陽不得因已汗下而不復用桂枝也

病嘗冒汗出者此爲榮氣和衛氣和者外不諧以衛氣不共榮氣

和諧故爾榮氣和者言榮氣不病非以營行脈中衛行脈外復發調和之和故又中言之

其汗營衛和則愈宜桂枝湯

自汗與發汗迥別自汗乃營衛相離發汗使營衛相合自汗傷正發汗驅邪

復發者因其自汗而更發之則榮衛和而自汗反止矣

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時

未熟發汗則愈宜桂枝湯主之

無他病太陽諸症不必備而惟發熱自汗故亦用桂枝湯

傷寒不大便六七日

宜下頭痛有熱者未可與承氣湯

太陽症仍在不得以

日久不便而下也○按未可二字從金匱增入傷寒論失此二字

其小便清者知不在裡仍在表

便赤爲裡有熱當須發汗若頭痛者必衄

汗出而頭痛未解則在經而血動矣

宜桂枝

湯