

醫宗金鑑卷拾壹

音無定處中  
發無定處下



神應消風散

追風散

磨風丸

類聚祛風散

醉仙散

通天再造散

換肌散

補氣瀉榮湯

何首烏酒

骨搜風散

月散

楊梅瘡

歸靈內托散

金蟬脫殼酒

獲面散

翠雲散

鵝黃散

獲從丸

搜風解毒湯

化毒散

豬脰子湯

西聖復元丸

結毒紫金丹

天麻歸子

楊梅瘡

結毒楊梅

通鼻散

硫黃不二散

結毒靈藥

鉛回散

四物消風飲

胡麻丸

密陀僧散

浮萍丸

豆淋酒法

蒼耳膏

蛇散

盧葉散

結毒楊梅

香透風

紫白癰風

白散風

麻瘋風

御纂醫宗金鑑卷七十三

編輯外科心法要訣目錄

發無定處

中

大麻風

楊梅瘡

楊梅結毒

赤白遊風

紫白癰風

白駁風

癰瘍風

丹毒

粟瘡作癰

枯筋箭

編輯外科心法要訣

大 麻 風 圖

大麻風發在遍身麻木次生自肩皮兼起紅斑鬚眉脫落



# 大麻風

麻風總屬毒癘成。其因有三五損風。五死證見真惡候。初病能守或可生。

註此證古名癘風。癘風者有毒之風也。經云。衄風成爲癘。又云。癘者有營氣熱腐。其氣不清。故使其鼻柱壞而色敗。皮膚瘍潰。毒風客於衄而不去。名曰癘風。今人呼爲大麻風。一因風土所生。中國少有。此證惟烟瘴地面多有之。一因傳染。或遇生麻風之人。或父母夫妻。

家人遞相傳染、或在外不謹、或糞坑房室、床鋪衣被不潔、一因自不調攝、洗浴乘涼、希圖快意、或露臥當風、睡眠濕地、毒風襲入血脈、其因名雖有三、總屬天地厲氣、感受不覺、未經發泄、積久而發、徧身麻木、次起白屑紅斑、蔓延如癰形、若蛇皮脫落成片、始發之時、自上而下者順、自下而上者逆、漸來可治、頓發難醫、風毒入裏、化生爲蟲、蟲蝕五臟、則形有五損、肺受病、先落眉毛、肝受病、面起紫皰、腎

受病脚底先穿脾受病全身如癰心受病先  
損其目此爲險證又有五死證如麻木不仁  
者爲皮死割切不痛者爲肉死潰爛無膿者  
爲血死手足脫落者爲筋死鼻梁崩塌眼弦  
斷裂脣翻聲啞者爲骨死若五死見一卽爲  
敗惡不治之候也此證初覺卽服萬靈丹汗  
之次宜神應消風散追風散磨風丸次第服  
之牙齦出血用黃連貫衆等分煎湯漱之外  
搽類聚祛風散兼用地骨皮荆芥苦參細辛

各二兩，河水煎湯，浸浴熏洗。若遇損敗之證，在上部則服醉仙散，在下部則服通天再造散。若鼻梁塌壞，用換肌散服之。患者稍露虛象，卽以補氣瀉榮湯服之，兼用何首烏酒飲之。若能清心寡慾，戒口早治，或有可生。若口味不能清淡，色慾不能斷絕，卽愈後仍不免再發，終於不救。

裨應消風散

全蝎

白芷

人參 各一兩

右研細末每用二錢勿食晚飯次日空心溫酒調服覺身微躁爲效

方歌  
神應消風散  
癘風身麻白屑起斑紅蠟芷人

參各一兩空心酒服麻木平

追風散

錫紋大黃 六兩

川鬱金 一兩八錢  
炒

皂角刺 一兩五錢

共研細末每用五錢加大風子油一錢五分

朴消一錢五更空心溫酒調服直待辰時又  
如前調藥加熟蜜少許服之以蜜解口切不  
可以良久痛瀉數次不妨以稀粥補之如第  
一日服消風散第二日卽服此藥第三日服  
磨風丸周而復始又如此服之瘦弱者十日  
內追風散只用一服老弱者勿服

方歌追風散用川鬱金皂刺大黃研末勻初服消

風次用此風油消酒調服神

磨風丸

豨薟草

牛蒡子

炒

麻黃

蒼耳草

細辛

川芎

當歸

荊芥

蔓荊子

防風

車前子

威靈仙

天麻

何首烏

羌活

獨活

各一兩

其爲細末酒打麴糊爲丸如梧桐子大每服

六七十丸溫酒送下日用二服

歌  
麻風丸  
蒼勞麻黃蒼細芎歸荆蔓防車威天

麻何羌獨追風服後用此方

類聚祛風散

硫黃

寒水石

枯白礬

貫衆 各二兩

蛇床子 一兩

朴消 五錢

共研細末臘月豬脂搗爛調敷

方  
類聚祛風散  
硫黃寒水枯礬消蛇床貫衆細

研豬脂搗崙搽遍體癰風瘡

醉仙散

牛蒡子

炒

胡麻

枸杞子

蔓荊子 各一兩

苦參

白蒺藜

防風

花粉 各五錢

共研細末每服一錢加輕粉一分二釐研勻

茶清調服晨午晚各一服五七日後先於牙

縫內出臭黃涎渾身疼悶如醉然後利下膿

血惡物臭氣病根乃去矣

方歌 酩仙上部癘風重牛蒡胡麻枸蔓荆苦參茱

藜防花粉服加輕粉用茶清

通天再造散

大黃

一兩煨

皂角刺

一兩五錢

鬱金

五錢

白牽牛

六錢頭末半生半炒

共研細末每服二錢或三錢早晨面東醇酒

調下當日利下惡物或膿或蟲爲效

方歌 通天再造治癘風敗證先從下部攻鬱金大

黃牽牛刺晨服酒調面向東

換肌散

烏梢蛇

白花蛇

蚯蚓

各一兩  
去土

細辛

本鱉子

白芷

天麻

連莖者

赤芍

蔓荊子

當歸

威靈仙

荊芥穗

甘菊花

不灰木