

祖刻

上海中医药大学

辛酉年秋印



祖劑卷之四

萃亭施

沛市大德齋

丹越鞠丸

一名芎朮丸治六鬱胸膈痞滿或
酸嘔吐飲食不化薛立齋方加山查

麥芽

蒼朮

米泔浸炒

撫芎

山梔

炒黑

香附

醋炒

神麴

炒香

右各等分爲末滴水丸築豈大每服六七十

丸白沸湯下

春加防風夏加苦參秋冬加吳
茱萸乃經所謂升降浮沉則順



之寒熱溫
涼則逆之

按丹溪曰氣血冲和萬病不生一有拂鬱
諸病生焉故人身諸病多生于鬱蒼朮撫
芎總解諸鬱隨証加入諸藥凡鬱皆在中
焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假如食
在氣上只提其氣則食自降矣又云蒼朮
山梔大能除鬱因食冷物鬱火于脾胃中
脾胃屬土伏火地中此病多因血虛而得
又有胃虛過食冷物鬱陽氣于脾胃中者

食鬱越翅丸

即越鞠丸加山查
砂仁治食噎膈

茱山五鬱湯

即越鞠丸去蒼朮加
青皮甘草能解諸鬱

痰火越鞠丸

即越鞠丸加海石南星瓜蒌
青黛治痰因火動令人錯雜

火鬱越鞠丸 卽越鞠丸加青黛治七情拂鬱吞酸小便赤脉來沉數者

六鬱湯 卽越鞠丸合二陳湯加砂仁治諸氣鬱加烏藥木香○痰鬱加南星枳殼小兒

○濕鬱加白朮倍蒼朮○熱鬱加黃連倍

山梔○食鬱加山楂

麥芽青皮倍神麴

氣鬱湯 卽越鞠丸無神麴合二陳湯加貝母蘇葉木香枳殼生薑煎服治因求謀

不遂或橫逆之求或貧窘所迫或暴怒所傷或悲哀所致或思念太過皆為氣鬱其

狀胸滿脇痛脉

沉而澹者也

濕鬱湯 卽越鞠丸無神麴加山梔合二陳湯白朮厚朴羌活獨活治因雨露所襲或嵐



氣所侵或坐臥濕地或汗出衣衫皆為濕
鬱其狀身重而痛倦怠嗜臥遇陰寒則
脉沉而細
緩者是也

血鬱湯

用香附便製二錢牡丹皮赤麴
山查麥芽蘇木川山甲降香各一

紅花七分木酒各半煎去滓入堯仁泥七
分韭汗半盞和勻溫服治七情鬱結盛怒
叫呼或起居失宜或挫閃致瘀飢飽勞役
皆能致血鬱其脉沉澹而花胸脇常如針
刺者是也

熱鬱湯

即涼膈散去硝黃加麥門冬鬱金瓜
黃穢治非陰虛非陽陷亦不發熱而

常自蒸蒸不解者或問何不用蒼朮香附
撫芎曰火就燥燥藥皆能助火故不用也



仲景枳朮湯

治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作

枳實

七枚 苦寒

白朮

二兩 甘溫

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中

裏即當散也

潔古枳朮丸用枳實麩炒四兩白朮土炒八兩為細末荷葉煨

飯入湯杵膏去滓為丸如棗大每服五六十丸清米飲下或用荷葉陳米煎湯發丸更妙治胸膈痞滿宿食不消能強胃

半夏枳朮丸

即枳朮丸加半夏四兩薑製治食冷傷脾胃胃中有痰

橘皮枳朮丸

即枳朮丸加橘皮四兩治老幼元氣虛弱飲食不消或藏府不



調心下

痞悶

橘半枳朮丸

即枳朮丸加橘皮半
夏各四兩寬中健脾胃

木香枳朮丸

即枳朮丸加木香二兩破痰
順氣消化宿滯開胃進食

香砂枳朮丸

即枳朮丸加砂仁香附各二兩
治脾胃虛弱飲食減少胃膈痞

悶

鞠蘗枳朮丸

即枳朮丸加神麴麥蘗炒各四
兩治飲食過多不能剋化以致

心腹脹

悶不快

丹溪加味枳朮丸

即鞠蘗枳朮丸加半夏山查各
四兩薑黃陳皮各二兩木香一



兩治痞消食化痰止嗽寬中利膈助胃和脾一方無半夏名枳實丸治積塊一方無

橘皮半夏木

香有砂仁

橘連枳木丸

即枳木丸加橘皮黃連各四兩治傷肉味痞滿

三黃枳木丸

即枳木丸加黃芩黃柏黃連清痰利胸膈一方加陳皮神麴

去黃柏加大黃治傷肉食麴食辛辣味厚之物填塞胸中致滿悶不快

芩連枳木丸

即枳木丸加黃芩黃連各二兩清心化痰

平補枳木丸

即枳木丸加陳皮黃連各二兩白芍藥三兩人參木香各一兩

減白朮三兩枳實三兩平補氣血去痰通氣



木香乾薑枳朮丸

即枳朮丸加木香乾薑各二兩破除寒食滯氣

木香人參枳朮丸

即枳朮丸加木香乾薑人參陳皮開胃進食

枳實導滯丸

即枳朮丸加大黃黃連黃芩麴蘖茯苓澤瀉治傷濕熱之物不

得消化而

作痞滿

枳實消痞丸

即枳朮丸加四君子湯黃連半夏厚朴乾薑麥芽治心下虛痞

惡食懶倦右

關脉弦者

除濕益氣丸

即枳朮丸加神麴荀子炒黃芩紅花治傷濕麴心腹滿肢體沉

重

白朮丸

即枳朮丸加橘半神麴黃芩

香薷和中丸

即橘半枳朮丸加水香白薷

加草薷各二兩治痰食氣逆如胃脘痛

消飲丸

用白朮人錢枳實麩炒半兩茯苓去

皮乾薑泡各三兩右為細末煉蜜和丸如梧子大每服五十九溫米飲下治療

酒澀停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗耳聾

術香和中丸

用白朮一兩二錢枳實麩炒二錢半半夏製陳皮去白各一兩

厚朴製一兩紙榔四錢半木香不見火三錢半甘草炙三錢半右為末薑汁浸蒸餅



和丸如梧桐子大每服六七十丸食前白湯送下治病久虛弱懨懨不能食而藏中或祕或滯此胃氣虛弱人常服則和中理氣消痰去濕厚腸胃進飲食

茯苓丸

即只木丸合六君子湯加葛根乾薑肉桂每味各一兩如法炮製為細末

煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫米飲空心下治妊娠阻癰心中煩憤頭目眩重憎聞食氣嘔逆吐悶顛倒不安四肢困弱不自勝持常服此藥消痰水冷能食強力養胎當先服半夏茯苓湯次進此藥

複方

枳朮二陳湯

即枳朮湯合二陳湯治脾胃痰飲胸膈不利

香連丸

出兵部手集治赤痢諸痢裏
急後重腹痛等症其效如神

苦寒

木香 辛溫

右二味等分搗篩白蜜丸如梧子大每服一

三十丸空腹飲下日再服入冷者以煨蒜搗

和丸之不拘大人嬰孺皆效
易簡方黃連用吳茱萸炒過四

兩木香麴煨一兩粟米

連丸加煨熟柯子肉治小兒冷熱痢加煨

熟肉豆蔻又治小兒瀉痢加白附子尖又

治小兒氣虛瀉痢腹痛○劉河間治久痢

加龍骨○朱丹溪治禁口痢加石蓮肉○

王氏治痢而渴者加身梅肉以阿膠化和



爲丸○濟生方秘傳香連丸用黃連四兩
木香二兩生薑四兩以薑鋪砂鍋底次
連上鋪香新汲水三碗煮焙研醋調蒸
糊爲丸如常服五次○韓飛霞四製黃連
丸用黃連一斤分作四分一分用酒浸
一分用薑汁炒一分用吳茱萸湯浸炒一
分用益智仁同炒去益智研末加白芍藥
酒煮切焙四兩使君子仁焙四兩廣木香
二兩爲末蒸餅和丸綠豆大每服三十丸
米飲食前下日三服治五疳六痢忌豬肉
冷水

愚按痢疾古名滯下此濕熱之證也蓋黃
連性寒而燥寒能清熱燥能去濕故治痢
以之爲君佐以木香之辛溫以疎通滯
使君臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所
以有成功而無偏勝之害也然治痢當分

和劑

大香連丸

用黃連去蘆毛二十兩吳茱萸去

初中末三治初宜用香連加檳榔大黃等
分爲丸以順利之中宜竟用香連或連用
茱萸炒若久而不止方用訶子肉蔻
龍骨等藥止瀉庶不失先後之序

用木香不見火四兩入錢八分爲細末醋

和爲丸如梧子大每服二十丸飯飲吞下

空心食前日進二三服治男婦腸胃虛弱

冷熱不調泄瀉煩渴水穀不化腹脹腸鳴

胃扁痞悶脇肋脹滿或下痢膿血裏急後

重夜起頻并不思飲食或小便不利肢體

怠惰漸即瘦弱○薛立齋將黃連茱萸二

味用熟水拌勻入磁器內置熱湯中頓一

日同炒紫黃色去茱萸用連爲末每末

四兩入木香末一兩淡醋末飲爲丸

局方戊巳丸

用黃連去鬚吳茱萸去梗炒白芍藥各等分爲細末蒸餅糊爲丸如梧桐

子大每服二十丸濃煎米飲空心下服治脾胃受濕泄利不止臍腹刺痛

不化亦治小

兒疳氣下痢

百變通丸

用川黃連去毛吳茱萸湯泡過各二兩同炒香揀出各爲末以粟米飯和

丸如桐子大各收每服三十丸赤痢用黃

連丸甘草湯下白痢用茱萸丸薑湯下赤

白痢各用十五丸米湯下此乃

浙西河山純老方救人甚効

冊左金丸

用黃連六兩茱萸一兩同炒爲末神

白湯下○薛立齋用白朮陳皮湯下治肝

火臍脇刺痛或發寒熱或頭目作痛泄瀉

淋秘一切肝
文之症皆効

和劑黃連阿膠丸

用黃連三兩茯苓二兩為末

子大每服二十九丸食前米飲下治脹胃
虛冷熱不調下痢赤白狀如魚腦裏急後
重腹痛口燥
煩渴便閉

局方駐車丸

用黃連三十兩乾薑炮十兩當歸去
蘆十五兩為細末另用阿膠十五兩

炒珠為末以醋煮成膏和前末為丸每服
三十丸食前米飲下治下痢腹痛無問新
舊冷熱膿血
日夜無度者

仲景

乾薑黃芩黃連人參湯

用黃連黃芩乾薑人
參治傷寒本自寒下

且劑

卷之四

八

崑三



醫復吐下之若
食入口即吐者

局方小駢車丸

用當歸去蘆二兩訶子炮去核
兩乾薑炮黃連去須各三兩

用阿膠一兩三分水煎汁和丸如粟米
每服二十丸飯飲下治小兒冷熱不調乳
哺失節泄瀉不止下痢鮮血赤多白少腹
痛後重腸胃虛滑便數頻併減食困倦

太平丸

用天門冬麥門冬並去心知母貝母
款冬花杏仁去皮尖各二兩當歸生

地黃黃連熟地黃阿膠蛤粉炒各一兩半
蒲黃京墨桔槓薄荷各一兩麝香少許另
研右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一
丸臨睡細嚼薄荷湯送下治癆瘵
癰並宜噙服

決定除根