

脈因證治卷下

丹溪朱氏脉因證治目

後學湯望久來蘇氏校輯

下卷

二十八宿食留飲

附痰飲

二十九噎氣吞酸嘈雜

附滯氣

三十積聚

附痰塊

三十一消渴

三十二痞

三十三腫脹

三十四嘔吐噎

三十五噎隔

三十六瘡瘍

三十七癰疽

附癭瘤

三十八乳癰

三十九瘰

四十發癰

四十一丹疹

四十二金瘡

四十三傾仆

四十四百藥中傷

四十五癲狂

附癩

四十六驚悸

四十七疝癰

四十八脚氣

四十九蟲

附狐惑

五十喉痺

五十一口

五十二舌

五十三目

五十四耳

五十五鼻

五十六齒

五十七結燥

五十八痔漏

五十九婦人產胎

六十滯下

六十一經候

六十二崩漏

六十三小兒証

六十四雜証

六十五雜治

六十六五臟証

六十七情証

六十八雜脉

六十九察視

七十汗

脉因証治目終

丹溪朱氏脉證治卷下

二十八宿食留飲

附痰飲

脉寸口脉浮大按之反澁尺中亦微而澁故有食痰寸口脉緊如轉索左右無常者有宿食脉滑而數者實也有宿食當下之脉浮而滑者宿食下利不欲食者宿食

脉沉病若傷寒者宿食留飲宜下之脉短疾而滑者酒病脉浮細而滑者傷飲

因飲食自倍腸胃乃傷腹加之則胃化遲難故宿食飲飲水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲

冷則傷肺病則爲咳滿水泄重而爲蓄積食者物
也有形之血也因而食飽筋脉橫解腸澀爲重或
嘔或吐或下利

証治千金云胃中有澀食冷物則痛不能食有熱物
則欲食大腹有宿食卽寒慄發熱如瘧狀小腹有
宿食當暮發熱明旦腹血

三因云有飲在中脘則嘈有宿食則吞酸

李論戊己火衰不能制物食則不消傷其太陰填
塞悶亂凡凡欲吐甚則心胃大痛犯其血也治宜
分寒熱輕重如初得上部有脉下部無脉其人當

吐不吐卽死宜瓜蒂散輕則內消宿砂炒曲等是也重則除下承氣湯是也寒則溫之半夏乾薑三稜莪朮是也熱則寒之大黃黃連枳實麥芽是也飲則下行或大飲而氣逆或寒冷而傷肺病則喘咳痰涎水腫輕則宜取汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散半夏朮殼之類是也重則爲蓄積爲滿者三花神祐是也

張論飲食不消分貧富而治之富者乃膏粱太過以致中脘停留脹閉痞膈醉心宜木香道飲主丸之病者乃動作勞飲食粗酒食傷之以致身腹滿

悶時吐酸水宜進食丸主之

又有重者病症同太陰傷寒止脉沉可與導飲丸治之

又論留飲蓄水而已雖有四有五之說止一証也夫鬱憤而不伸則肝氣乘脾之氣而不流亦爲留飲肝主慮久不決則氣不行脾主思久則脾結亦爲留飲因飲水脾胃失衰不能布散亦爲留飲飲酒過多胞經不及滲洩亦爲留飲渴飲冷水乘快過多逸而不動亦爲留飲夫水者陰物也但積水則生濕停酒則滿燥久而成痰左脇同肥氣右脇

同息賁上入肺則噉下入大腸則瀉入腎則涌在
太陽爲支飲皆內氣逆得之故濕在上者目黃面
浮在下者股膝腫滿在中者支飲痞膈痰逆在陽
不去久而滯氣在陰不去久而成形宜治以導水
禹功調以五苓葶藶椒目逐水爲全矣

有傷西瓜冷水羊乳寒濕之物宜 白朮 二錢

川烏 五分 防風 一錢 丁香 一枚 甘草 錢 灸一

傷羊肉麵熱之物宜 白朮 黃芩

黃連 各七錢 大黃 二錢 甘草 灸五分 如心下痞

枳實 腹瀉 白芍藥 一錢 腹脹

厚樸

胸中不利

枳殼

胸

中寒

陳皮

渴者白茯苓

腹

中窄

蒼朮

體肢沉重

蒼朮

大抵傷冷物以巴豆爲君

傷熱物以大黃爲

君

檳榔丸

治傷之輕者飲食不化心腹鼓脹出劉

檳榔

二錢

陳皮

八錢

牽牛頭末

四錢

酢糊丸梧子大薑湯下二十丸

雄黃丸

治傷之重脇肋虛脹者

雄黃

一兩另研

巴豆

五錢生用去油

丸服

法同心痛

瓜蒂散 主吐心胸卒病悶亂急以治之

瓜蒂

赤小豆

各三錢

細末之每服一錢溫酒下

枳實丸 治傷食

枳實

半兩

白朮

一兩

曲丸

木香

檳榔

青皮

此三味氣滯加之

大黃

黃芩

連

三味濕熱加

之

蘿蔔子

連

澤瀉

伏濕痞悶加之

梔

病後食傷加之

半夏

豆粉

濕麴油膩加之

草豆蔻

稜莪

傷冷硬加之

乾薑

傷水加之

宿砂

丁香

心胃痛加之

參

傷胃加之

解醢湯

治傷酒

白豆蔻

砂仁

生薑

葛花

各半

兩
茯苓

猪苓

去皮

陳皮

去白

參

朮

各一兩半

青皮

三錢

曲

炒

澤瀉

各二錢五分

木

香

五分

右爲末白湯送下

秘方

治胃中有物惡食

二陳湯加

朮

山查

川芎

蒼朮

曲炒

神祐丸

治留飲懸飲脉弦

又治脉伏其人欲自

利難利心下續堅滿此爲留飲欲去故也

茯苓桂朮湯

治心下有痰飲胸脇支滿目眩

茯苓

桂

朮

甘草

大青龍湯

治溢飲體痛當發其汗

麻黃

七錢

桂

甘草

各二錢五分

石膏

雞子大

杏仁

半夏

濕加

澤瀉湯

治心下有支飲其人苦胃眩支飲不得息

加葶藶棗

樸黃湯 治支飲胸痛

大黃

厚樸 各等分

二陳湯

小半夏湯

治嘔家本渴今反不渴心下

有支飲故也治光渴却嘔水停心下此屬飲加茯苓

苓

五苓散

治瘦人臍下有悸者吐涎沫而顛眩水也

亦治停痰宿水

破飲丸

治五飲結爲癰瘕支飲胸滿吐逆心

痛大能散氣

葶撥

胡椒

丁香

宿砂