

余之溫散卽以理陰煎及大溫中飲爲增減此雖一從陽分
一從陰分其跡若異然一逐於外一托於內而用溫則一也
學者當因所宜酌而用之○若陰勝之時外感寒邪脉細惡
寒或背畏寒者乃太陽少陰證也加細辛一二錢甚者再加
附子一二錢眞神劑也或并加柴胡以助之亦可○若陰虛
火盛其有內熱不宜用溫而氣血俱虛邪不能解者宜去薑
桂單以三味加減與之或止加人參亦可○若治脾腎兩虛
水泛爲痰或嘔或脹者於前方加茯苓一錢半或加白芥子
五分以行之○若泄瀉不止及腎泄者少用當歸或并去之

加山藥扁豆吳茱萸破故肉豆蔻附子之屬○若腰腹有痛

加杜仲枸杞○若腹有脹滯疼痛加陳皮木香砂仁之屬

養中煎四

治中氣虛寒為嘔為泄者

人參

一二錢

山藥

炒二錢

白扁豆

炒二三錢

炙甘草一錢

茯苓

二錢

乾薑

炒黃一錢二錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如噎腐氣滯者加陳皮一錢或

砂仁四分○如胃中空虛覺餒者加熟地三五錢

溫胃飲五

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臍寒

嘔惡胎氣不安等證

人參 一二三錢
或一兩

白朮 炒一二錢
或一兩

扁豆 二錢
炒

陳皮 一錢或
不用

乾薑 炒焦一
二三錢

炙甘草 一錢

當歸

一二錢滑
泄者勿用

水二鍾煎七分食遠溫服○如下寒帶濁者加破故紙一錢

○如氣滯或兼胸腹痛者加藿香丁香木香白豆蔻砂仁白

芥子之屬○如兼外邪及肝腎之病者加桂枝肉桂甚者加

柴胡○如脾氣陷而身熱者加升麻五七分○如水泛為痰

而胸腹痞滿者加茯苓一二錢○如脾胃虛極大嘔大吐不

能止者倍用參朮仍加胡椒二三分許煎熟徐徐服之

五君子煎 六

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼濕者

人參

二三錢

白朮

茯苓

各二錢

炙甘草

一錢

乾薑

炒黃一
二錢

水一鍾半煎服

六味異功煎 七

治證同前而兼微滯者

卽前方加陳皮一錢○此卽五味異功散加乾薑也

參薑飲 八

治脾肺胃氣虛寒嘔吐欬嗽氣短小兒吐乳等

證

人參

三五錢
或倍之

炙甘草

三五分

乾薑

炮五分或一二錢或
用煨生薑三五片

水一鍾半煎七八分徐徐服之○此方或陳皮或薑棧或茯苓皆可酌而佐之

胃關煎九

治脾腎虛寒作瀉或甚至久瀉腹痛不止冷痢

等證

熟地

三五錢
或一兩

山藥

炒二錢

白扁豆

炒二錢

炙甘草

一二錢

焦乾薑

一二錢
三錢

吳茱萸

製五七分

白朮

炒一二錢
三錢

水二鍾煎七分食遠溫服○瀉甚者加肉豆蔻一二錢麪炒

用或破故紙亦可○氣虛勢甚者加人參隨宜用○陽虛下

脫不固者加製附子一二三錢○腹痛甚者加木香七八分

或加厚朴八分○滯痛不通者加當歸二三錢○滑脫不禁者加烏梅二個或北五味子二十粒○若脾邪侮脾者加肉桂一二錢

佐關煎十

治生冷傷脾瀉痢未久腎氣未損者宜用此湯

以去寒濕安脾胃此胃關煎之佐者也

厚朴

炒一錢

陳皮

炒一錢

山藥

炒二錢

扁豆

炒二錢

炙甘草

七分

猪苓

二錢

澤瀉

二錢

乾薑

炒一錢

肉桂

一二錢

水一鍾半煎服○如腹痛甚者加木香二五分或吳茱萸亦

可○如瀉甚不止者或破故紙或肉豆蔻皆可加用

抑扶煎

十

治氣冷陰寒或暴傷生冷致成瀉痢凡初起血

氣未衰脾腎未敗或脹痛或嘔惡皆宜先用此湯此胃關煎
表裏藥也宜察虛實用之其有寒濕傷臟霍亂邪實者最宜
用此

厚朴

陳皮

烏藥

各一錢五分

猪苓

二錢

澤瀉

二錢

炙甘草

一錢

乾薑

炮一錢二分

吳茱萸

製五分七分

水一鍾半煎七分食遠溫服○如氣滯痛甚者加木香五七分或砂仁亦可○如血虛多痛者加當歸二錢○如寒濕勝

者加蒼朮一錢半

四維散

十

治脾腎虛寒滑脫之甚或泄痢不能止或氣虛

下陷二陰血脫不能禁者無出此方之右

人參

一兩

製附子

二錢

乾薑

炒黃二錢

炙甘草

一二錢

烏梅肉

五分或一錢酌其味之微甘隨病人之意而用之或不川此即四味回陽飲也

右為末和勻用水拌濕蒸一飯頃取起烘乾再為末每服一

二錢溫湯調下

鎮陰煎

十

治陰虛於下格陽於上則真陽失守血隨而溢

以致大吐大動六脉細脫手足厥冷危在頃刻而血不能止

者速宜用此使孤陽有歸則血自安也如治格陽喉痺上熱者當以此湯冷服

熟地 一二兩

牛膝 二錢

炙甘草 一錢

澤瀉 半錢

肉桂 一二錢

製附子 五七分或一二三錢

水二鍾速煎服○如兼嘔惡者加乾薑炒黃一二錢○如氣

脫倦言而脉弱極者宜速速多加人參隨宜用之

歸氣飲 十

四

治氣逆不順呃逆嘔吐或寒中脾腎等證

熟地 二五錢

茯苓 二錢

扁豆 二錢

乾薑 炮

丁香

陳皮 各一錢

藿香 一錢五分

炙甘草 八分

水一鍾半煎七分食遠溫服○中氣寒甚者加製附子○肝

腎寒者加吳茱萸肉桂或加當歸

煖肝煎十五

治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣等證

當歸二三錢

枸杞三錢

茯苓二錢

小茴香二錢

肉桂一二錢

烏藥一錢

沉香一錢或木香亦可

水一鍾半加生薑三五片煎七分食遠溫服○如寒甚者加

吳茱萸乾薑再甚者加附子

壽脾煎十一名攝營煎

治脾虛不能攝血等證凡憂思鬱

怒積勞及誤用攻伐等藥犯損脾陰以致中氣虧損神氣不

寧大便脫血不止或婦人無火崩淋等證凡兼嘔惡尤為危
候速宜用此單救脾氣則統攝固而血自歸源此歸脾湯之
變方其效如神若犯此證而再用寒涼則胃氣必脫無不卽
斃者

白朮 二三錢

當歸 二錢

山藥 二錢

炙甘草 一錢

棗仁 錢半

遠志 制三錢五分

乾薑 炮一二錢

蓮肉 去心炒二十粒

人參 隨宜一二錢
急者用一兩

水二鍾煎服○如血未止加烏梅一個凡畏酸者不可用或
加地榆一錢半亦可○滑脫不禁者加醋炒文蛤一錢下焦

虛滑不禁加鹿角霜二錢爲末攪入藥中服之氣虛甚者加
炙黃芪二三錢○氣陷而墜者加炒升麻五七分或白芷亦
可○兼溏泄者加補骨脂一錢炒用○陽虛畏寒者加製附
子一二三錢○血去過多陰虛氣餒心跳不寧者加熟地七
八錢或一二兩

三氣飲

七

治血氣虧損風寒濕三氣乘虛內侵筋骨歷節

痺痛之極及痢後鶴膝風痛等證

當歸

枸杞

杜仲

各二錢

熟地

三錢或五錢

牛膝

茯苓

芍藥

酒炒

肉桂

各一錢

北細辛 或代以獨活

白芷

炙甘草 各一錢

附子 隨宜一錢

水二鍾加生薑三片煎服○如氣虛者加人參白朮隨宜○風寒勝者加麻黃一二錢○此飲亦可浸酒大約每藥一斤可用燒酒六七升浸十餘日徐徐服之

五德丸 十人

治脾腎虛寒飧泄驚漉等證或暴傷生冷或受

時氣寒濕或酒濕傷脾腹痛作泄或飲食失宜嘔惡痛泄無火等證

補骨脂 四兩酒炒

吳茱萸 製二兩

木香 二兩

乾薑 四兩炒

北五味

二兩或以肉豆蔻代之
麴炒用或用烏藥亦可

湯浸蒸餅九桐子大每服六七十丸甚者百餘丸滾白湯或

人參湯或米湯俱可下○腹痛多嘔者加胡椒二兩更妙

七德丸

十丸

治生冷傷脾初患瀉痢肚腹疼痛凡年壯氣血

未衰及寒濕食滯凡宜和胃者無不神效此卽佐關煎之偏

裨也

台烏藥

吳茱萸

製

乾薑

炒黃

蒼朮

炒各二兩

木香

茯苓

各一兩

補骨脂

炒四兩

神麴糊丸桐子大每服七八十丸或百丸滾白湯送下

復陽丹^{十二}

治陰寒嘔吐泄瀉腹痛寒疝等證

附子^製

炮薑

胡椒

北五味^炒

炙甘草^{各一兩} 白麪^{二兩}
^{炒熟}

右爲末和勻入溫湯搗丸桐子大每服一錢隨證用藥引送

下

黃芽丸^{二十}

治脾胃虛寒或飲食不化

泄瀉吞

酸嘔吐等證此藥隨身常用甚妙

人參^{二兩} 焦乾薑^{三錢}

煉白蜜爲丸芡實大常嚼服之

一 蒸丹

治脾腎虛寒不時易瀉腹痛陽痿怯寒等證○

此卽參附湯之變方也

人參

製附子

各等分

煉白蜜丸如綠豆大每用滾白湯送下三五分或一錢凡藥

餌不便之處或在途次隨帶此丹最妙

九 蒸丹

二

治脾腎虛寒如五德丸之甚者

熟地

八兩

製附子

四兩

肉豆蔻

麩炒二兩

焦薑

吳茱萸

補骨脂

酒炒

萆薢

炒

五味子

炒各

二兩

粉甘草

炒一兩

煉白蜜爲丸或山藥糊丸如桐子大每服六七十丸或百丸

滾白湯下○如氣虛者加人參或二兩或四兩尤妙甚

溫臟丸

二

治諸虫積既逐而復生者多由臟氣虛寒宜溫

健脾胃以杜其源此方主之

人參

隨宜用無亦可

白朮

米泔浸炒

當歸

各四兩

芍藥

酒炒焦

茯苓

川椒

去合口者炒出汗

細樨肉

史君子

煨取肉

檳榔

各二兩

乾薑

炮

吳茱萸

湯泡一宿炒各一兩

右爲末神麴糊爲丸桐子大每服五七十丸或百丸饑時白湯下○如臟寒者加製附子一二兩○臟熱者加黃連一二