

感冒
瘟疫
補益
陽痿
附瘴氣

集驗良方

卷二

集驗良方目錄卷二

感冒門

參蘓飲

救苦丹

治冬至後至春分前受寒氣

神效寸金丹

加味調中飲

川芎茶調散

治虛弱腠理不

密易於感冒風寒

開結丸

六神通解散

五積散

人參散毒散

太乙紫金丹

治一切飲食藥毒

治南方山嵐瘴氣

治癰疽發背

治陰陽二毒

治赤白痢疾

治男婦急中癲邪

治中風中氣口眼歪斜

治一切惡蛇風犬傷

治新久瘧疾

治小兒急慢驚風

治牙疼

治小兒因父母遺毒

治打撲傷損

治湯火傷

治年深月久

頭脹頭疼
太陽痛

治婦女經水不通

治傳尸癘瘵

治遇天行疫症

治傷寒發汗方

一粒金丹

呂真人達玄散

大金丹

瘟疫瘴氣門

升麻葛根湯

敗毒散

菩提丸

秘傳解瘟散毒湯

治瘟疫消斑飲

加減敗毒散

治瘟方

辟邪丸

辟瘟丹

普濟消毒散

青黛湯

預防瘟疫方

治大頭瘟

項腫蝦蟆瘟病

治大頭瘟

頸臉皆腫

犀角清毒飲

發汗散

治瘟毒大熱之症

治大熱大煩晝夜不退

治瘴氣湯

治瘴氣方

廣濟丸

二聖救苦丹

除瘟救苦丹

普救五瘟丹

行軍散

補益門

治五癆七傷

咳嗽吐血等症

五子益腎養心丸

烏鬚種子方

補天大造丸

返本丸

滋陰補精種玉丸

菊英丸

保真丸

七精丸

八聖丹

少陽丹

女貞丹

滋陰大補丸

全羊丸

魚鰾丸

綿花子丸

固精種子羊腎丸

治男女癆症

坎離丸

大增力丸

服烏麻丸方

加味瓊玉膏

治形體黑瘦枯槁

治虛弱枯瘦食而不化

秘傳秋石丹

治癆蟲

治癆熱

補氣湯

補精膏

服牛骨髓法

養老膏

養老丹

燒香治癆方

九轉丹

滋陰百補丸

長春方

治癆瘵

治虛癆發熱

延年却病方

六味丸

桑椹丸

悅澤面容

治小兒稟賦腎經虛

治心虛

治肺虛

治脾虛

治肝虛

治腎虛

金匱桂枝

龍骨牡蠣湯

小建中湯

黃芪建中湯

紅玉膏

種子復本丸

長春寶嗣丹

強精神悅顏色

固本種子丸

益元資始丸

長生丹

益元延年

益壽七寶丹

大培丹

延壽丹

彭祖秘服接命丹

資生大造丸

扶桑延年至寶丹

仙傳斑龍丸

霏雲神膏

紫霞丹

保真丸

保養延壽不老丹

長春至寶丹

三妙丹

天河不老丹

益壽黑豆方

陽痿門

延齡丹

鶴齡丹

太乙種子方

治脾腎兩虛精髓不固

治陽痿方

長春至寶丹

治男子

陽痿囊濕
女人陰痒

治囊濕搔痒方

比天煖臍膏

煖臍膏方

養元湯

人參養榮湯

烏龍丸

干口一盃酒方

千金封臍膏

毓真膏

洞府保養靈龜神方

感冒門

世間真傷寒病少而感冒病多感冒病少而時疫病多不可一見頭疼身熱便呼爲傷寒如果真患傷寒之病方可以正傷寒藥治之若係感冒之病不可與傷寒之法同治如係瘟疫之病又當以瘟疫之法治之方不誤戕人命

凡傷寒必頭疼其疼也不間晝夜探其舌本必從喉嚨內乾出於外多兼煩躁不煩躁者卽輕證也不頭疼而發熱不發熱而頭疼頭雖疼而有時暫止口雖

乾而舌本不燥骨雖疼而頭不疼口雖渴而不欲引
飲至夜或偶得寐遇食不好亦不惡居處雖若虺怯
而神氣安靜諸若此者皆非真傷寒也

冬時嚴寒萬物閉藏偶觸冒之而卽病者爲傷寒不
卽病者寒毒藏於肌膚中至春變爲溫病至夏爲熱
病治若混同未免誤殺又春夏秋間有非時客寒人
暴感之名曰感冒其證鼻塞清涕咳嚏頭痛身微發
熱微惡寒所病亦輕治之亦異飲食雜證類傷寒誤
投湯藥槩用汗下未有不因之而斃者不可不慎也

內傷與外感之分生死反掌尤當辨明

凡治傷寒初感止有太陽少陽等症無論有汗無汗一見頭痛身疼發熱惡寒渾身拘繫卽當用參蘇飲加減治之不可遽用麻黃桂枝升麻等藥投之恐引病入陽明胃經助動胃中邪火飲食之物薰蒸燥結不下胸膈堅硬不便不通發爲紅黑二斑以致譫語發狂當此之時還不知以下藥通之仍用表藥補藥則邪火愈熾陰血愈耗斃人性命不少矣若遽用黃芩梔子牛蒡石膏等寒藥投之恐引病入陰經始而

胃寒嘔吐後則腹痛泄痢手足逆冷表邪不能解散
七日以後忽變大熱煩渴譫語神昏不可救矣故傷
寒感冒之初止宜用連鬚葱白數莖紫蘇葉二三錢
連皮生薑三四錢煎服取汗而愈庶爲穩當如有飲
食積滯發熱之症當於參蘇飲內加消導之藥治之
食積類傷寒頭疼發熱惡寒氣口脈緊盛但身不痛
與傷寒不同耳近年此病甚多時醫不知概用發汗
之藥誤矣

傷寒病症難辨且難治倘地方無明醫可請慎勿輕

用庸醫及妄聽人亂用方藥反致壞事須是謹避風寒忌食米粒戒房事勞碌靜自守待七日後其病傳遍經絡雖不服藥亦自愈只是耐煩待之却無害也古語云傷寒不服藥爲中醫正謂此也

世人外感病少而內傷病多如內傷一而外感九病止一分內傷二而外感八病止二分內傷九而外感一病至九分若內傷十分而外感全無則病難救矣此時醫家誤認內傷爲外感者甚多往往誤人性命故凡治感冒之病先要辨明內傷外感用藥治之方

免輕病變重之患矣

凡傷風惡風傷寒惡寒傷熱惡熱傷食惡食不可拘
定日數先當散其外邪再按症祛其內病自無不愈
若外邪未除遽用補劑以固其外或用涼劑以遏於
內必致變輕爲重延纏日久補瀉難施矣

凡寒症前三日在陽分當從汗解四日以後病入陰
分當從泄解病在裏不可遽用發汗藥恐其表虛也
病在表不可遽用涼藥恐引邪入內也

東垣曰人迎脈大於氣口爲外傷氣口脈大於人迎