

醫宗說約卷之二

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏纂述

錫山禪醉道人計廉能元讓甫叅

弟時行季芳氏

增葉舒嵩明韓氏

訂

中風

人覺大指次指麻木不仁或肌肉微掣即為中風先兆

西北地寒風浩蕩或中腑兮或中臟或中血脉或中經善行數

變難名狀

外症

卒倒入地不知人痰塞喉間命欲喪東南地濕類中

風症候相同治須當腑中風邪着四肢惡寒拘急脉浮遲中臟



醫宗說約卷之二

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏纂述

錫山禪醉道人計廉能元讓甫忝

弟時行季芳氏

增葉舒嵩明韓氏

訂

中風

人覺大指次指麻木不仁或肌肉微掣即為中風先兆

西北地寒風浩蕩或中腑兮或中臟或中血脉或中經善行數

變難名狀

外症

卒倒入地不知人痰塞喉間命欲喪東南地濕類中

風症候相同治須當腑中風邪着四肢惡寒拘急脉浮遲中臟



唇緩滯九竅鼻塞便閉不語時若中血脉口眼歪又有中經亦

要知六經無症溺調和口不能言肢不持古人曾作真風治三

人名

人名

人名

家妙論亦須思東垣大率主氣虛河間腎虛兼火治丹溪主濕

內生痰總是類中分明註治之先用開關法皂

牙皂去皮 弦一兩

藜各二俱為末再加麝香吹鼻中有嚏則生無難活醒後投之

冬

苓皮草夏

南瓜當頭黃黃白

三合湯茯苓陳甘牛應相當星萆歸桔苓連米竹瀝薑汁一其

白川

是

湯左癱屬血右屬氣血虛加芍芎生地

四物恐泥痰 用姜水炒

瘀血桃仁

與紅花

瘀血症小便利大便黑或腹中塊痛

氣虛參芪也同劑盜汗遺尿亦如之

小便不利不可利姜蚕全蝎閉塞加釣藤善治牙關閉肥人烏

附少以引經鳥頭附子氣實人參亦要忌右寸有力去參

盛自汗身體痛防風羌活并薄桂頭目不利或頭疼芎芷蔓荆神佳痰涎肝經終風

辛芥穗無汗身疼加芷羌芎防蒼米秦芎配心血虧次神細同

茯神遠志菖蒲入或心動搖驚悸者酸棗竹茹辰砂益風痰熾白活川芎

盛須臾星防枳牙皇瓜蔓仁食傷神麥芽山查寔便秘還須三化枳

行大便結用三化湯厚朴大黃枳

示吉曰東南類中風者多故從火痰氣而治實有神驗若果

係風邪外中六經形症具者原宜先服小續命湯解表便秘

者三化湯通滯之後方用木湯調理更為切當至于治日服

歪斜方法固多不如瀉夾車地倉二穴歪左針右歪右針左病可立愈

傷風

頭痛發熱鼻不通惡風自汗號傷風脉來浮緩兼無力參蘇飲

服自然鬆人參紫蘇及枳椇桔梗乾葛前胡同陳皮茯苓半

夏木香少許木姜攻

已下加減

咳嗽去參

皮本加桑杏

打碎

內有痰熱

黃芩進痰唾如膠金沸草胸滿痰多夢貝順冬月自汗桂枝添

若還無汗麻黃令傷食厚札麴神麥芽中酒白蔻烏梅信頭疼羌

芎不可無氣喘杏蘇亦莫剩



示吉日人之易于傷風者其故有二一因元氣虛之氣不衛
外風乘虛入治宜參芪益氣而佐以散邪一因素有鬱熱在
內毛竅常開邪風易入治宜芩連清火而佐以疎風此皆氣
虛鬱熱為本風為標也治本則標自愈

中寒

中寒傷寒殊非一

傷寒在後

傷則漸深中直入初起怖冷四肢寒

無熱不渴身戰慄脉來無力又沉遲加味理中湯有益參朮甘

草并乾薑加桂陳皮功妙極寒甚附子及吳萸

鹽炒附童便煮

茯苓牛

夏吐有力生薑煎就須冷服

伏其所主先其所因也

無脉猪胆一匙

麝香牛分

吃泄瀉不止加黃麻升姜汁三匙嘔吐入舌捲囊縮指申青脉絕

蒸臍不可忽

蒸臍法 用麝香半夏卑夾末一匙填臍中後用生姜片貼于臍上放大艾火于姜片灸三七壯灸關元氣海各三七壯熱通干中逼寒出外手足溫煖則生 一用硫黃麝香末填臍中放葱餅于臍上以熨斗盛火于葱餅上熨之如餅爛再換一枚葱餅用葱頭一握切去葉留白根約寸許連縛四五餅應用

暑病

暑天病熱名暑症腹痛吐瀉胃暑病頭痛身熱燥不寧身如針

刺傷暑惡寒熱自汗出不止咳嗽倦怠為中暑脈虛身熱動而

得之病尿陽加味香薷湯可止香薷豆苓草皮厚陳朴豆米次

第導黃連燈心姜棗服氣虛參朮其芪靈寒熱柴芩為要藥嘔

加藿牛法為精瀉合澤猪真妙訣去連渴用知粉藥如神綿綿

腹痛傷冰冷乾姜滑石法從心去連小水不利或短赤澤瀉山

枝并滑石日本瀉搗搗加羌號暑風胸滿寔兵消食積自汗不止用參

芪水瀉木日本瀉通澤有益頭痛川芎并石羔痰悶瓜蔓及枳寔已土

法若居涼館喜風涼頭疼惡寒頭項強身形拘急熱無汗靜而



得之陰寒傷

此因暑
衰病

宜服羌活并蒼朮厚朴乾葛及藿香紫蘇

等分薑三片水煎熟服號升陽

湯名

兼食神麴滑石妙內傷冰冷

用炮姜

示吉日夏至一陰生人內寒而外熱若過食冰冷及連薑益

元寒涼之劑遂至寒積于中而成內傷寒症凡吐瀉而腹痛

無休歇脉來遲緩者是也治宜理中湯合平胃散溫之寒甚

加附子如悞投香薷飲則危矣

注夏

溫熱蒸人夏日長氣虛體弱熱因傷胸中氣促四肢倦心煩食



少不如常好卧口乾或泄瀉治用清者益氣湯黃芪升麻與蒼

朮各一人白皮神一參朮陳麴澤瀉黃柏酒麥冬青皮及當歸乾葛各三分

味九粒甘草水煎引姜棗盜汗還加浮小麥便赤滑石并山枝

渴甚天花烏梅食去蒼頭痛川芎石羔好嗽加羔杏升蒼出木

香砂仁胸不寬瀉加肉寇茯苓的去麥歸

濕

東南之地恒多濕居民感受病非一或行涉水雨露蒸或過飲

令因而得小便短赤身體重骨肉酸麻行不疾漸加浮腫及身

黃燥土參濕湯可識茯苓香附半陳皮厚朴澤瀉湯苓蒼白朮引用

活風

砂仁并姜棗臨服半匙鹽可八如濕寒熱身腫痛羌防朮通加
有益內濕胸滿兼嘔吐喘脹腹膨用枳實黃連山查炒卜子湯
閉未通車前力濕熱發黃仗茵陳山枝車前兼滑石

示吉曰治濕大法在表在上者開鬼門用麻黃防風輩微汗
是也在裏在下者潔淨府用五苓輩利小便是也丹溪云濕
得燥則豁然而服用蒼朮是也濕從風散用羌獨活類是也
濕久則生熱用黃連山枝是也從此而變通之亮能活人但
麻黃止可用二三分蓋汗多恐生變症耳

火

相火命門君火心二火一水不相均

惟腎屬水經所謂水不勝二火

五臟氣

升皆是火

氣有餘便是火

妄動須知藥至陰

經所謂一水不勝五火也

古人調治非

一法一一從頭說與君心穴尤極陽強病人壯氣寔鹹令進類

狂便閉用硝黃

朴火大承氣湯朴硝大黃

大便如常

黃連解毒湯黃

芩黃連黃栢山枝烏梅水煎服治大熱錯語呻吟不眠煩燥脉數乾嘔

實火可瀉從上方隨經調

治須臾定飲食勞倦身發熱元氣不足內傷症補中益氣味甘

溫陽虛之火功偏勝

補中益氣傷人參黃芪當歸自木陳皮甘草升麻柴胡生姜大棗水煎服

熾盛以乘陰朝京暮熱血虛成陰中之火甘寒降知柏四物法

通靈

四物湯當歸生地芍藥川芎加黃栢知母二味監酒炒

腎水受傷陰虛病面紅耳熱

浮火盛左尺洪數無根火栢龜六味治如神

六味地黃丸地黃山藥茱萸肉茯苓

丹皮澤瀉蜜丸淡鹽湯送下加黃栢龜板空心服已上補虛火法

胃虛過食生冷傷抑道陽氣

脾中央火鬱之症升散之升陽散火最爲良

升陽散火湯治五心煩熱胃脘時疼

四肢乏力肌熱筋痺或骨髓中熱用凡麻葛根羌獨活白芍人參各五分炙甘草生甘草柴胡各三分黃風二分半水煎服忌

寒涼物去獨活及生甘草加葱卽火鬱湯

命門火衰陽脫病面赤煩燥虛火盛足冷

脉沉陰極燥回陽救急醫中聖

回陽救急湯見傷寒科

陰虛發熱火旺甚

脉數無力屬心腎內傷發熱乃陽虛脉大無力脾肺分氣從左

起肝之火陰火還從臍下生脚下熱來侵腹者斯人虛極藥難

下熱從脚起先用附子未津調貼脚心中二湯泉穴引火不行後服四物降火之劑

示吉按積熱論曰治火之法始而涼和次而寒取寒取不愈則因熱而從之從之不愈則技窮矣是徒知治熱以寒而不知熱之不衰由于真水之不足也當壯水之主以制陽光經曰寒之而熱者取之陰陰腎水也求其屬也此獨爲積熱者說愚意治火除火壯氣寔者便秘者火微者從正治外俱當遵此爲則蓋火非水不降未有腎水足而心火熾者也益坎勝離湯寔爲火症之總司湯見勞瘵

內傷

飲食勞倦是內傷或因飢飽過行房風寒傷人名外感辨明調

治病無妨人迎緊盛手背熱寒熱邪作無間歇惡寒無汗鼻不

通此是外感君須別內傷之症氣口共手心有熱微惡風寒熱

間作不知味更兼氣弱語言壅內傷惡寒得煖解外感近火寒

仍攻外感內傷相挾者脉症並見須辨通內傷不足急補之外

感有餘蕩不同或先補養或先散先後之間無苟從治內傷注補中

益氣用芪參歸朮升柴甘與陳引加姜棗水煎服氣和微汗最

為精救腎水虧酒炒黃柏入心養血紅花三分升麻柴胡白汗去夜

間不睡加棗仁炒為末亦川芎蔓荊頭疼用口乾乾葛藥為靈

巔頂痛時辛藁本細仲驚悸棗茯神甚者再加遠志食加麴芽神麥



山查枳椇瀉添澤瀉芍茯苓黃連枳椇除胸悶有痰前胡夏苓半茯苓君

防已木瓜除脚弱龍骨牡蠣煨為治遺積風活白川防羌芷芎身熱用風兼

寒頭疼者加虛火知母栝黃玄參大炎上黃芩黃連清內熱菊花熟地

醫眼疼

傷食

後天之本屬脾胃納化飲食滋榮衛胃主納飲食不下為胃病

養生妙法節飲食脾胃受傷飲食倍胸腹飽悶脾主化飲食不消為脾病并作酸噯氣惡

食腹痛累或吐瀉時下洩屁種種皆因傷食例甚則發熱與頭

疼惟身不痛傷寒異有傷食類傷寒左關乎和右關緊香砂乎

傷食

胃功有濟蒼朮陳皮厚樸草平胃散只此四味香附砂仁香理氣川芎

枳櫟并藿香水姜前服食須忌消肉杏山草菓消麵卜消糯米食酒

菓麴飯食神麴反麥芽生今瓜菓姜青逐鬼皮加索粉傷時如杏

仁西瓜多吃食鹽促魚傷橄欖椒紫蘇桶草將來消牛肉麝香

能消蔬菓積葛梅白蔻酒傷入枳壳桔梗除胸滿挾氣烏兵寒

姜益傷飲須合四苓湯飲茶湯涼水之類四苓嘔吐臨服加姜

汁白木茯苓治脾虛泄瀉車前蔻白木已上消導之法上部有脉下無

脉其人當吐不吐卒指物探吐是良方否則瓜蒂散有力瓜蒂赤小

豆為未溫水調下一升叶之食積鬱人成濕熱苓連大黃不可飲再入白木