

中西醫學群書

金匱鉤玄卷下

丹溪朱震亨原文

皖南建德後學周學海評註

門人戴元禮錄補

婦人科經候

經水過期而作疼者。乃虛中有熱。所以作疼。

經水不及期。血熱也。四物湯加黃連。

經候將來而作疼者。血實也。

桃仁

香附

黃連

過期乃血少也。

川芎

當歸

帶人參白朮與痰藥

過期紫黑色。有塊。血熱也。必作痛。

四物湯加 黃連 香附

淡色過期者。乃痰多也。

二陳湯加 川芎 當歸

紫色成塊者。乃是熱也。四物湯加黃連之類。

痰多。占住血海地位。因而下多者。目必漸昏。肥人如此。

南星 蒼朮 香附 川芎 作丸服

肥人不及日數而多者。痰多血虛有熱。前方加黃連白朮。若血枯經閉者。四物湯加桃仁紅花。

軀肥脂滿經閉者。導痰湯加芎連。不可服地黃泥隔也。如用以生薑汁炒。

血崩

崩之爲病。乃血之大下。豈可爲寒。但血去後。其人必虛。當大補氣血。

東垣有治法。但不言熱。其主於寒。學者宜再思之。

急則治其標。白芷湯調百草霜。

甚者。棕櫚皮灰。後用四物湯加乾薑調理。

因勞者。用參朮帶升補藥。

因寒者。加乾薑。因熱者。加黃芩參芪。

崩過多者。先服五靈脂末一服。當分寒熱。五靈脂能行能止。婦人血崩。用白芷香附爲丸。

白帶。用椒目末。又用白芷末。

一方。用生狗頭骨。燒灰存性。或酒調服。或入藥服之。

又方。用五靈脂半生半熟爲末。以酒調服。

氣虛血虛者。皆於四物湯加人參黃芪。

漏下。乃熱而虛者。四物湯加黃連。

帶下赤白

赤屬血。白屬氣。主治燥濕爲先。

帶漏。但是胃中痰積流下。滲入膀胱。宜升。無人知此。肥人多。是濕痰。

海石 半夏 南星 蒼朮 川芎 椿皮 黃栢

瘦人帶病少。如有帶者。是熱也。

黃栢 滑石 川芎 椿皮 海石

甚者。上必用吐。以提其氣。下用二陳湯加蒼朮白朮。仍

用丸子。一本作五龍子。

又云。赤白帶下。皆屬於熱。出於大腸小腸之分。

一方。黃荊子炒焦爲末。米飲湯下。治白帶。亦治心痛。

羅先生治法。或十棗湯。或神祐丸。或玉燭散。皆可用。不可峻攻。實者可用此法。虛則不宜。

血虛者。加減四物湯。

氣虛者。以參朮陳皮間與之。

溼甚者。用固腸丸。

相火動者。於諸藥少加炒栢。

滑者。如龍骨赤石脂。

滯者。加葵花。性躁者。加黃連。

寒月。少入薑附。臨機應變。必須斷厚味。

良薑

芍藥

黃栢

二錢各燒灰

入椿樹皮末

半一兩

右爲末。粥爲丸。每服三四十九。

痰氣帶下者。

蒼朮

香附

滑石

蛤粉

半夏

茯苓

婦人上有頭風鼻涕下有白帶。

南星

蒼朮

黃栢

炒焦

滑石

半夏

川芎

辛夷

牡蠣

茯苓

白帶兼痛風。

半夏

茯苓

川芎

陳皮

甘草

蒼朮

炒浸

黃芩

二麥

黃芩

酒浸晒乾炒

子嗣

肥盛婦人不能孕育者。以其身中脂膜閉塞子宮。而致經事不能行。可用導痰湯之類。

瘦怯婦人不能孕育者。以子宮無血。精氣不聚故也。可用四物湯養血養陰等藥。

產前胎動

孕婦人因火動胎逆上作喘者。急用條黃芩香附之類。將條芩更於水中沈取重者用之。

固胎方

地黃

半錢

人參

白芍

各一錢

白朮

一錢半

川芎

歸身尾

二錢

陳皮

一錢

甘草

二錢

糯米

十四粒

黃連

些少

黃栢

些少

桑上羊兒藤

七葉
完者

右攻咀煎湯服之

血虛不安者用阿膠

痛者縮砂行氣故也

一切病不可表

按丹溪嘗以黃芩白朮爲安胎之聖藥此亦示清熱補氣之兩大端而已凡胎之不安或因寒濕痰多氣滯或因血熱筋緩氣陷一宜溫補一宜清涼總藉氣以提挈之筋以兜裹之益氣強筋是爲要法其以芎歸調經之品爲安胎者大謬詳具隨筆

惡阻

從痰治

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也肥者有痰瘦者有熱多用二陳湯

或白朮爲末水丸隨所好或湯或水下

婦人懷妊愛物乃一藏之虛假如肝藏虛其肝氣止能生胎無餘用也肝虛故愛酸

血塊死血食積痰飲成塊在兩脇動作鳴腹嘈雜眩暈身熱時作時止

黃連 一兩一半用茱萸炒去茱萸 黃一 一半益智炒去益智

山梔 半兩 炒

台芎 半兩 香附 一兩用童便浸

蘿蔔子 一兩 半炒

山查 一兩 三稜

青皮

神麴 各半兩 莪朮 半兩用米醋炒

桃仁 半兩留尖去皮

白芥子

炒 一兩半

瓦龍子

消血塊

爲末作丸服之

一婦人血塊如盤有孕難服峻削

香附

四兩醋煮

桃仁

一兩去皮尖去

海石

一兩醋煮

白朮

一兩

爲末神麴爲丸

按阻卽孕之別名。靈樞女子如阻。脈經令人嗜甘。如

阻。婦狀皆此義也。惡如惡作劇之意。如曰嘔惡阻隔。

不得爲胎病之專矣。

束胎

束胎丸第八箇月服之。

黃芩

酒炒夏用一兩秋用七錢半冬用半兩

茯苓

七錢半

陳皮

一兩忌火

戴云惡阻者。謂婦人有孕。惡心阻其飲食者是也。肥者有痰。瘦者有熱。多用二陳湯。

或白朮爲末。水丸。隨所好。或湯。或水下。

婦人懷妊愛物。乃一藏之虛。假如肝藏虛。其肝氣止。能生胎。無餘用也。肝虛故愛酸。

血塊死血。食積痰飲成塊。在兩脇。動作鳴腹。嘈雜眩暈。

身熱時作時止。

黃連

一兩一半用茱萸炒去茱萸
黃一一半益智炒去益智

山梔

半兩炒

台芎

半兩

香附

一兩用童便浸

蘿蔔子

一兩半炒

山查

一兩

三稜

青皮

神麴

各半兩

莪朮

半兩用米醋炒

桃仁

半兩留尖去皮

白芥子炒一兩半 瓦龍子消血塊

為末作丸服之

一婦人血塊如盤有孕難服峻削

香附四兩醋煮 桃仁一兩去皮尖 海石一兩醋煮 白朮一兩

為末神麴為丸

按阻即孕之別名。靈樞女子如阻。脈經令人嗜甘。如阻婦狀。皆此義也。惡如惡作劇之意。如曰嘔惡阻隔。不得為胎病之專矣。

束胎

束胎丸第八箇月服之

黃芩酒炒夏用一兩秋用 茯苓七錢 陳皮一兩忌火

白朮 二兩 粥爲丸

東胎散。卽達生散。

人參 半錢

陳皮 半錢

白朮

白芍

歸身尾 各一錢

甘草 二錢 炙

大腹皮 三錢

紫蘇 五分

或加枳殼砂仁。作一貼。入青葱五葉。黃楊木葉梢十箇。煎待八九箇月。服十數貼。甚得力也。或夏加黃芩。冬不必加。春加川芎。或有別證。以意消息。

第九箇月服之。

黃芩

一兩 酒炒 宜熱藥不 白朮 一兩

枳殼

七錢 半炒 滑石 七錢 半 臨月十日 前 小便多時減此一味

右爲末粥爲丸如梧桐子大每服三十丸空心熱湯下不可多恐損元氣

安胎

白朮

黃芩

炒麴

粥爲丸

黃芩安胎乃上中二焦藥能降火下行

縮砂安胎治痛行氣故也

益母草卽茺蔚子治產前產後諸病能行血養血

難產作膏

地黃膏

牛膝膏

胎漏

氣虛

血虛

血熱

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下也

子腫

濕多

戴云子腫者謂婦人有孕或手足或頭面通身浮腫者是也。用山梔炒一合米飲湯吞下。三因方中有鯉魚湯。

難產

難產之由亦是八九箇月內不謹者。氣血虛故亦有氣血凝滯不能轉運者。催生方。

白芷灰

滑石

百草霜

右爲末。芎歸湯或薑汁調服之。

治胎衣不下

婦人大全方別有治法

產後血暈

虛火載血漸漸暈來

用鹿角燒灰出火毒研爲極細末以好酒調灌下卽醒
行血極快

又方用葦葉細切盛於有嘴瓶中以熱醋沃之急封其
口以嘴塞產婦鼻中可愈眩暈

按仲景以鬱冒產後三大證鬱冒卽血暈
瘥卽俗所謂產後驚風