

卷十

彙集內襍症諸家論治

身熱餘熱潮熱寒熱厥逆

兩感風寒煩躁

倦怠

痛

痒

頭

痛

腰痛

身背痛

腹痛

附胸膈

緊滿

斑疹丹

癰疹

夾疹

夾斑

斑爛

夾驚

夾丹

夾痢

失血論治

便膿血

失血發泡

鼻血

口血

大小便血

瘡癤出血

呵欠噴嚏

腹內雷鳴

便氣

下泄

泡

乾枯黑陷

附諸色黑痘

疔癰

調解

薰解

攻裏

陷伏

倒靨

調解

溫裏

白陷痒塌

汗

渴

薰

解

發表

攻裏

溫裏

汗

渴

寫利

嘔吐

吐瀉

文作

摘星樓治痘全書

卷十



摘星樓治痘全書卷之十

彙集痘內雜症諸家論治

吳東園曰。痘症有定限。雜症無常數。故治痘則分條。例以爲治法之先後。雜症則始終可以例治。方藥可以通用。固不必分先後也。

按痘無雜症。則痘不必藥。故治雜症卽所以治痘也。吳云有雜症固不必分先後。此言得之矣。

身熱

胡氏四論曰。痘瘡之熱。與諸熱不同。傷寒熱。手足微

冷。發熱而無汗。面色青慘而舒。左額有青紋。傷風熱。  
指稍微溫。發熱有汗。面色無光。傷食熱。目胞腫。右額  
有青紋。身熱而頭額腹肚尤甚。但熱晝涼面黃。或吐  
利腹痛。驚風熱。面色青。額上有青紋。手足心有汗。時  
發驚搐。手脉絡微動而發熱。風熱。身熱倍能食。唇紅  
頰赤。大小便不通。潮熱。如水依時而至。痘瘡熱。必有  
五臟之症。耳冷。中指冷。尻冷。

按此第一義所當辨也。

萬密齋曰。初發熱時。渾身壯熱。焮焮然。不渴。清便自。

調此邪在表拂鬱於皮膚之間宜以輕揚之劑發之

升麻葛根湯一甚則羌活散二其熱烙手目赤鼻乾

唇燥小便赤大便秘煩悶不安此表裏俱熱雙解散

附主之表不大熱其人煩燥不安此熱在裏也以三

黃丸二百微利之

按此第二義亦所當辨也

陳文秀曰凡身壯熱經日不除如無他症用柴胡麥

冬湯二百治之熱退即止如不愈服人參白朮散三百

薛註云前症若肝膽熱毒用柴胡麥冬湯二百若肝經

商書卷十 卷十 音直堂



折身材治法全書

血虛。四物湯。五十加黃芪、柴胡、若中氣虛熱。人參、白朮。

散。三言  
二九

渾身壯熱。大便堅實。或口舌生瘡。咽喉腫痛。皆瘡毒。

未盡。用射干鼠粘子湯。二言  
六不應。用人參、白朮散。三言  
二九

**薛**註云。前症若壯熱飲冷。屬熱毒在表。宜用前湯。若

兼大便不通。屬熱毒在裏。少用四順清涼飲。十若熱

毒既去。胃氣虛而發熱。人參、白朮散。三言  
二九若因陰血虧

損而發熱。四物湯。十

按此第三義。亦所當辨也。



薛立齋曰。一兒六歲患痘。第七日根窠赤痛。大便閉。

結小便赤澁。煩燥飲冷。錢密菴用四順清涼飲。十并。

膽導法。四百五十一下結糞而安。

海藏曰。或熱極反兼水化者。亦能變黑。當以涼藥主之。或有出色正者。內素有熱。頭反陷。色或灰青似黑。中有針眼下陷。當急以清涼藥疎之。

按一身熱也。不辨症候。不按經絡。又不識症治。何以爲通醫。

餘熱

餘熱一條  
本為痘後  
論附此從  
熱例耳

心鑑曰。夫餘熱者。本虛熱也。何哉。痘毒一解。則陰陽二分。因而俱虛。所謂火從虛發之義。信不誣矣。然多發於午後。兩臉赤色。乃其症也。虛極則發熱。熱盛則譫語狂燥。此理之必然也。即此陽虛動作。亦必為之強陽。前後以保元湯。方妙四。加黃連。甚則大連翹飲。辛主之。此症最要預為調治。否則日久。或疳癆。或眼目疳蝕。咽喉風搐筋牽。睡露白睛。走馬牙疳諸疾。自此而作矣。

按此則知痘後所餘之熱。不為調治。恐留住作

錢云疹由  
心熱斑由  
胃熱與此  
相異

禍故宜酌方治之。

潮熱

薛立齋引張潔古云。痘疹未有不因潮熱而出者。觀其熱之時。知自何臟發出。寅卯時屬肝。出水泡。巳午未屬心。出斑瘡。申酉戌屬肺。爲膿泡。亥子丑屬脾。出疹子。然腎獨居腑下。不受穢濁。故無症耳。竊謂前症當察其虛實。若壯熱。飲水便秘。屬實熱。少用四順清涼飲。十下之。發熱。飲冷。大便不秘。屬虛寒。宜人參白朮散。言補之若下而發熱愈甚此陰虛而陽無所附。

也。用四物參芪之類補之。若下而潮熱面赤者血虛發燥也。用當歸補血湯。百補之。若見驚搐等症乃肝虛而內生風也。用鈎藤湯。百加四物。天麻補之用發散之劑而熱愈甚此表虛而外熱也。用四君子湯。五百當歸黃芪補之。

按此用下法表法兩不應皆曰用某藥補之。薛之醫得潔古而精用之者也。

### 寒熱

吳東園曰。寒熱往來。熱毒欲發不出。故或往或來。表

裏俱見之症也。無分始終。用柴胡湯。四加知母石膏。

或雙解散。三附或大柴胡湯。九下之。

保赤曰。夫火動則熱。火鬱則寒。皆痘毒欲發不出故。

往來有如此耳。

按此二說。俱從清解論。

如寒熱作於七八日之間。恐有坐陷之患。須多服內

托散。七

按此可見寒熱往來。亦有補瀉二法。須照薛氏

辨各症虛實法。詳之可也。



又有七日前後獨熱者。則爲痘蒸血氣與毒俱盛也。或十四日後獨熱者。亦爲餘毒易治。若七日前後獨寒者。爲氣血損而毒火內鬱也。難治。急與保元湯。加川芎、薑、附、木香。或與內助丹。二首生死之際。不可執一也。

按此火毒內鬱。由於氣血損。故用補耳。

### 厥逆

萬密齋曰。逆者。四肢逆而不溫也。厥者。冷也。又甚于逆。四肢者。諸陽之本。常宜和暖也。指頭微寒者。陽氣

衰也。陽氣起於十指之端足心冷者。陰氣勝也。陰脉集於足下而趨於足心

如痘焦黑煩渴頓悶喘促而厥逆者。此陽毒內陷。熱氣逆伏。手足爲之冷。所謂熱深厥亦深。火極似水者。如痘灰白泄利而厥逆者。此元氣虛憊。陰陽不相順接。而手足爲之冷也。瘡疹之候。頭常欲冷。足常欲溫。故頭溫足冷者。不治。厥逆乃瘡家惡候。

按萬氏論痘中之四肢厥逆者。予無暇援例以辨之。痘症火毒而痘非火。不長。此四肢厥逆一症。爲難治也。然有陽厥陰厥。用藥不可不審耳。



如熱極而厥者大便不通三乙承氣湯辛主之如世

利氣虛而厥者陳氏木香散辛異攻散辛主之

按此萬氏之分陽厥陰厥也。

醫學註曰初起表症足冷無害惟足冷頭低四肢軟

弱始終大忌痘出後頭溫足冷者死。

吳東園曰熱毒之氣鬱遏於內元氣亦不得行以致。

表上無陽而厥冷矣宜保元湯十加桂枝生薑芍歸

或理中湯一始終同治。

按此二說亦足以發明其旨頭溫足冷四字何

須兼看痘  
好反



解頭者、陽所升也。足者、陰所趨也。痘中之陰升。陽降。乃成天地之泰。如頭溫足冷。則陰陽之氣隔絕而爲否矣。安保其不危。

### 兩感風寒

心鑑曰。夫痘、內毒所感也。風寒、外邪所感也。若痘出不快。蓋因風寒橫塞。阻絕無路。可出之故也。痘未發之初。以升麻湯一和解湯六量輕重治之。既出之後。及至行漿。又未解。乃以水楊湯三沃洗。此藥之性大能滌去風寒。其痘毒豈有不發之理。

水楊湯洗  
試法夏月可

煩燥

萬密齋曰。煩者。擾擾而煩。燥者。憤躁之躁。合而言之。煩燥皆熱也。析而言之。煩陽也。熱之輕者。燥陰也。熱之甚者。李東垣云。火入於心則煩。入于腎則燥。皆心火爲之。難知集曰。火入於肺煩也。火入於腎燥也。須宜忌之。

以心腎分  
煩燥詳之

按是心肺俱浮而在上。火入則煩。所時有也。入腎則燥。火毒爲甚矣。然煩燥有虛實表裏之異。不可不察。

薛立齋引東垣云。凡痘盛作之時。必令心火有所導引。苟或毒氣出而未盡。遂生煩燥。以生黑豆煎湯。或生犀磨汁飲之。亦可。若津液不足。虛煩不得臥者。活人酸棗仁湯。二音此症因脾胃氣虛。或服剋伐之劑所致。但當調補中氣爲善。

按煩燥一症。所關非小。而吳東園云。此痘家必有之症。或者微微見之。可以治耳。若謂此乃常事禍矣。

汪省之曰。心經有熱則煩燥。脾少津液則口燥咽

乾而渴痘症已出未出皆宜用甘草散。四百心煩發渴。二百

大便不通小便澀者通關散。二百煩而喘悶燈心湯。

四百虛煩發燥而渴五苓散。二百酒蒸黃連丸。二百皆要

也。此皆實熱

藥也。夏月夾暑煩燥白虎加人參湯。十

作膿泡而渴毒氣已出未得淨盡則應心而煩燥作

血泡而煩燥此熱毒欲散未散之際但解熱毒而已。

宜黑豆煎湯。二百徐徐飲之。煩燥睡臥不安身熱悸

動者宜清心利小便。若表不解者水解散。二百大便

秘結煩燥不得眠必腹脹麻仁丸。二百津液枯少虛煩