

太乙仙制本草藥性大全

二

# 新刻太乙仙製本草藥性大全卷之三

## 本草精義

太乙仙人 雷公 炮製

草部下

江人冰鑑 王文榮 彙校  
書林積善堂 陳孫安 梓行

獨



一名強搖  
草此草獨  
風不搖無  
風自動故

草部下

## 藥性炮製

名獨活生雍州臨西南安川谷西川者  
是獨活色微白形虛大為用亦相似而  
小不如春生苗葉如青麻一莖直上不  
為風挺六月開花莖紫二月八月採根  
暴乾此藥更易蛀宜密器藏之按陶隱  
居云今蜀中有大獨活類桔梗而大氣

獨活味苦辛平性微溫無毒升也陰中之陽  
也足少陰腎經引經之藥豚實為之使  
主治治痛風足少陰伏風而不治太陽故兩足  
寒濕痺不能動止非此不除又主風毒齒痛  
加細辛治少陰經頭痛又主風寒所擊金瘡

味亦不與羌活同用之微寒而少効今

又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃

而極大收時于解乾之氣味亦方烈少

類羌活又有槐葉氣者京下多用之極

效驗意此為真者又人或擇羌活之大

者為獨活殊未為當大抵此物有兩種

西蜀者黃色香如蜜唯西者紫色秦陇

人呼為山前獨活古方但用獨活今方

用獨活而又用羌活茲為謬矣

賦云治諸風頭眩目暉頭項難伸除兩

足風寒湿痺不能動止療金瘡止漏竇

脢癰瘍諸賊風百節疼痛殊風不以

新久治女人疝瘕諸風必用之藥

止痛膏豚癰瘍女子疝瘕療諸賊風白節痛  
風無久新者

補註治較羌稍殊乃足少陰表裏引經專治

痛風與少陰經伏風而不治太陽經也

故兩足溫痺不能動復非此莫瘥風毒齒痛

頭眩目暉有此堪治雖伏治風又資燥溫經

云風能勝溫故也但今賣者多採上當歸假

充不可不細辨爾○中風通身冷口禁不知

人獨活四兩好酒一升煎取半升分溫服

○風齒疼煩惱獨活酒煮共含之○中風不

語獨活一兩剉酒二升煎一升大豆五合炒

有聲將藥酒熱服善良久溫服三合未差再

服即

羌活君味苦甘辛氣平微溫無毒去土用肝經

膀胱腎經之藥也

主治風寒所擊金瘡止痛膏豚癰瘍女子疝  
瘕瘍瘍諸賊風百節痛風無久新者久服輕身

而老本經不分羌活手足太陽經風藥也

(卷)



一名私青  
使者一名  
胡王使者

蜀漢山者惟春生苗葉如青麻六月間  
花作叢或黃或紫結實時葉蕪者是夾  
石上生葉青者是土脉中生二月八月  
採根勝功用紫色而節密者卷活也

疏案云散肌表入風之邪利周身百節

之病抗拒陽氣腐之瘡除新旧風溫之

証乃手足太陽表裏引經藥也

升麻一名周麻

一名益州山  
谷及蜀漢

味薄不堪用之

厥陰少陰經藥主賊風夫音不語多痒血癩  
手足不遂口面喎斜治肢節疼痛一身盡痛  
片此不除又去溫溫風加川芎治足太陽少  
陰頭痛

補注

經云二物同一類今人以紫色而節密者為羌活黃色鬼眼而作塊者為獨活

產後腹中絞刺痛者用羌活二兩酒二升煎取一升去滓為二服口中風腹痛或字陽

脫出酒煎羌活取汁

服經驗方同

太乙曰

採得後細剉拌酒羊藿二日後暴乾去滓羊藿用免煩人心

升麻

味甘苦氣平微寒味薄氣厚陽中之陰

經第一者形細而黑柱堅實頓無復妙形大  
也無毒陽明經本經藥亦走手陽明經太陰

州郡皆有之以出蜀川者為勝及春生苗高三尺葉似麻葉並青色四月五月

着花似粟穗白色六月以後結實黑色

根紫如高粱多者二月八月採日曝乾

今醫家以治咽喉頭痛口舌生瘡鮮傷寒頭痛七腫毒之屬將水煎取濃汁服之入口即吐出毒氣蜀人多用之

珍珠囊云引葱白散手陽明之風邪引石膏止足陽明之齒痛引諸藥遊行四

經升陽氣於至陰之下

襄性賦云消風抗腫毒發散癰瘍升提

陽氣上行

耳  
陽明


天乙丹 扶得後勿亂上膚皮一重了用黃精自

然汁浸一宿出暴乾細剉參子暴乳用

補註 天行時病發斑瘻頭面及身項更同而  
如火燒不治數日死用五兩水煎錦沾  
汗流之小兒此瘻及頭面者心燒不安治方  
同上 朱氏云納白吐血者鼻角地黃湯乃  
陽明經聖藥如無雀角以升麻代之二葉性  
味相遠何以代之蓋升麻能引地黃等藥入

主治主解百毒殺百精殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣  
蟲毒煎濃汁服之入口皆止出治中惡腹痛  
癰喉痛口瘡肺痿肺癰欬唾膿血瘡家之聖  
藥主脾胃解肌肉間熱手足陽明經傷風之  
的瘻久發散本經風邪若元氣不足陽氣在  
下者用此升提陽氣上行又脾虛非梢子不

細辛



一名小辛

山澤叢生

華陰獨良  
葉類馬蹄

細辛臣

味大辛氣溫氣厚於味升也陽也無毒

少陰經草手少陰經引經之藥

主治癥逆頭痛腦痛百節拘挛風濕痙攣消

死肌溫中下氣破瘀開胃中滯除齒痛口臭

喉痺鼻塞眼風淚下風癇頭疾下乳結汗不

出血閉不行安五藏益肝膽通精氣久服明

目利九竅輕身長年治少陰頭痛如神當少

用之獨活為使諸風通用之藥溫陰經去內

寒治邪在裏之表頭面風痛不可缺

○補註

得當歸白芷芍藥川芎本甘草

自痛止風涼目疼切削寒邪發在裏之表合

麻附三味煎湯麻黃附子細辛湯載仲景方

口臭及齧齒腫疼煮濃汁熱貯冷吐過半斤

單服令氣塞命傾

大乙曰凡使一一擇以乘服之害人須去頭土

了日瓜水浸一宿至明晨出暴乾用之

防

風


一名銅雲

一名草

一名百枝

一名屏風

所引而至者也



一名簡根一名百蠶生沙苑川澤及鄉  
邪上蔡今京東淮沂濟川冀青三郡  
皆有之葉似牡蒿附子苗根類蜀葵  
後採收曝乾入藥殺烏頭大毒惡藜  
白欵莞花乾姜澤堅更鮑潤為良苦  
頭銳股不用有毒

東垣云用防風身治人身半已上之風  
稍去身半已下之風和能制東氏黃得  
防風其功愈大得澤鳴高本療風得當  
芳藥陽起石禹餘粮療女人臘風

防風味甘辛氣溫純陽升也無毒裨胃一經  
行經藥太陽經本經藥乃卒伍甲賦之職隨

主治

主大風頭眩痛惡風上邪目眞無所見風  
行周身骨節疼痺煩滿頭面去來四肢牽惡  
字乳金瘡內瘻治風通用鴻肺散頭目中  
滯氣除上焦風邪之仙藥誤眼鴻人上焦元  
氣又能去溫諸風藥皆然風能勝溫故也又  
藥中潤劑也

補註：去身半已上風，猶去身半已下風疾。  
演：更開目肓無見故云除上焦風邪要藥，當

或誤服反渴人上焦元氣為害肯淺止哉。若止痛骨節間亦治風效。予消穀胃脘少又調食香藥收採煎湯主風熱汁出得澤渴藥本  
藏風得當扁芍藥湯起石禹餘粮療扁人子

# 生姜



處有之

生姜

臣朱辛甘氣性微溫無毒氣味俱輕升也

生健為川

谷及荊州  
楊州以漢

主治經云主傷寒頭痛發散風邪鼻塞咳逆上

陽也秦板為之使

溫池

三州者為鱗高二三尺葉似箭竹

氣入肺開胃口益脾胃散風寒止嘔吐治痰

葉兩對八九月採用若去其皮則熟茴  
其皮則生殺半夏良薦毒惡薑參黃連

嗽及心下急痛益元氣與大棗同若與芍藥  
同用溫經散寒嘔家之聖藥又服去臭氣通

天臘糞姜皮性寒無毒

神明忍損目

○補註

無病人夜不宜食之夜宜淨姜動氣故

賦云製半夏有解毒之功佐大棗有厚  
腸之說溫經益氣發散表邪之風寒開  
胃益脾兼止胃鬱之噫嘔

冷熱氣神效○治崩切如麻盐大和鮮茶前  
一兩搗任意呷之大效○霍亂注痢轉助欲  
死取二兩搗破以酒一升煮三四沸即服○  
狐臭用汁塗腋下絕根本○暴赤眼無翳者  
以古銅器刮净姜上取汁於多層紙日熱浸

出今日點來日愈

味辛氣溫大熱味薄氣厚可升可降陽


干

姜



在處有惟  
臨海草安  
者為良苗  
華同前漢

麻黃



一名甲  
名龍沙  
名畢生  
晉地及河

洲造子姜法以水淹姜三日去皮又置  
流水中六日更刮去皮方曝乾于甕中  
三日乃成姜脣比干姜不熱比生姜不  
潤和酒服能治偏風  
賦云生則逐寒邪而發表炮則除胃冷  
而緩中

中之陰無毒奉極為使

主治主胃滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風溫

痺腸澼下痢生用辛能發散寒和去風寒溫  
庫入肺利肺氣肺寒咳嗽與五味子同用以  
勝寒煥之

則微苦故止而不移能溫脾  
理中治裏寒泄痢霍亂腹滿中冷痛中下

焦寒溫又况寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕黑  
附子為引用又炮之與補陰藥同用能引血

藥入氣分生血治血虛發熱故產後大熱以

月子炒黑能止衄血孕婦

○補言水鴻無度炙為末米飲調一服即止  
血瘀炮過不令成炭為末每服一錢  
○飲調湯調服服衣被汗出即愈

味甘辛氣溫氣味俱薄輕清而

東今近京多有之以崇陽串子者為勝

苗春生至夏五月則長及一尺稍上有

黃花蕡實如百合瓣而小又似皂莢子

味辛有麻黃氣外紅皮墨子黑根紫

赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四

月內開花六月內結子雄者無花不結

子至立秋後收採其莖陰乾令青又云

鄭州鹿葥及閑中沙堦河傍沙洲上大

恩細辛石菖宜陳久年深后欲用之湏

依法製去根節單煮熟但上沫用火

焰乾任合丸散煎湯方不令人頭悶以

厚朴為使入手足四經等太陰經本經

之藥陽明經榮衛之藥而又入足太陽

經手少陰經也

東垣云麻黃治衛實桂枝治衛虛雖俱

陽也無毒手太陰之藥入足太陽經手少陰  
經陽明經榮衛藥也厚朴為之使

主治其用有二其形中虛發汗解表治冬月正

傷寒仲秋祛風散邪理春初真溫發表勝泄衛

實消黑斑赤疹去寒寒除身熱頭疼消身上

毒風主中風邪熱春未溫瘧勿加夏秋寒疫

切禁因時已變溫熱難抵劑之輕揚仍破積

聚癥堅更劫欬逆廢痺山嵐瘡氣亦可禦之

若蜜炒煎湯主小兒瘡胞患者多服恐致亡

陽根節中閉止盜汗而固裏又曰表寒邪而

癱瘓咳嗽

○補註治產後腹痛及血下不盡府黃去節竹  
粟熟鹽服之避風若其瘡復山鄭州麻黃去

治太陽之經宣實榮衛舉此肺玉衛心

主稟麻黃為手太陰之劑桂枝為手少

陰之劑故冬月傷寒傷風咳嗽者用麻

黃桂枝即湯液之源也然脉黃又為在

地之陰上當下行何謂發汗而升上經

云味之薄者陰中之陽麻黃屬陰氣味

俱溥濶則陰中之陽可知矣安得不為

輕揚之劑升上而發汗乎但入手太陰

經終亦不能離乎陰之本體也



一名姜  
一名白芷  
一名白薑

太乙曰  
刀剪去節并頭搘砧上用銅刀細剝更  
三四十沸竹片掠去上沫盡澆出熬乾用之  
後寒雪煎  
麻黃十斤去節杏仁四升去兩仁尖  
皮熬大黃一斤十二兩金色者先以水  
煮內火候燒令調以桑薪煖之得二碩十去  
滓復內釜中又搗杏仁內汁中復煖之可除  
之七斗絞去滓置銅器中更以蜜水三斗合  
煎令得二斗四升葉成丸如彈子有病者以  
沸白湯五合研一丸入湯中滴其溫服之立  
汗出者不愈者復服一丸封藥勿令泄也  
明經引經手陽明經本經藥尚歸為之佐互  
不蛀者為良

酒春宜用水煖之良

拂去上沫再煎去三分之一不用滓熟服一  
法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服但  
效更速以此知此藥入表也若痘病以麻黃  
蒸酒易煖之取黃一把去毒搘裹以美酒五  
升煮取半升去滓頓服又治瘍瘍表熱發痘  
宜汗之則愈冬月用

白芷

得離一名澤名葉名蒿麻可作浴湯生  
河東川谷下澤今所在有之吳地尤多  
根長尺餘白色粗細不等枝幹去地五  
寸已上春生葉相對婆娑葉色闊三指  
許花白微黃入伏後結子子熟後莖枯  
以處暑日採曝乾不蛀色取黃澤者為  
佳必速惡旅復化手足陽明三經又為  
手太經之引使也

主治乃本經頭痛中風寒熱鮮利之要藥亦可  
人漏下赤白血閉陰腫之仙丹宜炒黑用作  
面脂去面癩散目癢止目淚去肺經風寒治  
風通用療心腹血痛止痛多宜外散乳癰背  
疽瘍並用調治與細辛辛夷作科治久患鼻  
塞如神○葉名蒿麻道家常採剪湯浴體能

假戶鹽

補註

○治小兒身熱白芷湯浴兒身熱風治冊  
湯有敗膿淋露不已腥氣殊甚遂至瘡脹更  
生冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以  
此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩芍藥  
根白者白芍各半兩紫燒枯別研碎為末同  
以頭丸如梧子大空肚及飯前水飲下十九  
或十五丸俟懷盡仍別以他藥補之  
丸採得後勿用四條作一丸生者此名  
表人樣薰勿用馬蘭並不入藥中殊誤

橐

本



天麻



谷及兗州西川多產河東亦生杭郡華  
如白芷參似芎藭但芎藭似水芹而大  
薹宋似蕷而葉細自其根上苗下狀  
與禾穉相似故以橐名之五月有白  
花七八月結子根紫色正二月採根曝  
乾三十日成要簡蘚責相子

橐山

橐本

味辛苦氣溫氣厚味薄升也陽也無毒

主治氣力雄壯風溫通用止頭痛頭風顛頂上  
散寒邪客於太陽經治一百六種惡風理四

肢流風腰痛主女人疝瘕陰中寒腫療小兒  
驚癇腹中急疼去皮膚疵疥黑泡長肌肉潤  
澤顏色得白芷作沐藥面貼同木香辟霧露  
瘴氣去酒飴粉刺化小便立通竇以鬼卿為  
文臺主風流入四肢

天麻

味苦辛氣平無毒降也陽也

主治頭風諸風支滿寒疝埋諸毒惡氣鬼疰  
蟲毒治小兒風疳憊瘡大人風熱頭眩

一名赤箭  
暗葉名定  
風草生蜀

州利州秦

一名鬼卿  
一名地新

由之  
去黃精

後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀刮  
二末等分丙戌蒸一伏晴後出於日中曝草

山嶺山諸山全京東京西湖南淮南州

郡亦有之春生苗初出若芻華獨抽一  
莖直上高三四尺如箭幹狀青赤色故

名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有

大小葉捎頭生成穗開花結子如豆粒

大其子至夏不落却透虛莖中潛生

土內其根形如黃瓜連生二三十枚大

者有重半斤或五六兩其皮黃色名曰

龍皮肉名天麻二月三月五月八月內

採初取時乘潤剗去皮沸湯燉煮過曝

乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作

果食之甚珍

溫補拘攣主癱瘓寒滯通血脉開竅利腰膝  
強筋諸毒癰疽並堪調愈久服益氣輕身長  
年不老

葉名定風草味甘氣平治冷氣癆痙瘚不遂  
語多恍惚多驚失志又云性寒主惑毒癰疽

○補註凡使勿用御風草與天麻相似只是  
葉莖不同其御風草根莖斑葉皆白有  
青丝使御風草根切使天麻二件若同用即  
令人有腸結之患修事天麻十兩用蒺藜子  
一錢緩火熬煎熟後便先安置天麻十兩於  
瓶中止用火熬過候藜子蓋內外使用三重  
紙蓋并係從巳至未時又出候藜子耳入熱

炒准前安天麻瓶內用炒了蒺藜子於中依  
前蓋又隔一伏特後出如此七遍瓶盛出後  
用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單搗然用  
御風草修事法亦同天麻

行義云天麻用根須別藥佐使然後見其功  
仍須加而用之人或蜜漬為果或蒸煮

赤

箭

一名雞母

赤箭

則得矣苗則赤前也

味辛氣溫無毒

主治益氣力強陰下支滿除疝瘕鬼精蟲毒消

川谷雍州  
郵生陳倉

及太山少室今江湖間亦有之然不中  
藥用其苗獨莖如箭幹葉生其端四月  
開花幹葉俱赤實似枯苦棟子核作五  
六稜中有肉如麪日曝刮枯萎其根大  
類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有

十餘子為衛似竿三四八月採根暴乾

蒼耳實

苗也

即葉味苦甘氣溫無毒

今三四月採苗七八九月採根諱拔此  
草有風不動無風自搖抱朴子云拔仙  
方中有合離草一名獨搖一名離母所  
以謂之合離離母者此草為物下根如  
芋魁有游子十二枚周環之去大魁數

主治散瘡癬細瘡遍身瘻瘍者立効  
散風濕周痺四肢攀急者殊功止頭痛善通項門追風  
毒任在骨髓殺疳瘧溫蠶主惡瘧死肌益氣  
開聰明強志緩腰膝亦堪人服明目輕身

補注赤箭則言苗用之有自表入裏之功天  
麻則言根用之有自內連外之理根則  
抽苗徑直而上苗則結子成熟而落反從幹  
中而下至土而生以此粗可識其外內主治  
之理○赤前夫麻苗也然與天麻治瘧不同  
故後人分之為二經中言八月採根暴乾故

耳 蒼

尺雖相須而實不連但以氣相屬耳

一名烹耳

一名胡莫

一名地葵

一名蕘一

名常思

名常思生安陸川谷及陸安田野今處

處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之

蒼耳廣雅謂之烹耳皆以實得名也陸

機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生

可煮為茹滑而少味四月中生子正如

婦人耳嘴今或謂之耳當草鄭康成謂

是白胡荽幽州人呼為鬚耳郭璞云形

似鼠耳叢生如盤全乏所有皆類此但

不作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實

多刺因羊過之毛中粘緣達至中國故

○補註

治瘡後諸痢神効蒼耳葉搗絞汁溫服

七治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熟含之疼即吐後復含不過三劑差產藥亦得除一切風濕痺四肢拘挛者耳子三兩搗末以水一升半煎取七台去滓呷治身手足卒瘡瘍瘡口毒之立効春用心冬用

○太乙曰

凡采時去心取黃精用竹刀細切拌之同蒸熟止至亥去黃精取出陰乾用

根莖

味辛微寒有小毒逢端午收藏辟惡

病家無畏

主治汗挽小便同飲去疔腫如神援安舌下流涎治目黃好睡若被大咬急服弥佳痔發肛門煎湯熏妙

○補註 治瘡後諸痢神効蒼耳葉搗絞汁溫服半中盛日三四服效急療齒風動痛等耳一握以淡水莫入盞令溫一切丁種取蒼乾即易不過十餘度即拔出其根治五痔方

蒼耳莖葉以五月五日採乾鳥未以水服方

名羊負來俗呼為道人頭實熟時採之

古今方書多單用治丁腫甚者生搗根葉和小兒弱絞取汁令服一升日二又

燒作灰和臘月猪脂封上酒更拔出根

愈秋採微炒入蜜最忌豬肉水汙

蒼耳酒當以五月五日午時附地刈取

蕤耳葉洗曬乾搗下筛酒若漿水服方

寸匕日二夜三作散若吐逆可蜜和為

丸準計一方寸七數也風輕易治者日

再服若身體有風處省作粟飴出或如

麻豆粒此為風毒出也可以金刺潰去

之省黃汁出乃止五月五日多取陰乾

著大糲中稍取用之皆能辟惡若欲省

病著病者便服之令人無病若時氣

不和至家服之良矣

悶發熱

酒毒止腸風下血去骨蒸傳尸

主治王寒熱邪氣療鴟血腸風治中風通身掣急理口噤舌瘡牙癆養血榮筋除風痺肢節俱痛通便利水散黃疸遍體如金誅頭風解

也菖蒲為之使入手太陽經

卷九

太乙曰

凡採取日乾或煎湯洗患處去風用水

大乙曰  
煎酒煎服隨症施治

水一升浸水中十

白蘋手脚強直毒攻腹內成塊後巡不收宜

用此方蒼耳嫩葉一擇研取汁溫酒和灌之

將滓厚罨所陽處治誤吞錢莫耳頭一把以

寸立効治卒得惡瘡以蒼耳批心不限多少陰乾未以常酒服一大錢不拘時候其功大効服之多連腦蓋善通頭門忽死忽死地不知人事者用湯起草取其漱

瘡中佳療熱毒病攻手足腫疼、痛欲脫方取蒼耳汁以浸之治婦人血風攻胎頭旋悶絕

不收