

本草類方卷之二

吞酸嘈雜第十四

食積痰火

瀉肺火胃火白仁膏火煨出太毒半斤為末醋和丸梧子大每服四五十九白湯下

○丹溪方

食已吞酸

胃氣虛冷者吳茱萸湯泡七次焙乾薑炮等分為末湯服一錢。聖惠方

醋心吐水

檳榔四兩橘皮一兩為末每服方寸匕空心生蜜湯調下。梅師方

醋心上攻

如濃酸用茱萸一合水三盞煎七分頓服近有人心如蜚破服此二十年不發也累

用有效。兵部手集

嘈雜吐水

真橘皮去白為末五更安五分於掌心舐之即睡三日必效皮不真則不驗。怪證

本草類方

吞酸嘈雜

一

食物醋心

奇方

胡桃爛嚼以生薑湯下立止。傳信適用方

本草類方卷之二

噎膈第十五

噎

疾

古塚內罐罌中水但得飲之
即愈極有神效。壽域方

噎食不納

畢澄菰白豆蔻等分爲
末乾舐之。壽域神方

噎膈反胃

鄧才清典用北庭砂二錢水和蕎麥麵包
之煨焦待冷取中間濕者焙乾一錢入櫛

榔二錢丁香二箇研勻每服七厘燒酒送
下日三服愈即止後喫白粥半月仍服助

胃丸藥。孫天仁集效方用北庭砂二兩
一兩用人言末一兩同人罐內文武火升

三炷香取出燈盞上末一兩以黃丹末一
兩同入罐內如上法升過取末用桑灰霜

方一兩研勻每服三分燒酒下愈即止。又
方平胃散各一錢入硃砂生薑各五分爲

末沸湯點服二錢當按北庭砂

噎食膈氣

馬蹄香即沉香四兩為末好酒三升熬膏
每服二匙好酒調下日三服。孫氏集效

噎膈拒食

端午采頭次紅花無灰酒拌焙乾血竭瓜
子樣者等分為末無灰酒一盞隔湯頓熱

徐燠初服二分次日四分

噎食不下

鳳仙花子酒浸三宿晒乾為末酒丸綠豆
大每服八粒溫酒下不可多用即急性子

也。摘

五噎吐逆

心膈氣滯煩悶不下食蘆根五兩剉以水
三大盞煮取二盞去滓溫服。金匱玉函

膈氣噎噎

甘遂麵煨五錢南木香一錢為末壯者
一錢弱者五分水酒調下。怪病奇方

噎食不下

赤稻細稍燒灰滾湯一盞隔絹淋汁三次
取汁入丁香一枚白豆蔻半枚米一盞煮

痢食神效。

摘玄妙方

噎

食

蕎麥楷燒灰淋汁入鍋內煎取白霜一錢入蓬砂一錢研末每酒服半錢。海上方

膈

氣

生飛子生搗汁一錢。集簡方

噎塞膈氣

威一服少出宿痰愈。唐瑤經驗

噎食病

白鷺尾毛燒灰米湯每服一錢

膈氣噎塞

飲食不下用碓嘴上細糠蜜丸彈子大時時含燕津液。聖惠

梅核膈氣

取半青半黃梅子每個用鹽一兩淹一日夜曬乾又浸又晒至水盡乃止用青錢三個夾二梅麻線縛定通裝磁罐內封埋地下百日取出每用一枚含之嚥汁入喉即

消收一年者治一人二年者治

二人其妙絕倫。龔氏經驗方

五五頁方

噎膈

三

卒然食噎

橘皮一兩湯浸去瓢焙為末以水一大盞煎半盞熱服。食醫心鏡

膈氣疼痛

白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢酒下甚效。孫氏

食

哽

鷹糞燒灰水服方寸匕。外臺

噎膈吐食

用蛇含蝦蟇泥包煨存性研末每服一錢酒下。壽域方

噎

膈

用蛇含蝦蟇泥包燒存性研末米飲服

噎塞不通

寡婦木梳一枚燒灰煎鎖匙湯調下二錢。生生編

噎塞不通

羚羊角屑為末飲服方寸匕并以角摩噎上。外臺

膈氣吐食

用地牛兒二箇推屎虫一公一母同入罐中待虫食盡牛兒以泥裹煨存性用去泥

陳皮二錢以巴豆同炒過去豆將陳皮及虫為末每用一二分吹入咽中吐痰三四

次即愈。孫

氏集效方

膈氣吐食

用大鯽魚去腸留鱗切大蒜片填滿紙包
十重泥封晒半乾炭火煨熟取肉和平胃
散末一兩杵丸梧子大密收
每服三十丸米飲下。經驗

噎膈不食

黃犬乾餓數日用生粟或米乾飼之俟其
下糞淘洗米令淨煮粥入薤白一握泡熟

去薤入沉香末二錢
食之。永類鈴方

反胃噎膈

大力奪命丸牛嘔草杵頭糠各半斤糯米
一升爲末取黃母牛涎和丸龍眼大煮熟

食之入沙糖二兩
尤妙。醫學正傳

老人噎食

不通黃鵪雞肉四兩切茯苓二兩白麵六
兩作餽飽入豉汁煮食三五服效。養老
書

噎食病

數月不愈者用狗寶爲末每服一分以威靈仙二兩鹽二錢搗如泥將水一鍾攪勻

去滓調服日二不過三日愈後服補劑。杏林摘要

氣噎不通

雞嗉兩枚連食以濕紙包黃泥固煨存性爲末入木香沉香丁香末各一錢棗肉和

九梧子大每服下三九

噎食不下

人尿入蘿蔔內火煉三炷香取研每服三分黃酒下三服效。海上名方

噎食不下

用生人膽一箇盛糯米令滿入麝香少許突上陰乾一半青者治瘡一半黑者治噎

並爲末每服十五粒瘡用陳皮湯下噎用通草湯下。俱出普濟方

噎膈反胃

諸藥不效真阿魏一錢野外乾人尿三錢爲末五更以薑片蘸食能起死人乃趙王

困方也。永類鈴方。

膈氣不食

天靈蓋七箇每箇用黑豆四十九粒層層隔封水火升降楊梅色冷定取出去豆不

用研母服一錢溫酒下

噎食反胃

秋石下
用一錢白湯
酒下

噎

食

取明性爲末每服一匙以溫酒服。壽域神方

本草類方卷之二

反胃第十六

翻胃吐食

男婦皆治白善土煨赤以米醋一升淬之再煨再淬醋乾為度取一兩研乾薑二錢半炮為末每服一錢調下服至一斤以止為妙。千金翼

反胃吐食

或五味燒灰酒服或煮汁

反胃轉食

地龍糞一兩木香三錢大黃七錢為末每服五錢無根水調服忌煎燂酒醋椒薑熱

物一二服其效如神

反胃吐食

竈中土年久者為末米飲服三錢經驗。百一選方

翻胃吐食

梁上塵黑驢尿調服之。集簡方

本草類方

反胃

六

反胃噦逆

黑鉛化汁以柳木搥研成粉一兩入米醋一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許擣丸小豆

大每服一丸薑湯下。聖劑

多年反胃

不止紫背鉛二兩石亭脂二兩鹽鹵汁五兩燒鉛以鹵汁淬盡與亭脂同炒煇起挑

于水上煇止研勻蒸餅和丸梧子大每服二十丸煎石蓮乾柿湯下。聖濟方

反胃氣逆

胃虛鉛丹二兩白礬二兩生石亭脂半兩以丹礬研勻入坩鍋內以炭半稱煇赤更

養一夜出毒兩日入亭脂同研粟米飯和丸綠豆大每日米飲下十五丸。聖濟錄

脾疼反胃

靈砂一兩蚌粉一兩同炒赤丁香胡椒各四十九粒爲末自然薑汁煮半夏粉糊丸

梧子大每薑湯下二十丸。普濟方

反胃吐食

雌黃一分甘草生半分爲末飯丸梧子大以五葉草糯米煎湯每服四丸。聖濟錄

反胃吐食

絕好赤石脂為末蜜丸梧子大每空心薑湯下一二十丸先以巴豆仁一枚勿令破

以津吞之後乃服藥。聖惠方

反胃嘔吐

白礬硫黃各二兩銚內燒過入硃砂一分為末麪糊丸小豆大每薑湯下十五丸。

又方白礬枯三兩蒸餅丸梧子大每空心米飲服十五丸。普濟方

反胃上氣

食入即吐茅根蘆根各二兩水四升煮二升頓服得下良。聖濟總錄

反胃惡心

藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分為末每服一錢沸湯點服。聖濟總錄

脾虛反胃

白豆蔻縮砂仁各二兩丁香一兩陳廩米一升黃土炒焦去土研細薑汁和丸梧子

大每服百丸薑湯下名太倉丸。濟生方

反胃嘔吐

飲食入口即吐困弱無力垂死者上黨人參三大兩拍破水一大升煮取四合熱服

日再兼以人參汁入粟米雞子白薤白煮
粥與噉李直方司勳於漢南患此兩月餘
諸方不瘥遂與此方當時便定後十餘日
遂入京師絳每與名醫論此藥難可爲儔
也○李絳
兵部手集

血風反胃

香白芷一兩切片瓦炒黃爲末用豬血七
片沸湯泡七次蘸末食之日一次○婦人

良方

翻胃吐食

白麵二斤半蒸作大饅頭一個頭上開口
剗空將皂礬填滿以新瓦圍住鹽泥封固

空土窰安放文武火燒一日夜取出研末
棗肉爲丸梧子大每服二十丸空心酒湯

任下忌酒色

○醫方摘要

反胃上氣

蘆根茅根各
煮二升分服
○千金方
雨水四升

反胃吐食

火炊草焙為末蜜丸梧子大每沸湯下五十九。百一選方

反胃吐食

芥子末酒服方寸匕日三服。千金方

久冷反胃

經驗方用大附子一個生薑一兩剉細同煮研如麪糊每米飲化服一錢。衛生家

寶方用薑汁打糊和附子末為丸大黃為衣每溫水服十丸。斗門方用長大附子

一個坐于磚上四面着火漸逼以生薑自然汁淬之依前再逼再淬約薑汁盡半盃

乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服瘥或以猪腰子切片炙熟蘸食。方便集

用大附子一個切下頭子剉一竅安丁香四十九個在內仍合定線紮入砂銚內以

薑汁浸過文火熬乾為末每挑少許置掌心舐喫目十數次忌毒物生冷

反胃吐食

馬電兒燈上燒存性一錢入好棗肉平胃散末二錢酒服食即可下即野甜瓜北方

本草類方

反胃

八

多有之。

丹溪纂要

虛寒反胃

神麴六兩麥蘖炒三兩乾薑炮四兩烏梅肉焙四兩為末蜜丸梧子大每服五十丸米飲下日三服

和劑局方

反胃欬噫

生薑四兩擣爛入蘭香葉一兩椒末一錢鹽和麵四兩裹作燒餅煨熟空心喫不過兩三度效反胃入甘

蔗汁和之。普濟方

反胃膈氣

不下食者太倉散用倉米或白米日西時以水微拌濕自想日氣如在米中次日晒乾袋盛掛風處每以一撮水煎和汁飲之即時便下。又方陳倉米炊飯焙研每五

兩入沉香末半兩和勻每米飲服二三錢。普濟方

反胃吐食

脾胃氣弱食不消化湯飲不下用粟米半升杵粉水丸梧子大七枚煮熟入少鹽空

心和汁吞下或二納醋中吞之得下便已。心鏡

反胃羸弱

兵部手集用母薑二斤搗汁作粥食。傳信適用方用生薑切片麻油煎過為末軟

柿蘸末

嚼燕

反胃吐食

罌粟粥用白罌粟末二合人參末三大錢生山芋五寸細切研三物以水二升三合

煮取以合入生薑汁為鹽花少許和勻分服不計早晚亦不妨別服湯丸。圖經

反胃吐痰

柳樹草五七箇煎湯服即愈。活人心統

反胃噎疾

蘿蔔蜜煎浸細細嚼嚥良。普濟方

反胃上氣

白芥子末酒服一錢。普濟方

反胃吐食

乾柿三枚連蒂搗爛酒服甚效切勿以他藥雜之