

脾胃爲水穀之海 七情勞碌鬱悒內傷脾弱不能運化水穀之氣 沐鬱成熱熱氣熏蒸釀成濕氣傳化不及漬入四肢爲腫爲痛人壯氣實而初病者先攻其濕滲利小便虛人攻補兼施健脾導水乃標本兼治若一槩妄治愈攻愈虛腫痛愈甚漸加氣短妄認爲喘五子五皮反瀉其氣卒至天枉莫之能悞悲夫

麻黃白朮散 治感風濕身痛無汗發熱者

麻黃 白朮 甘草 桂心 杏仁

水煎服

羌活勝濕湯 治感風濕脊痛項強腰似折項  
似拔上衝頭痛及足太陽經不行

羌活 獨活 藁本 防風 蔓荆子

川芎 甘草

如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也加黃柏  
一錢附子三分蒼朮二錢水煎服

平胃散 治脾胃不和濕氣阻礙清道用此以

平其壅堵

蒼术

米泔水浸五斤炒三兩

厚朴

薑汁炒三兩

陳皮

各三兩

甘草

炒三兩

右爲細末，每服五錢，薑棗煎入鹽一捻，或沸湯點服。

防已羌活湯 治風濕相搏客在皮膚，四肢少

力，關節煩痛，脉浮身重，汗出惡風。

防已

一錢

甘草

炙五分

白朮

七錢半

黃芪

一錢二分

薑棗煎服，喘加麻黃，胃不和加芍藥，氣上衝

加桂心，下有寒加細辛。

升陽除濕湯 治脾虛不能運化濕盛瀉泄見

瀉門

三花神佑丸

見痰門

舟車丸

大黃

二兩各

甘遂

大戟

芫花

青皮

陳皮

兩各一

牽牛

頭末四兩

木香

半兩

右爲細末水丸桐子大每服六十丸白湯下  
二方藥性慄悍非氣實濕盛認真者不可輕  
用慎之慎之

用慎之慎之

茯苓湯 治脾虛手足浮腫小便赤澁氣急喘

滿

赤茯苓

澤瀉

香附子

桑白皮

大腹皮

陳皮

乾薑

各等分

病後產婦須大補脾虛回腫自消

蒼朮丸有鹽酒二製者有加童便米泔四製爲丸者無非滲濕補脾以脾喜燥故也大抵肥盛人宜此瘦人液少忌用

一切痰涎濕熱蘊結臟腑秘澁腸胃積熱留飲

神芎導水丸佳。卽神芎丸減黃連薄荷川芎，各五錢是也。

草薢木香散

草薢子  
茯苓  
猪苓  
白术  
木香

澤鴻  
木通  
甘草  
桂枝  
滑石

原方爲末湯調不若煎服妙

經驗白术酒治中濕遍身疼痛不能轉側及皮肉痛難着席白术一兩無灰酒盞半煎一盞去

查溫服

甘草附子湯 治風濕相搏，一身盡痛，不得屈伸。

近之痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，身體微腫而痛。

甘草 桂枝 附子 白朮


薑棗煎服

瓜蒂散 治寒濕中頭面黃，鼻塞而煩，脈數大。

瓜蒂

一味爲末

右以些少吹鼻中，其水自下，濕痰濁液留于上焦，頭目肩背脹麻痺者立驗。



躁

麻澁而緊或浮而弦或細而濶或芤而虛  
大都因血虛有火變爲燥病易曰燥萬物者莫  
燂乎火是也 在外則皮毛枯槁在上則咽乾  
口燥在中則煩渴不已治宜生津養血涼血滋  
陰潤燥切忌燥劑如半夏蒼朮之類

丹溪曰皮膚皴揭折裂血出大痛或肌膚燥癢  
皆火燥肺金燥之甚也宜四物去川芎加麥門  
冬人參天花粉黃柏五味子之類治之

生血潤燥飲 治血中有火時值秋燥皮膚拆  
裂手足枯燥搔之血出痛楚指甲反出而莫  
能搔痒

川歸

生地

熟地

黃芪

各一錢

天門

半錢

麥門

一錢

五味

九粒

片芩

酒洗五錢

括蔥仁

桃仁泥

各五分

酒紅花

一分

升麻

二分

水煎服大便燥加麻仁郁李仁

瓊脂膏 治血虛皮膚枯燥及消渴等症

生地黃

二十斤洗淨細棉取汁

鹿角膠

一斤

白沙蜜

二斤煎  
沸掠去上沫

真乳酥油

一斤

生薑

二兩  
取真片搗

先將地黃汁文武火熬數沸，以絹濾取淨汁。  
又煎二十沸，下鹿角膠，次下乳酥及蜜，同  
煎良久，候稠如餳，以磁罐盛，每服一二匙，  
空心溫酒調下。

瓊玉膏

治症同前，及肺虛咳嗽甚者。

兒虛損門

天門冬膏

治血虛肺燥，皮膚拆裂，及肺痿唾

膿血症

卷四  
天門冬

新掘者不以多少無則用乾者去皮心潤透搗爛絞取汁澄清以布

瀝其渣用銀砂鍋慢火熬成膏每用一二匙空心溫酒調服

地櫑煎治諸燥症

山藥

一斤杵細

杏仁去皮尖

生牛乳汁

二升

右將杏仁研細入牛乳山藥拌勻絞取汁用新磁瓶密封重湯煮一日每服一二匙空心溫酒或湯調下

和血益氣湯 治口燥舌乾便數舌上赤脈此

藥生津液除乾燥生肌肉

見消渴門

當歸潤燥湯 治大便秘塞、乾燥、結硬、兼喜濕

飲陰頭退縮、舌燥口乾、眼澁難開等症

生津甘露湯 一名清涼飲子

治消中能食而瘦、口乾舌燥、自汗大便硬

小便數、

生津甘露飲

同上法

辛潤緩肌湯 治諸燥饑渴及皮膚燥澁等症

四方

俱見消渴門

潤腸丸 治大腸乾燥、秘結、能潤燥和血

潤燥湯 治同上

活血潤燥飲 治大腸風秘、血秘，常常燥結。  
通幽湯 治在幽門以辛潤之

門

四方俱見秘結

小寒

脉沉遲或伏或微弱外症四肢強直口噤目睭  
面色清白或自汗或吐利卒然得于嚴寒之時  
氣虛表弱寒邪乘虛直入于三陰之經所致與  
中風相類但脉不浮無痰聲爲異耳當溫中散  
寒兼表症脉浮遲微弱者五穎散沉遲而微者  
理中湯加桂枝重者加附子乃倉卒受邪暴病  
不分經絡惟當溫補參术炮薑肉桂有汗加黃  
芪脉不至加當歸

霹靂散用附子一枚炮熟細研入真臘茶一錢  
用一半水一盞煎六分臨熟入蜜半匙放溫服  
之

五積散 治表裏虛豁寒傷內外症身痛脊  
強頭疼惡寒或熱或不熱內証中脘脣腹絞  
痛吐瀉霍亂脉沉伏欲絕者急煎投之

川芎 當歸 白芍酒炒二陳桂

麻黃 桔梗 枳殼 厚朴 炮薑

人參 白芷 蒼朮

臺棗煎

真武湯 治寒中少陰小腹絞痛小便不利四

肢沉重瀉利

附子

錢半

茯苓

白芍

炒

生薑

各三錢

白朮

二錢

水煎服

憲變法陰症直中腎少陰之經、忿事後感寒、或多慾陽虛寒乘虛入脾腹絞痛、手足青紫厥逆脉微欲絕急煎附子理中湯外用葱一束如茶盞大扎緊切一指厚一段置脾上以熨