

驗方新編

卷五

卷六
卷七
卷八

肚腹
脇部
小便
大便
滯瘡
兩股
海底
眼足
背部
淋症
泄瀉
痢疾
遺精
腰疾
前陰
後陰
鼓脹



驗方新編卷五目錄

肚腹

腹痛辨症

陰症腹痛

寒症腹痛

肚腹畏寒

熱症腹痛

蟲疾腹痛

大人小兒腹中癥疾蟲疾作痛及男婦痞塊癥瘕各項肚腹
脹痛

食滯腹痛

身受寒熱心腹疼痛上下關格不通大便閉塞小便短澁渾身
繃緊手足腰膝僵硬不省人事



南京中医药大学图书馆版权所有

忽然肚脹如鼓

腹中緊脹

肚腹麻木

忽然肚黑

肚腹脹大亮如水晶

肚眼出血

臍中出水

臍眼出濃

肚腹堅硬臍眼出蟲

肚腹左右生癰

肚臍生癰

少腹痛

小腸痛

臍下二三寸關元丹田二穴令結小腹有形作癰

腸胃中癰不可忍

增補疝古方

瘡疾



治瘡諸方

腹中堅如鐵石痛如刀割
忍掃撥不盡

婦人血蠱

米瘕好食生
米者是

風癩

龜鼈癩

腹脹面黃

蟲疾

寸白蟲疾

蟄蟲上出口臭

髮癩

好飲清油者是吸中
如有蟲上下亦是

肉癩

常喜食
肉者是

蛇癩

蛟龍癩

鼓脹附浮腫

鼓脹辨症

水鼓小便不通

治氣鼓法

各種鼓脹

肚腹脹滿飲食如常

通身浮腫

病後浮腫

食物積滯腹脹如鼓

十種水腫

治血鼓法

治水鼓法

目滿閑盃法

脇部

兩肋之下為脇愚人多有以肩甲下為脇者不可不知

左脇有聲作疼

脇氣疼痛

怒氣動肝寒熱旬日左脇凝緊作痛難以舒轉



南京中医药大学图书馆版权所有

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongl

左腸作痛

右腸有形攻心作痛嘔吐清涎遍週身寒凜痛止則無

右腸脹痛不食

肝燥腸痛

兩腸不時作痛

腸痛連腰脊不能轉側

腸痛腸出臭穢

腸下生瘡

脇下漏瘡形如牛眼

兩腸脹滿

背部

發背治法

背癰諸方

腰部

背熱如火



南京中医药大学图书馆版权所有

腎虛腰痛

閃跌暈打腰痛

脾濕腰痛

腎虛腰痛腳軟

腰腿風濕冷痛

男婦腰痛如刺而腫而黑氣血虛憊髮落齒枯唾涕屎
痛不能行

各種腰痛

纏腰丹

腰痛牽心氣絕欲死



南京中医药大学图书馆版权所有

驗方新編卷之五

肚腹

腹痛辨症

腹痛各症應與
傷寒門參看

臍眼上痛者食痛也臍眼下痛熱手按之不痛或其痛多急或如刀割或吐或瀉或痛甚而覺有冷氣皆寒痛也手按之更痛冷微發之不痛或自下而痛上或時痛時止腹滿堅結皆熱痛也時發時止痛在一處而不移者或有塊硬起者蟲痛痞痛也又聞煎炒食物香氣則痛痛時口吐清水或口渴者亦蟲痛也

陰症腹痛

男女交合之後或外受風寒或內食生冷等物以致肚腹疼痛腎囊



俗謂卵胞內縮亦有不縮者手足癱屈紫黑重則牙緊氣絕謂之陰症傷

寒治法見卷十四傷寒門

寒症腹痛

參看陰症
陽寒各方

或炒鹽熨之或炒葱姜熨之或用熱灰熨之或用滾水一壺溫布敷之均止痛妙法也

又方 或飲胡椒湯加糖冲入不可加鹽或飲姜湯均妙

又方 龍眼蓮壳燒存性研末免酒服屢試屢驗

又方 白芍三錢甘草一錢肉桂各一錢水煎服此張仲景神方也

肚腹畏寒

肚腹容易受寒動輒疼痛不已甚至寒中三陰命在須臾遲則難救



此下部虛損真陽不足命門火弱故也非大加腹畏寒上貼附桂
又加厚棉腰圍數層遇寒仍不濟事一老醫以製附子鐵乾姜白芍
肉桂五分研末兑服無上桂不用亦可水煎連服十餘劑雖天寒肚腹亦
加補中補氣等藥調理全愈附子走而不守得乾姜則守
不信單用附子一味熬濃汁滴紙上水必散開加乾姜熬之滴紙上
則水不散矣用炮姜則不效此秘傳也

又方 九製硫磺丸見內外備服之神效

熱症腹痛

服六一散最妙或用銅鐵冷物熨之或服痧藥亦可若痛甚者或嘔
或瀉者照卷十五霍亂痧症各方治之又上吐下瀉而腹痛者如作

霍亂痧症治之不效須照噎膈反胃門內上吐下瀉方治之

蟲疾腹痛

蟲痛如有塊硬起者用手在硬處久久揉擦揉至一日其蟲即死大便而出或查痞疾門各方治之

大人小兒腹中疳疾蟲疾作痛及男婦痞塊癥瘕各項肚腹脹

脹痛

方見痞疾門

食滯腹痛

方見飲食滯積門

身受寒熱心腹疼痛上下關格不通大便閉塞小便短濁渾身



絆繫于足腰膝彊硬不省人事

照卷十一內外備用諸方門土熨法治之最妙

忽然肚脹如鼓

此症肚腹猝脹漸大如鼓此寒極也遲則不救急用武營黑
錢爆竹藥功緩不效以頂好燒酒煎滾沖服得吐瀉即生非陡然
大者不可誤用

腹中緊脹腹硬如石痛如刀割見後瘡疾門

白糖煮酒飲數次即愈

肚腹麻木

此風襲也多葱葱頭食一並用葱姜炒熱熨之自愈



忽然肚黑

凡肚皮忽然青黑色此乃血氣失養風寒得以乘之所變怪形真惡之敗症也若不速以難救急用大青研細末每服一錢五分以好酒調下黑退即愈否則必死此起死回生之方也 大青多生溪溝旁葉似火麻葉藥店多有 生草藥店有之又有小青葉細性味相同 力稍緩

又方 鉛粉和鹽炒焦敷之亦效

肚腹脹大亮如水晶

柚子皮燒灰冲服神效柚子兩廣最多他省頗少以橘紅代之亦可
又方 取癩蝦蟆六隻將四足繫住以蝦蟆肚皮在人肚腹光亮之

處輕輕摩擦幾次再取一癩蝦蟆照前摩擦用至六隻即愈

蟆眉內有蟾酥須防其迸出射人傷眼宜用紺帕遮住遇人而眼

蝦蟆用過之後即放水中使
吐毒氣以救其命至要至要

臍眼出膿

此症先流臭水久則出濃不腫不疼多年不愈用蕪菜葉扁柏葉
味天搗取汁一酒杯加童便一茶杯蒸熱服外用蘆甘石
要能浮於水上者用好醋泡一晝夜瓦上焙乾研末敷如不見效當請明醫即治之不可忽也

臍中出水

龍骨醋泡焙枯研敷或用赤石脂研末敷均效或照上臍中出膿



方治之更妙

脣眼出血

方見諸血門

肚腹堅硬脣眼出蟲

方見痞疾門

肚腹左右生癰

即腸癰也須照腸癰方治之

肚脣生癰

肚脣腫大如瓜脣眼高突者是紅赤者照癰毒

治之不紅不熱

者照陰疽各方治之



小腹疽

生臍下一寸五分氣海穴或生二寸關元穴或生三寸丹田穴有七情火鬱而生也分別紅白陰陽治之

小腸疽

生小腹內按之如掌堅硬而熱微痛小便多出汙畏寒皮色如常時或現微腫脈繁實而有力者是也服犀黃丸見陰疽門即愈此林屋山人秘法也

臍下二三寸關元丹田二穴冷結膀胱小腹有形滿痛手足厥

厥冷

此厥陰傷寒重症宜用仲景當歸四逆湯治之 桂枝 當歸

各味



中醫藥大學圖書館版權所有

芍藥參錢細辛參分通草壹錢甘草捌分大棗貳枚水煎服神效其人有久寒者加吳茱萸分生姜壹錢酒一小盃兑服

腸胃中癢不可忍

此火鬱結不散所致用柴胡
梔子炒花粉各參白芍壹兩
貳錢煎服即愈

治疝古方

薏苡仁壹兩用東方壁土炒黃色入水煮爛放沙盆內研成膏每用無灰酒調服二錢即消

痞積

凡腹內瘀血凝結疼痛時發時止謂之痞積又有形者為癥無

