

午 4 44

51

惲西園痧麻疹三科定論

序

前人痘書立局辨論固輒立方用藥各有殊途蓋因人之氣稟有不同地之寒暄各異讀文書而能不誣古人其幾乎^庶不^庶凡當場辨症須憑眼力有咽症頃刻存亡有順症藏逆反致不救險症生死如隔片紙早能辨此表下清改溫托用藥得宜即醫中之三昧矣痧痧兩症出自六經六由胎毒觸動天行疫氣痧重肺麻重胃兩經皆其居多世人薄視痧痧為淺易殊不知變化倏忽捷於痘症况耗氣立斃傷陰蔓延病付諸命醫其竭其才苟能不謬醫之理斯為不愧醫之心噫聲華籍甚究此心理不為汗顏其為誰憚子西園吾郡東南鄉醫士也讀

痧痢痘三科之考行痧痢痘三科之業生平最喜聶久吾黃海陽兩先生
遵其高辨論方理治則酌古宜今守中正之法也每念醉元一老惜其刻本
恐日久湮沒屢欲付梓力有未逮及至易簣前囑子際雲望以此志必行慰生平之
願今年春暮兩令嗣衡門先願道先人遺意以醉元出自己揆次分編其有未
備搜羅古書以補之極服其允當又先人手錄西園醫業就商捧讀之下知
為勤學士也有結實工夫無浮僻議論隨症用藥葉固執用一湯飲儘有
來歷既不貪功又不冒險所設膽大心小非欺以西園為人正直道有才用生西園君
之內宜也醫案一出足為後學津梁附醉元之末以垂不朽快事也是為序

道光六年
武進尤品
效坤氏拜

西園痧科麻科痘科目錄

陽湖惲熊西園氏著

痧論

痧科醫案 十一條

麻論

心參麻症論 八條

麻科醫案 五條

紫霞疹 附

痧麻湯飲 十五方

治痧脩觀 七法

水痘看法 五辨

夾丹 一辨

痘原集論

西園贅論

順中之順 案一條
順中之逆 案三條
險中之險 案四條
逆中之順 案三條
逆中之逆 案十條

順中之險 案四條
險中之順 案四條
險中之逆 案三條
逆中之險 案四條

痧論

痧將見時必背抵喉目赤淚汪呵欠噴嚏理宜面部先見或時值寒天面部
為寒氣所遏之間有先於背脊點形有顆粒而無根脚浮於肌膚之間色之淺
深由邪之輕重有涕淚而聲和即氣急而不憲無涕淚而氣厲即氣平而掌
自見點玉齊無鬱遏之象雖見諸般邪火尚可異生退有痧疤即有餘火
猛烈猶為可治痧當退時或感冒風寒而早沒或氣血虛而早隱變幻百出
多致不救夫自始至終原有常法初則疏肌解表火甚則清涼兼解退
則涼血調氣解毒猛則大劑苦寒虛則育陰退抵虛甚則助氣攝陰倘痧

見灰滯紫色內症躁亂不安外象毒盛難越或元氣不能逆毒必內閉而
自陷雖神醫莫救色或紅而不滯氣或急而不喘庶可逆中歸險險中
挽順若四肢已齊色澤光潤內症和平此為順症一見紅紫聯片灰滯毒
盛火熾急宜清解內症不平防苦喘口疳下痢腹症甚速蓋此症而實
不可治毒盛而虛其難痊種之變幻言之難盡總在臨症時心領神會耳
又云痧麻痘三科依期用藥層使分明規矩準繩之法也

痧科醫案

秦宅男年未二周時新正二日邀余視頭面痧早沒胸腹及背紫滯聯片四肢痧掌

見咽飲作嘔乳汁難嚥已二日矣詢前醫所用俱是濃粘之味以致藥難下嚥又
以梨汁飲之舍藥苦不得飲乳亦因此畏哺為梨本寒物時寒而用寒拙
也用青菓溫湯徐送下五寶化毒丹服之三日批退身涼此症其氣幸不
急故能致捷效功諒兒之幼弱當服藥之苦煩度天時之寒熱用之得宜耳

李宅双生兩男半歲出痧頭面早沒胸背及下身俱紅紫堆砌片眉眼不開口舌
粘幸氣不急唇尚紅活此醫士措舉家驚惶邀余視其時八月間用鮮梨緩汁徐
送下五寶化毒丹未及周時目開哺乳之愈

降子橋李宅女年五時有終痧症面紅腫胸腹膨大得看但看背与四肢紅紫

聯片氣粗壯目紅唇燥煩渴不安溺赤便堅診脈洪數酌用犀角羊

角煎湯不時飲又用鮮蘿白絞汁燉溫送下五寶化毒丹而愈

沈宅女年十六備舟數余視時值中秋至宅已三更診脈洪而數面漫紅兩眼赤甚

唇俱紅舌見黃苔氣粗澹語胸腹脹但看手足背上已透煩渴引飲經水妄

行火甚無他症也用犀角 羚羊角 鮮薑 元參 赤芍 連翹 山梔

丹皮 天花粉 澤蘭葉 紅花 淡竹葉 西河柳 嫩蘆根男煎湯 女代水

其父南園應試伊曰我女雖小與大人無異今服此寧涼可乎余曰扣入血室迫血

妄行若不清血室之熱必甚狂譫語古語云有病則病當何畏焉即修合

服之次日見退。繼以滋陰降火。連進三劑而安。

孟移楊宅。年九上元節前。發熱頭疼身痛。皮毛若刺。痧形隱。不現。又兼怕寒。戰慄。此傷寒夾痧症也。用疏肌透毒湯。後服一劑。方見標於額下。肢俱冷。氣粗。痰壯。大便不行。仍用前方。加黃芩。外用清肌沸湯。燻之。次日痧透。上身堆砌紫滯。

下身兩腿畧見。面足背全無。照法再燻。內服。獨活。荆芥穗。活貫仲。洗

木通。杏仁。防風。赤芍。元參。葛根。大力子。白茅根。西河柳。

次日其舌乾芒刺。譫語狂言。手揚欲去衣被。面足背漸見。內服。烏犀尖。

赤連。鮮生地。活貫仲。洗。元參。丹皮。連翹。赤芍。地骨皮。知母。

山柰 淡菜 熟石膏 青蘘溫湯送下五寶化毒丹次日諸症稍平

視瘳不甚暢且古云毒伏火熾為難捷效以前方玄以連加麥冬鮮石斛連

服二劑次日用滋陰扶胃湯後服二劑胃氣已開惟見潮熱謹慎調理

二十日見此症自始至終信醫藥調餌守經行權乃得保全其恙

廣巷沈宅女年方五歲邀余視病已沉食少進面恍白唇舌鮮紅惟見噁

心潮熱身體怠倦腹痛下痢粘膠紅色脈虛而數此係正邪邪甚與時病類

同酌以黃芩芍藥甘草湯合左金湯 北沙參 雲茯苓 煨木香 桔梗 陳皮

為藥 黃芩 生銀花 炙甘草 延胡索 川連 同開口藥黃芩粒 煨中即左金方 紅麴 藕節

僅服一劑面得微汗身上有惟腹下裏不止前方玄左金延胡加蒼朮阿膠炒又服一劑
周身得汗痛止痢減用調脾養正飲數劑而愈

蔣宅男年四歲痧後身振煩燥不安口氣甚穢乳食不進赤右頰上外則黑如棋

子黑處有界限其可治至界限其難治內則腐爛如錢大形如浸潮棉絮浸胖水龍骨以鉤掛取之

氣息冲人余曰急治可救用金銀花湯繳不計數次後必脫黑穿破內服黃連

解毒湯上川連 元參 大力子 天花粉 連翹 生石膏 再加

丹抄患處循序從法三日後脫去黑腐狀如牙疳吹口丹內加龍骨赤脂

內服鮮生地麥冬 連翹 鮮石斛 銀花 桔梗 淡竹葉 連進四劑

二十日收功成皺腮豁嘴

楊姓男病後患疳鼻息冲人右颊上外黑而腐与前疳相同幸氣不喘促飲食得進黑有界限紅散漫治法同前脫黑穿頰而愈亦成豁嘴

按疳之所患最怕當喉初見白星漸見散赤顴漸大次箸頭或大如莖
少兒而微玄淨其搽藥易治多見而堅牢微不動其難見切唇上下及左
右兩顴舌上舌根下須用心細看有則必宜微淨用吹藥對症施治但求
氣平其生喘促其死目閉神爽其愈咳逆涎裡噎其危經云邪從外解
其順裡陷伏其逆上則喘促鼻插下則泄瀉血痢凡疳虛其脈不及三至

症實肺不過亢至怪症多端不執一

王宅男痧後滿口潰爛氣息冲人號叫不已邀余視自唇口起至鼻兩頰及

地閣里女生漆亮如烏金紙只留人中未破余告曰靈丹到眼時耳

果漸安
黑眼而亡

朱氏男年十患疳積四日湯水難嚥邀余視氣稍不平聲音不爽目光尚開

視其口並其形也望喉嚨子上有結如棉朵之狀即用銀簪徐挑撥吐出異

形白垢一大塊以七寶化毒丹吹之內服黃連解毒湯連二劑即能啜粥未

退神未爽延至四日復邀余視前症復起滴水難進余怪其遲緩啟事

主曰則跡遠一則不肯服藥吹藥是以至此余曰喉封氣急心火刑金毒

邪內擾必至潰敗症不治矣後三日果喘促而死夫生死雖有命治可緩乎李時
橫林秦姓男八歲時值嚴寒漫天風雪延余視痧速上身截下而足且厥冷
如冰胸腹如焚烙只氣不急用煙法方得大汗內服疏肌速毒湯方速出
更用清涼解毒飲而愈此早治之效也
光緒丙戌年痧症甚多殆初治者
不誤歟 何惠龍誌

西園麻科卷中

麻其疫癘氣也一人感觸纏染牽聯挨以閤戶漸至一方其邪毒從鼻
而出染其口鼻更輕重不一老少俱染出過不染其發必先咽痛封喉紅碎
裡結有單結及結當喉腫脹或一
或兩邊俱紅碎外結亦有單結及結腮下腫毒或一
或兩邊俱紅碎無論

裡外單結共十枚九枚結共百中難挽一二嘉慶三四年間此症甚多且多

瘦幻裡結用銀簪挑

忌挑喉嚨子宜挑兩旁出血

探吐或荔枝草絞汁飲即吐或用生肌散仁合研搗傷

嘔吐痰涎甚其

一日三四次內服之藥必須對症可奏功遲則氣促頭搖目直視或閉合難

開喉封滴水難進死症外結共顯下左右有塊費批一二日按兩腮初櫻

桃如杏如桃漸大如红柿若癰得尖頭易於出膿內症平和定能飲食治

之即愈即結如紅柿狀頂凹四圍腫脹下脹過咽隘上脹撐牙痛色

紅則白腹紅之變紫之變黑之如漆光皮潰爛望膿內見膿棉

鉤鉗不動腐必穿肉

必喘促而死不論單及俱有此惡候

將梟其放在銅脚
爐內烘被甚妙

按痧与麻輕重不一治法類同麻最咽喉裡外結毒痧則無此惡候若犯
凶症其初俱宜黃汗四肢方能通足得汗之道用燻用擦各值嚴密
最妙煤白茄其時當盛暑至良其標以元荃酒若夫表實要藥則麻
黃馬勃淡豆豉射干西河柳白茅櫻桃核等是也裡實要藥則大
黃枳實檳榔等是也以上諸法用於黃批見標未齊未足將各將是時
或內結毒用挑吹探吐外結毒用敷藥膏丹是皆已者方為達是裡
批服黃連犀角眼紅單服荊羊角紅紫連片堆砌服鮮生地骨皮元
參飲不下嚥服化毒丹即醉元用春膏飲之加減法認明何經之何經之