

武昌醫館叢書

二二



傷寒論卷第三

漢 張仲景述 晉 王叔和撰次

辨太陽病脉證并治中第六 合六十六法方三十九首并見

太陽陽明合病法

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之第

一七味

太陽陽明合病必自利葛根湯主之第二 用前第一

方一云用後第四方

太陽陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯

主之第三 八味



太陽病桂枝證醫反下之利不止葛根黃芩黃連湯主之第四 四味

太陽病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃

湯主之第五 四味

太陽陽明合病喘而胃滿不可下宜麻黃湯主

之第六 用前第五方

太陽病十日以去脉浮細而嗜臥者外已解設

胃滿痛與小茈胡湯脉但浮者與麻黃湯第七

用前第五方小茈胡湯七味

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而



煩躁者大青龍湯主之第八 七味

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證

大青龍湯發之第九 用前第八方

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬小青

龍湯主之第十 八味加減法附

傷寒心下有水氣欬而微喘小青龍湯主之第

十一 用前第十方

太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝

湯第十二 五味

太陽病下之微喘者表未解桂枝加厚朴杏子



湯主之第十三 七味

太陽病外證未解不可下也下之為逆解外宜

桂枝湯第十四 用前方十二方

太陽病先發汗不解復下之脉浮者當解外宜

桂枝湯第十五 用前方十二方

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解

表證在發汗已發煩必衄麻黃湯主之第十六

用前方第五方下有太陽病并二陽併病四證

脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯第十七 用前方第五

方一法用桂枝湯



脉浮數者可發汗宜麻黃湯第十八

用前第五方

病常自汗出榮衛不和也發汗則愈宜桂枝湯

第十九

用前第十二方

病人藏無他病時自汗出衛氣不和也宜桂枝

湯第二十

用前第十二方

傷寒脉浮緊不發汗因衄麻黃湯主之第二十

一

用前第五方

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯小便

清者知不在裏當發汗宜桂枝湯第二十二

用前

第二十二方



傷寒發汗解半日許復熱煩脉浮數者可更發

汗宜桂枝湯第二十三

用前第十二方
下別有三病證

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不
嘔不渴無表證脉沈微者乾薑附子湯主之第

二十四 二味

發汗後身疼痛脉沈遲者桂枝加芍藥生薑各

一兩人參三兩新加湯主之第二十五 六味

發汗後不可行桂枝湯汗出而喘無大熱者可

與麻黃杏子甘草石膏湯第二十六 四味

發汗過多其人叉手自冒心心悸欲得按者桂

枝甘草湯主之第二十七 二味

發汗後齊下悸欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗

湯主之第二十八 四味下有作
甘爛水法

發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯

主之第二十九 五味

傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胃頭眩脉沈緊

者茯苓桂枝白朮甘草湯主之第三十 四味

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子

湯主之第三十一 三味

發汗若下之不解煩躁者茯苓四逆湯主之第



三十二 五味

發汗後惡寒虛故也不惡寒但熱者實也與調

胃承氣湯第三十三 三味

太陽病發汗後大汗出胃中乾躁不能眠欲飲

水小便不利者五苓散主之第三十四 五味即豬苓散

是

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之第三十五

用前第三十四方

傷寒汗出而渴者五苓散不渴者茯苓甘草湯

主之第三十六 四味



中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲
水水入則吐名曰水逆五苓散主之第三十七

用前第三十四方
下別有三病證

發汗吐下後虛煩不得眠心中懊懣梔子豉湯

主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔

子生薑豉湯主之第三十八

梔子豉湯二味梔
子甘草豉湯梔子

生薑豉湯
並三味

發汗若下之煩熱胸中窒者梔子豉湯主之第

三十九

用上
初方

傷寒五六日大下之身熱不去心中結痛者梔



子豉湯主之第四十

川上初方

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯

主之第四十一 三味

傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩者梔子乾

薑湯主之第四十二

二味下有不可與梔子湯一證

太陽病發汗不解仍發熱心下悸頭眩身瞤真

武湯主之第四十三

五味下有不可汗五證

汗家重發汗必恍惚心亂禹餘糧丸主之第四

十四

方本闕下有吐虵先汗下二證

傷寒醫下之清穀不止身疼痛急當救裏後身



疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表

宜桂枝湯第四十五

桂枝湯用前第十
二方四逆湯三味

太陽病未解脉陰陽俱停陰脉微者下之解宜

調胃承氣湯第四十六

用前第三十三方一云
用大茈胡湯前有太陽

病一
證

太陽病發熱汗出榮弱衛強故使汗出欲救邪

風宜桂枝湯第四十七

用前第十二方

傷寒五六日中風往來寒熱胃脅滿不欲食心

煩喜嘔者小茈胡湯主之第四十八

再見茈胡
湯加減法

附



血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣分爭往來

寒熱休作有時小茈胡湯主之第四十九用前方渴

者屬陽明證附下有
茈胡不中與一證

傷寒四五日身熱惡風項強脅下滿手足温而

渴者小茈胡湯主之第五十用前方

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先與小建

中湯不差者小茈胡湯主之第五十一用前方
小建中

湯六味下有嘔家不可用
建中湯并服小茈胡一證

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之第

五十二用前方第五十一方



太陽病過經十餘日反二三下之後四五日此
胡證仍在微煩者大芫胡湯主之第五十三

加大

黃八味

傷寒十三日不解胃脅滿而嘔日晡發潮熱芫

胡加芒消湯主之第五十四 八味

傷寒十三日過經讞語者調胃承氣湯主之第

五十五 用前第三十三方

太陽病不解熱結膀胱其人如狂宜桃核承氣

湯第五十六 五味

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利讞語身



重者茈胡加龍骨牡蠣湯主之第五十七十二

傷寒腹滿譫語寸口脉浮而緊此肝乘脾也名

曰縱刺期門第五十八

傷寒發熱嗇嗇惡寒大渴欲飲水其腹必滿自

汗出小便利此肝乘肺也名曰橫刺期門第五

十九下有太陽病二證

傷寒脉浮醫火劫之亡陽必驚狂臥起不安者

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之第

六十七味下有不可火五證

燒針被寒針處核起必發奔豚氣桂枝加桂湯



主之第六十一 五味

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣

湯主之第六十二 四味下有太陽四證

太陽病過經十餘日温温欲吐胃中痛大便微

澹與調胃承氣湯第六十三 用前第三十三方

太陽病六七日表證在脉微沈不結胃其人發

狂以熱在下焦少腹滿小便自利者下血乃愈

抵當湯主之第六十四 四味

太陽病身黄脉沈結少腹鞭小便自利其人如

狂者血證諦也抵當湯主之第六十五 用前方



傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者有血

也當下之宜抵當丸第六十六四味下有太陽病一證

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之方一

葛根 四兩

麻黃 三兩 去節

桂枝 二兩 去皮

生薑 三兩 切

甘草 二兩 炙

芍藥 二兩

大棗 十二枚 擘

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去白

沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似

汗餘如桂枝法將息及禁忌諸湯皆做此

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之方二

