

酉 13

844

淮陰吳鞠通先生醫案



淮陰吳鞠通先生醫案

肺癰

王氏五十六歲

癸亥三月初八日

初起喉痺。爲快利藥所傷。致成肺癰。胸中痛。口中燥。喉痺仍未痊。不食不寐。痰氣腥臭。已有成膿之象。脉短而數。寒熱且移。熱於大腸而泄瀉。難愈之證。勉與急急開提肺氣。議千金葦莖湯與甘桔合法。

桔梗 二兩

甘草 一兩

桃仁 五錢

冬瓜仁 五錢

苡仁 一兩

鮮葦根 四兩

水八碗。煎三碗。二煎再煎一碗。分四次服。

飲火酒。坐熱炕。晝夜不寐。喜出汗。寐誤服枇杷葉麻黃等利肺

藥致傷津液。遂成肺癰。臭不可當。日吐膿二升許。用千金葦莖

湯合甘桔湯。

蘆根 八兩
苡仁 二兩
桃仁 兩半
冬瓜仁 兩半

桔梗 三兩
生甘草 一兩

煎成兩大菜碗。晝夜服過碗半。膿去十之七八。盡劑膿去。

八九。又服半劑。毫無臭氣。調理脾胃收功。

柴詠齋 五十餘歲

以己卯年二月初受風。與桂枝湯一帖。風解。膽怯不敢去厚衣。因而汗多。初四五日。又受風溫。口渴思涼。脉洪數。先與辛涼輕劑。不解。脉又大。汗更多。口更渴。身更熱。因與辛當重劑石膏等一帖。身涼渴止。脉靜。仍膽怯不去厚衣。初十日當大差。坐夜起。



五更衣更厚。途間不敢去皮衣。以致重亡津液而成肺癰。與葶
莖湯二三兩一帖。服至五七日不應。膿成臭極。加苦葶藶子五
錢。膿始退。未能十分淨盡。後十日又發。膿又成。吐如綠豆汁。濃
臭。每吐一碗餘。又於前方加葶藶三錢。服二帖。方平復。以補胃
逐痰飲收功。再其人色白體肥。夙有痰飲。未病之年。前秋冬兩
季。以在。

上書房行走。早起恐寒。誤服俗傳藥酒方。本不嗜酒。每早強飲
數小杯。次年患此恙之由也。

山醫案
卷五



北京中医药大学图书馆版权所有

淮陰吳鞠通先生醫案

喉痺

脉弦而長。木氣太旺。與君火結而成喉痺。

荊芥穗 二錢

薄荷 二錢

元參 八錢

銀花 六錢

牛蒡子 五錢

連翹 五錢

馬勃 二錢

人中黃 二錢

共爲粗末。分八包。每一包蘆根湯煎。一時一服。

酒客脉弦數。與苦藥清酒中之溼。卽於前方內加

桔梗 四錢

射干 四錢

黃芩 四錢

兒茶 三錢

煎法如前。

舌苔邊白中濁。喉腫而痛。頭暈身熱。脉數。癘氣所干。切戒穀食。

乙丑六月
二十六日

急開關竅。用時時輕揚法。

桔梗 八錢

人中黃 三錢

薄荷 三錢

荊芥穗 三錢

元參 一兩

牛蒡子 八錢

黃芩 三錢

黃連 三錢

馬勃 二錢

板藍根 三錢

殭蠶 三錢

連翹 八錢

銀花 八錢 去蒂

鮮荷葉 半張

共為粗末。分八包。一時許服一包。蘆根湯煎。

舌濁甚。邪之傳化甚緩。於前方內加

黃芩 二錢 成五錢

黃連 二錢 成五錢

溼熱厲氣相搏。以成喉痺。舌苔重濁色暗。必得溼氣宣化。而後熱可以解。蓋無形之邪熱。每借有形之穢濁。以為依附故也。因

二十八日

二十七日

前法而小變之。

桔梗 八錢

人中黃 二錢

黃芩 五錢

黃連 五錢

馬勃 五錢

牛蒡子 五錢

僵蠶 三錢

連翹 八錢

銀花 八錢

通草 三錢

荊芥 二錢

杏仁 五錢

薄荷 三錢

滑石 一兩

犀角 三錢

共爲粗末。分十包。一時許服一包。每服鮮荷葉邊 二錢。蘆

根 三錢。同煎去渣服。

喉痛雖止。舌濁未除。脉仍微數。則其中之溼可知。按靈樞經五

臟溫病。以舌苔專屬之肺。故藥方一以宣通肺氣爲主。蓋氣化

則溼化。而火亦無依矣。

桔梗 三錢 人中黃 八分 連翹 二錢 銀花 二錢

黃連 錢半 黃芩 二錢 馬勃 八分 通草 一錢

杏仁泥 一錢 滑石 三錢 蘆根 一枝 荷葉 半張

今晚一帖。明早一帖。

王二十歲

浸 壬午四月十一日

溫毒身熱喉痺滴水不能下咽已二日矣。與代賑普濟散二十包。先煎一包。銜入口內。仰面侵漬喉瘡。一刻許有稀涎滿口。卽挖出吐之。再嚙再浸如上法。嚙至半日。喉卽開得下咽。於是每一包藥煎一碗。咽一半。浸吐一半。三日得快便。喉全消。身熱亦退。育陰而愈。

六脉沉弦而細。純陰之象。喉痛足痺宜溫。

王氏 三十八歲



乙酉五月
初二日

初八日

滿氏
三十五歲

川椒炭 三錢
防己 三錢
桂枝 三錢
肉桂 二錢

茯苓皮 五錢
姜黃 二錢
革薢 五錢
苡仁 五錢

四帖

喉痛止去肉桂痰不活加半夏 五錢

面色青黃呼吸定息脉再至而弦緊食減經不行腹中有塊二三枚長三四寸肝厥無五日不發喉痛十數年不休向來所服之方非寒涼卽婦科地芍藥等以致歷年沉困不休病勢日重十二年不孕矣與苦辛熱法急回眞陽或者可救

肉桂 錢半
良薑 二錢
川椒 二錢
廣皮 二錢

吳萸 錢半
半夏 三錢



前方服二帖。喉痛減其大半。厥未發。食少進。腹痛減。與前方加

人參

錢半。

茯苓

三錢。

前方服四帖。脉三至。喉痛止。食大進。腹痛亦減。仍服前方。去良薑並減剛藥分量。

前方服七帖。六脉將進至四至。服通補奇經丸一料。半年後受孕。



淮陰吳鞠通先生醫案

瘡

吳二十五歲

癸亥七月十六日

但寒不熱。似乎牝瘡。然渴甚。脉數。皮膚捫之亦熱。乃伏暑內發。新涼外加。熱未透出之故。仍用苦辛寒法。加以升提。

杏仁泥 三錢

天花粉 二錢

蔻仁

滑石

厚樸 二錢

青蒿 一錢

苡仁

藿香

鬱金 二錢

黃芩 一錢

知母

三杯分三次服三帖

但寒不熱之瘡。昨用升提。已出陽分。渴甚。脉洪數甚。熱反多。昨云熱邪深伏。未曾透出。不得作真牝瘡者。非虛語也。用苦辛寒



重劑。

杏仁粉 五錢

滑石 三錢

生石膏 八錢

知母 一錢

蔻仁 三錢

藿梗 三錢

厚樸 三錢

黃芩 一錢

鬱金 三錢

甘草 一錢

伊氏二十二歲

正月初七日

妊娠七月。每日午後先寒。後熱。熱至戌時。微汗而解。已近十日。此上年伏暑成瘧。由春初升發之氣而發。病在少陽。與小柴胡法。

柴胡 五錢

炒黃芩 三錢

炙甘草 二錢

半夏 四錢

人參 二錢

生薑 三錢

大棗 二個

一帖。寒熱減。二帖。減大半。第三日用前方三分之一。全愈。



朱三十三歲

八月二十五日

二十八日

修氏四十歲

體厚本有小腸寒溼。糞後便血。舌苔灰白而厚。中黑。嘔惡不食。但寒不熱。此脾溼瘧也。與切法。

生蒼朮 五錢

生草果 三錢

檳榔 三錢

生苡仁 五錢

杏仁 三錢

茯苓 五錢

熟附子 一錢

黃芩炭 二錢

前方服三帖而病勢漸減。舌苔化黃。減其製。又二帖而寒來甚微。一以理脾為主。

炒於朮 三錢

薏仁 二錢

益智仁 二錢

廣皮 三錢

半夏 三錢

黃芩炭 二錢

苡仁 五錢

服七帖而胃開。

少陰三瘧。二年不愈。寒多熱少。脉弦細。陽微損。及八脉通補奇。

蕭三十三歲

經丸四兩服完全愈

少陰三瘡久而不愈六脉弦緊形寒嗜臥發時口不知味不渴

腎氣上泛面目黧黑與扶陽湯法

鹿茸三錢

桂枝三錢

人參一錢

熟附子二錢

蜀漆二錢

當歸三錢

四帖愈後調脾胃

鄭五十五歲

四月十

九日

八月二

脉雙弦伏暑成瘡間二日一至舌苔白滑熱多寒少十月之久
不止邪入已深極難速出且與通宣三焦使邪有出路勿得驟
補

杏仁泥四錢

茯苓皮五錢

藿梗三錢

蔻仁二錢

炒知母三錢 半夏三錢 苡仁五錢 炒黃芩二錢

青蒿一錢

服四帖。

加青蒿一錢 服四帖。

脉緊汗多加桂枝三錢 服二帖。

脉已活動色已華寒大減熱亦少減共計已減其半汗至足底。

時已早至八刻議去青蒿加黃芩一錢 舌苔雖減而仍白餘藥

如故再服四帖。

三瘡與宣三焦右脉稍大熱多汗多舌苔之白滑雖薄而未盡

化溼中生熱不能驟補與兩清溼熱。

二十六日

初四日

初六日

十四日



杏仁泥 三錢

知母 二錢

通草 錢半

薤仁 二錢

黃芩 二錢

苡仁 四錢

黃連 一錢

茯苓皮 三錢

半夏 三錢

加廣皮炭 三錢

藿梗 三錢

服四帖。

病減者減其製。每日服前方半帖。六日服三帖。

病又減。去黃連。加益智仁 三錢。以其脉大而尙緊也。仍係六日

服三帖。

餘邪未盡。仍六日服三帖。

三瘡與宣化三焦。十退其九。白苔尙未盡退。今日診脉。弦中兼

緩氣來至緩。是陽氣未充。議於前方退苦寒。進辛溫。

十九日

二十二日

二十九日

六月初

五日

十二日

