

學醫實在易

四

亥21
46(3)-2
LL



醫學實在易卷之四

閩長樂陳念祖修園著

男元犀靈石參訂

孫男

心典徽基
心蘭芝亭

全校

熱症十條

傷寒頭痛。項強。發熱。惡寒。身疼痛。而喘。無汗。而煩躁。用大青龍湯。溫病發熱。不惡寒。而口渴。用麻杏甘石湯。四時感冒。時法用九味羌活湯。表



熱也。陽明經身熱自汗而渴。或服桂枝湯後大
渴飲水。用白虎人參湯。巾熱也不惡寒。但惡熱。
潮熱譫語便閉。用三承氣湯。裏實而熱也。發斑
譫語。時法用三黃解毒湯。犀角地黄湯。裏熱也。
頭痛惡寒發熱而譫語。小便短赤。大便閉者。用
防風通聖散。表裏俱實俱熱也。法詳傷寒門不
贅。

傷寒表熱詩

太陽煩躁

無汗者用

大青龍麻杏石甘

湯

溫病宗

九味

羌活湯

沖和

又名沖利湯

易老製能令表熱自

肌鬆

傷寒中熱裏熱詩

汗渴心煩白虎湯陽明經熱救中方三黃

散

犀角

地黃湯

熱歸裏結實未成此法貝

傷寒熱入於裏而實及表裏熱實詩

用潮便結語言狂熱結陽明承氣湯無汗不



北京中医药大学图书馆藏

便表裏實防風通聖有兼長。

口糜齦爛出血。心肺胃之火盛也。宜甘露飲主之。俗名雙單蛾。卽方書所謂喉痺也。雙蛾易治。單蛾難治。由心腎之火乘肺也。宜刺手太極指出血。又以導赤散加桔梗貝母射干治之。是爲反治法。二證若服涼藥不愈。宜用附子片以白蜜蒸熟含嚙其汁。又以通脈四逆湯加猪膽汁入尿與服。又以桂附八味湯加黃連少許水浸。

冷服是為從治法此症不可純用涼藥恐上熱未除中寒復起毒氣乘虛入腹上喘下泄手足厥冷爪甲青口如魚口者死

經義內經云一陰一陽結謂之喉痺一陰謂心主

一陽謂三焦二脈並結於喉氣熱內結故為喉痺

附引三條則曰千金附引三條則曰千金

咽者嚥也喉者候也咽接三脘以通胃故以



之嚥物。喉通五藏以系肺。故以之候氣。氣喉
穀咽。皎然明白。千金謂喉嚥主通利水穀之
道。咽門主通藏府津液神氣。誤也。
喉以納氣。故曰喉主天氣。咽以納食。故曰咽
主地氣。

喉風喉痺。皆由膈間素有痰涎。或因七情不
節而作。火動痰上。壅塞咽喉。所以內外腫痛。
水漿不入。言語不出。可謂危且急矣。

口糜齟爛詩

口糜齟爛火之炎。只盼慈雲甘露。飲露。喉痺。

生蛾導赤散四逆

通脈四逆湯加桔梗從治

以熱攻熱繼鍼砭

謂之從治

吐血咯血欬血鼻衄齒衄舌衄大便血血淋血

崩等證皆為血不循經之病。經者常也。血所常

行之路也。血生於中焦。半隨衝任而行於經絡。

半散於脈中而充肌腠皮毛。若外有所感。內有

醫學寶鑑王易



所傷。則血不循經道而行。從上而溢。則爲吐血。
衄血。咯血。鼻衄。齒衄。舌衄。等證。從下而洩。則爲
大便血。溺血。血淋。婦人血崩等證。不必有五臟
六腑之分也。且五藏有血。六府無血。觀剖諸獸
腹。心下夾脊包絡中多血。肝內多血。心脾肺腎
中各有血。六府無血。近時以吐血多者。謂吐胃
血妄甚。凡吐五藏血卽死。若吐衄崩下諸證。皆
是經絡散行之血也。謂因五藏六府之病而致

血則可謂血從五藏六府之中而出則不可也
余讀本草經內經金匱及千金等書別有斯悟
新刮青竹茹一捻隨宜佐以寒熱補瀉之品一
服卽效所以然者人身之脈絡不和則充膚熱
肉澹滲皮毛之血不循行其常道則土吐衄而
下崩中今得竹茹以和之是以竹之脈絡通人
之脈絡而爲治也若從風寒得者麻黃湯加味
可用若從酷暑得者竹葉石膏湯白虎湯六一

散可用。若從秋燥得者，瀉白散可用。諸經之火熾盛者，四生丸可用。六味地黃湯亦可偶服。皆治標之劑也。若固元湯之平補，理中湯之溫補，甘草乾薑湯之補其上，黃土湯之益其中，下與褚氏遺書所言血雖陰類，運之者其陽和二句，均得各大家不言之秘。余於此證各方，俱加鮮竹茹三四錢，爲效甚速。或另以大黃桃仁行血破滯之劑，折其銳氣。滑伯仁云：血既妄行，遺失

故道不去血行瘀則以妄爲常。曷以禦之。且去
者自去。生者自生。何虛之有。尤在涇曰。去者自
去。生者自生。人易知也。瘀者未去。則新者不守。
人未易知也。細心體驗。自見。此證不專屬於熱。
因內經有不遠熱則熱至。血淫血泄之病生句。
故列於熱證。

血證詩

血隨氣布

則字情細

要循經

失常

度奔騰若迅雲

寒冬則麻黃湯加減蓋以麻黃能散血行瘀

斯不致上溢下溢之患矣李東垣麻黃人參

芍藥湯暗合此意張隱菴用紫蘇梗時賢用

荆芥溫春桂去秋宜瀉白散夏膏靈竹葉石

亦同溫溫桂去秋宜瀉白散夏膏靈竹葉石

白虎湯皆以四生丸妙在鮮荷艾六味湯

石膏為主四生丸妙在鮮荷艾六味湯

歸澤青寒星到理中湯黃土湯外導行脈絡

竹皮青

下血久不止用斷紅丸詩

任用衝脈血海督脈司權專取奇經得秘傳

續斷三錢同側栢鹿茸一具斷紅丸側栢葉

斷酒炒各三錢鹿茸一具酥炙醋煮阿膠為丸每服四五十九烏梅湯人參湯任下茸有血衝任之血最盛從督而布護也此為下血久不止證深一層以用藥

血證窮極用當歸補血湯詩

血雖陰類運陽和內經及漢唐諸家秘旨運糖黃芪黃芪

質輕而行速用倍多少佐當歸陰得主陽為

取其善運

主得主有常笑他門外怪云何暮子歲余治某下血症議

則所行不妄

用此方門外漢以黃芪作脹阻之另服止血套藥愈後變症百出



喘促者。氣上衝而不得倚息也。與痰飲欬嗽。哮喘參看。有內外虛實四症。外證爲風寒。以小青龍湯加杏仁主之。內證爲水飲。以小半夏湯加茯苓八錢主之。實證非策閉不開。卽肺脹不約。氣閉因支飲壅滿。吁吸不能自如。以葶藶大棗瀉肺湯主之。肺脹其人喘目如脫。狀脈浮大者。以越脾加半夏湯主之。虛證非脾虛不能轉運。卽腎虛不能收納。脾虛以六君子湯加乾薑細辛。

五味子主之。腎虛宜真武湯。黑錫丹主之。亦有
氣短為微飲。宜從小便去之。出氣短者宜蒼桂
甘木湯。入氣短者宜腎氣丸。此症不盡屬於熱。
緣內經有誚逆上衝皆屬於火句。故屬於熱症。

喘促詩

端分內外實虛醫。內飲小夏湯外感小龍雨

路馳氣阻實痰葶。蘇下大棗瀉肺為實脹越

脾湯施虛而不運脾虛六君子助虛若離根

腎氣上奔真武湯

追導飲利便

小呼吸辨宜從

陽以化氣吸氣短

桂甘

苓桂甘

腎氣丸

古遺

規

此首限于字母四字化為六字俱要下提明提出故不能合法

哮喘證寒邪伏於肺膈痰窠結於肺膜內外相應

一遇風寒暑濕燥火六氣之傷即發傷酒傷食

亦發動怒動氣亦發役勞房勞亦發一發則肺

膈之寒氣與肺膜之濁痰狼狽相依窒塞關隘

不容呼吸而呼吸正氣轉觸其痰鼾齁有聲非