

聖濟總錄

吳錫璜著

巳4

86429

大德重校聖濟總錄卷第九十四

諸疝門

諸疝統論

論曰疝者痛也陰氣積於內復為寒氣所加使榮衛不調血氣虛弱故風冷入腹而成疝也或少腹痛而不得大小便或手足厥繞臍痛白汗出或冷氣逆上搶心令腹心痛或裏急腹痛又有五疝之疝其證非一故云諸疝當診其脉弦而急者是謂疝也皆由府藏虛弱飲食不節血氣不和寒溫不調之所生也

寒疝

論曰寒疝為病陰冷內積衛氣不行結於腹內故遇寒則發其狀惡寒不欲食手足逆冷繞臍痛白汗出

治寒疝四肢逆冷氣弱汗出蓬莪茂湯方

蓬莪茂

炮一兩

乾薑

半兩

附子

炮裂去皮

一兩

芍藥

去粗皮

桂

一兩

芎藭

三分

白朮

三分

檳榔

一兩

芍藥

一兩

桂

去粗皮

一兩

右八味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治寒疝攻注胸脇滿痛汗出木香湯方

木香分三

檳榔剉

細辛去苗葉

赤茯苓去黑皮 人參

芍藥

當歸剉

桂去粗皮

前胡去蘆頭

青橘皮湯浸去白焙以上各一兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治寒疝手足逆冷身體疼痛冷汗自出烏頭湯方

烏頭炮裂去皮臍二兩

桂去粗皮一兩

細辛去苗葉三分

右三味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服

治寒疝來去腰腹攻痛茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙炒三分

生薑切焙微炒

豉微炒

桂去粗皮各半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞酒少許同煎七分去滓溫服

治寒疝冷痛氣弱汗自出不欲食人參湯方

人參

白茯苓去黑皮各一兩

蜀椒去目并閉口者炒出汗

乾薑炮各半兩

附子炮裂去皮臍

檳榔

白朮

青橘皮湯浸去白焙各一兩

右八味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服

治寒疝亦治陰疝走馬湯方

巴豆二枚去膜炒

杏仁二枚去尖雙入炒

右二味取棉裹椎令極碎投熱湯二合絞取白汁服之未差更一服

治寒疝來去疼痛冷汗出牡丹丸方

牡丹皮 桂去麤皮各二兩 烏頭 炮裂去皮臍二枚

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空心日午臥時服

治寒疝胸脇支滿食飲不化臍腹疼痛桂心丸方

桂 去粗皮五分 白薇 一分 乾薑 炮一兩 芎藭 一兩 吳茱萸 湯洗培乾炒三兩

防葵 半兩 白芷 三分 烏頭 炮裂去皮臍半兩 蜀椒 去目并閉口者炒三分

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸溫酒下食前

治寒疝滿逆手足不溫徧身疼痛烏頭湯方

烏頭 實大者五枚去皮臍生切 白蜜 一斤 桂 去粗皮二兩

右三味先以慢火煎蜜及烏頭候蜜減半濾去烏頭別就一處以水三盞煎

桂候減半濾去桂將桂汁并前蜜汁共和別煎取二盞許每服半盞溫服未

知再服其知如醉狀得吐為中病也

治寒疝繞臍痛結鞭不消木香丸方

木香 附子 炮裂去皮臍 硃砂 飛研各一兩

右三味搗羅為末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸温酒下空心食前

治寒疝卒痛積聚不散上衝心腹與陰相引痛則汗出高良薑湯方

高良薑炒 檳榔剉 木香 當歸切焙各一兩半 吳茱萸炒一兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温服

心疝

論曰内經謂診得心脉而急病名心疝少腹當有形也心為牡藏小腸為之使故曰少腹當有形也夫藏病必傳於府今心不受邪病傳於府故小腸受之為疝而痛少腹當有形也世之醫者以疝為寒濕之疾不知心氣之厥亦能為疝心疝者當兼心氣以治之

治心疝心痛悶絕木香湯方

木香炮 陳橘皮湯浸去白各一兩 高良薑 乾薑炮

訶梨勒皮 赤芍藥 枳殼去穢 赤茯苓去黑皮各半兩

草薺薺皮去 芎藭 牽牛子炒各三分

右一十一味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至七分温服不拘時

治心疝心痛虛冷煩悶當歸湯方

當歸炮 乾薑炮 赤芍藥 黃耆 蜀椒去目并閉口炒出汗

半夏為末薑汁作餅暴乾 人參 青橘皮湯浸去白炒

附子炮裂去皮臍去 甘草炙對各一兩 厚朴去粗皮生薑汁炙二兩 桂去粗皮半兩

右一十二味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治心疝心痛如錐所刺牡丹丸方

牡丹皮 桂去粗皮 芍藥 烏頭炮裂去皮臍去 細辛去苗

甘草炙 木香 吳茱萸湯浸焙炒 檳榔各一兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下不拘時

治心疝心痛不可忍木香散方

木香 羌活去蘆頭 檳榔生剉 牡丹皮 當歸切

桂皮去粗皮 青橘皮湯浸去白切炒 蓬莪茂煨各一兩

右八味搗羅為散每服二錢匕沸湯或溫酒調下不拘時

治心疝心脇痛及繞臍痛芍藥丸方

芍藥 桔梗去蘆頭炒 細辛去苗 蜀椒去目并閉口炒出汗

桂皮去粗皮

乾薑炮裂各三分

附子炮裂去皮臍半兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或米飲下不拘時

治心疝心痛肢體虛冷蓬莪茂煮散方

蓬莪茂煨

檳榔剉生

附子炮裂去皮臍

甘草炙剉

桂去粗皮各一兩

胡椒兩半

芎藭

白朮各三分

右八味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至七分溫服不拘時

治痼冷在內陰氣交攻心痛如刺橘皮益智湯方

青橘皮湯浸去白焙

益智去皮

烏頭炮裂去皮臍

威靈仙去土各一兩

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片鹽少許煎至六分去滓食

前溫服日三

治陰冷交攻心疝疼痛紫桂丸方

桂去粗皮半兩

當歸焙三分

吳茱萸湯浸焙炒一兩

右三味為細末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服二十丸炒生薑鹽酒下米飲

亦得日三

治心疝冷痛不可忍三溫散方

附子

炮裂去皮臍

蓬莪菹

煨剉各一兩

胡椒

兩半

右三味為細散每服一錢匕熱酒調下不拘時婦人醋湯下

厥疝

論曰內經謂黃脉之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風夫疝藏疾言隱而難見陰沉而伏也今脾虛風寒客於腹膜之間不能與胃通行水穀之氣結而成積使氣道厥逆而痛故謂之厥疝

治厥疝腹中陰冷痛積氣上逆吳茱萸湯方

吳茱萸

湯洗焙乾炒二兩

烏頭

炮裂去皮臍去細辛各三分高良薑剉炒

當歸

切乾薑炮

桂

去粗皮各一兩

右七味剉如麻豆大每服五錢匕以水二盞煎取一盞去滓溫服日二

治厥疝上攻腹痛無時藿香丸方

藿香子

炒吳茱萸湯洗焙乾炒

桂

去粗皮

胡椒

棟實

剉碎炒延胡索各半

木香

蝨蟲

去翅足炒

海蛤

芫花

醋炒

礞砂

研

木通

各一分

右一十二味搗羅為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服十丸鹽酒下食

前服

治厥疝上搶心腹冷痛山茱萸丸方

山茱萸

吳茱萸 湯洗焙 乾炒

食茱萸

棟實 剉碎 乾炒

馬蔴花

藜香子 炒

青橘皮 湯去白焙 陳橘皮 湯去白焙 乾薑 炮

京三稜

炮各三分 附子 一枚重半兩者 炮裂去皮臍

右一十一味搗羅為細末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九丸酒或鹽

湯下空心服

治厥疝腹中冷痛當歸乾薑湯方

當歸 切

乾薑 炮

附子 炮裂去皮臍

人參

甘草 剉

細辛 去苗 葉

芍藥 各一兩

右七味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治厥疝逆上攻腹冷痛木香湯方

木香

檳榔 剉

烏頭 炮裂去皮臍

細辛 去苗 葉

當歸 切

吳茱萸

湯洗焙 乾炒

枳殼 去瓢 乾炒

甘草 炙各 一兩

右八味吹咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治厥疝冷逆攻心腹痛細辛丸方

細辛去苗葉

芍藥

人參

白朮

吳茱萸湯洗焙乾炒

桂皮去粗

乾薑炮

甘草炙

當歸切

附子炮裂去皮臍各一兩

右一十味搗羅為細末稀麩糊丸如梧桐子大空心米飲下三十九日三

寒疝心腹痛

論曰疝者痛也本由寒氣內積陽衰陰盛不得散釋寒邪因得攻擊或上搶心或腹內疝刺發即俱痛故名寒疝心腹痛也

治寒疝心腹痛胸脇支滿不下食汗出嘔逆人參湯方

人參

白茯苓去黑檳榔剉

木香

芍藥

芍藥

當歸切

桂皮去粗

青橘皮湯浸去白焙各一兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝心腹痛芤胡湯方

芤胡去苗四兩

大棗去核焙六枚

黃芩去心

人參

甘草炙

半夏湯洗去滑生薑汁製

桂皮去粗

芍藥各半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大切煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝心腹痛或逆搶心煩滿不得臥惡風驚惕不食變發寒熱吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙炒一兩

細辛去苗葉

芍藥

芫胡去苗

旋復花

黃芩去黑心

紫苑去苗

人參

白朮

白茯苓

去黑皮 乾薑炮

桂皮去粗

附子炮裂去皮臍

甘草炙

半夏

湯洗七遍去滑 當歸切焙各半兩

右一十六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸至三十九丸溫酒下

不拘時

治寒疝心腹痛不可忍汗出悶絕椒附湯方

蜀椒去目并閉口炒

附子炮裂去皮臍一枚

粳米半盞

乾薑炮半兩

半夏湯洗七遍去滑切十二枚

甘草炙兩

右六味攷咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分切棗二枚劈破煎

至一盞去滓溫服空心食前

治寒疝心腹痛附子丸方

附子炮裂去皮臍二兩

蒺藜子炒去角一升

桃仁去皮尖雙入別研膏三兩

右三味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下不拘時

治寒疝心腹痛汗出厥冷地黄湯方

生乾地黄焙三兩

甘草炙

白茯苓去黑皮人參

當歸切焙各二兩羊肉去脂切三斤

右六味前五味細剉將羊肉用水二斗煮取汁一斗去羊肉入諸藥煮取七

升入葱白一把切棗十四枚劈破再煮取六升絞去滓每溫服一盞不拘時

治寒疝心腹痛裏急當歸湯方

當歸切三兩生薑切五兩羊肉去脂膜切作片一斤

右三味以水一斗煮取五升去滓每溫服一盞不拘時日三夜二

寒疝積聚

論曰氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚蓋積者陰也陰沉而伏發則不離其

部聚者陽也陽浮而動上下無所留止其痛無定處令人洒淅惡寒飲食不為

肌膚或吐利脹滿或心下如覆杯腹中如人臂所橫皆寒疝積聚之證也

治寒疝邪氣往來堅固積聚不散多寒不得臥苦汗出大小便不利桔梗丸方

桔梗對炒半兩

葶藶子紙上一分

蒸蘆去蘆頭足半兩

杏仁去皮尖雙入炒五十枚

厚朴去粗皮生薑汁塗足對一兩一分

附子炮裂去皮臍一兩一分

桂皮去粗

人參

沙參各三分

特生礬石半一兩許

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸或七丸米飲或溫酒

下日三

治寒疝積聚大如鼈形小如杯狀乍來乍去腸胃脹滿寒則腸鳴心下寒氣上搶胸脇支滿芫花丸方

芫花炒醋

蜀椒去目并閉口炒出汗各一分

大黃對炒一兩半 細辛去苗葉一兩半

桔梗炒一分

烏頭炮裂去皮臍一兩

芍藥

吳茱萸湯洗焙乾炒

白茯苓去黑皮各三分

龍膽兩半

半夏湯洗七遍去滑一分

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十丸米飲或溫酒下日三

利下毒物為効

治寒疝積聚邪氣往來厥逆搶心痛羸瘦少氣胸脇滿不嗜食續命丸方

食茱萸二兩半炒 芍藥

細辛去苗葉

前胡去蘆頭各一分

乾薑炮

烏頭炮裂去皮臍各二兩半

紫苑去苗土

黃芩去黑心

白朮

白薇

芎藭

人參

生乾地黄

焙各一分

蜀椒

去目并開口炒出汗

桂 去粗皮各兩半

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服七丸米飲或溫酒下食

前服

治寒疝積聚來去攻擊疼痛不欲飲食木香湯方

木香

訶梨勒皮 炮 檳榔 剉

厚朴 去粗皮剉生薑汁炙

青橘皮 湯浸去白焙各半兩

白朮

人參

桂 去粗皮各一分

赤茯苓 去黑皮三分

右九味粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎七分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚胸腹堅急脹滿不食檳榔湯方

檳榔 性剉

桃人 去皮尖炒 郁李人 皮炒去

木香

京三稜 炮各一兩

桂 去粗皮 青橘皮 湯浸去白焙各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚心腹結痛飲食不下驚甲湯方

驚甲 醋炙去裙爛

京三稜 剉

大黃 剉炙各一兩

當歸 切

桂 去粗皮

赤芍藥

木香

枳殼去瓢 欬炒

訶梨勒皮 炮取

檳榔剉各

半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘

時

治寒疝凝結積聚不散攻注腹內疼痛不下飲食白朮湯方

白朮二兩

赤茯苓皮去黑

枳殼去瓢 欬炒

人參

桔梗剉

桂皮去粗

京三稜剉

檳榔剉各

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚結塊攻注心腹脹滿檳榔湯方

檳榔剉生

芎藭

桔梗剉

當歸剉

桂皮去粗

赤芍藥

白朮

木香各半

大黃剉碎 微炒

右九味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚心腹疼痛結塊不消桂心湯方

桂皮去粗

大黃炮

桔梗剉

附子皮 剉去

木香

白朮

當歸剉

檳榔

赤芍藥各一

高良薑剉

芎藭

枳實去瓢 欬炒

右一十二味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時
治寒疝積聚臍腹疼痛兩脇脹滿懷香子散方

懷香子炒 檳榔炮 京三稜炮 青橘皮湯浸去白 木香分

右五味搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服不計時候

七疝

論曰疝病有七厥逆心痛足寒飲食則吐者名厥疝腹中氣滿心下盡痛氣積如臂者名堅疝寒飲則脇下腹中盡痛者名寒疝腹中乍滿乍減而痛者名氣疝腹中痛在臍傍者名盤疝腹中痛在臍下有積聚者名附疝少腹與陰相引而痛大便難者名狼疝凡此七疝皆由寒氣內積血氣凝澁不得通利冷劇則痛故皆謂之疝難經曰任之為病其內苦結男子為七疝女子為瘕聚蓋明此也

治七疝諸寒在臍傍痛上又胸中滿少氣椒薑丸方

蜀椒去目及閉口炒 乾薑炮 厚朴去粗皮塗

黃芩去黑 細辛去苗 芍藥 桂去粗皮 桔梗炒半

烏喙炮裂去皮 芫胡苗 白茯苓去黑 牡丹皮各一

諸疝門

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九丸温酒或米飲下日

三服

治諸疝桃人湯方

桃人去皮尖吳茱萸湯洗焙

陳橘皮湯浸去

海藻洗去鹹白茯苓去黑皮羌活去蘆頭

蒺藜子炒去角各三兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大切煎至七分去滓温服不

拘時

治七疝或心腹厥逆不得氣息痛達背膂或心下堅痛手不可近或臍下堅痛

得寒冷食輒劇或脇下堅痛大如手或少腹脹滿引膀胱急痛或女子月事不

時椒附丸方

蜀椒炒出汗一兩

桔梗剉

芍藥

乾薑炮

厚朴去粗皮生薑汁炙

細辛去苗葉

附子炮裂去皮臍各半兩烏頭炮裂去皮臍一分

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸米飲或温酒下日三服

治七疝臍腹堅痛蓬莪茂丸方

蓬莪茂炮

木香

大黃剉

當歸炒

芎藭