

溫熱經緯

午
123



溫熱經緯卷第四

海甯王士雄孟英纂

定州楊照藜素園

烏程汪曰楨謝城評

仁和趙慶瀾笛樓參

陳平伯外感溫病篇

雄按此與下篇相傳爲陳薛所著究難考實姑從俗以標其姓字俟博雅正之

蓋聞外感不外六淫。而民病當分四氣。治傷寒家徒守。發表攻裏之成方。不計辛熱苦寒之貽害。遂使溫熱之旨蒙昧不明。醫門缺典。莫此甚焉。祖恭不敏。博覽羣書。廣搜載籍。而恍然於溫

熱病之不可不講也。內經云。冬不藏精。春必病溫。蓋謂冬時嚴寒。陽氣內斂。人能順天時而固密。則腎氣內充。命門爲三焦之別使。亦得固腠理而護皮毛。雖當春令升泄之時。而我身之真氣。則內外瀰淪。不隨升令之泄而告匱。縱有客邪。安能內侵。是內經所以明致病之原也。然但云冬不藏精。而不及他時者。以冬爲水旺之時。屬北方寒水之化。於時爲冬。於人爲腎。井水溫而堅冰至。陰外陽內。有習坎之義。故立言歸重於冬。非謂冬宜藏。而他時可不藏精也。雄按。喻氏云。春夏之病皆起於冬。而秋冬二時之病。皆起於夏。夏月藏精。則熱邪不能侵。與冬月之藏精。而寒邪不能入者。無異也。故丹溪謂夏月必獨宿淡味。保養金水二臟。尤爲攝身之儀。式焉。即春

必病溫之語。亦是就近指點。總見裏虛者表不固。一切時邪皆

易感受。學者可因此而悟及四時六氣之爲病矣。

雄按此論冬不藏精。春易

病溫之理甚通。惟不知有伏氣爲病之溫。是其蔽也。陳氏此例與鞠通條辨。皆葉氏之功臣。然幼科要略明言有伏氣之溫。熱二家竟未細繹。母乃疏乎。難經云。傷寒有五。有傷寒。

雄按麻黃湯證是也。

有中風。

雄按桂枝

有風溫。

雄按冬溫春

有熱病。

雄按卽暑病

溼溫。

雄按卽暑兼濕爲病也。亦曰溼熱。

夫統此風寒溼熱之邪。而皆名之曰傷寒。

寒者亦早鑑於寒藏受傷。外邪得入。故探其本而皆謂之傷寒

也。

雄按仲景本論治法。原有區別。畫甚嚴。後人不察。罔知所措。多致誤人。茲余輯此專論。以期了然於學者之心目也。

獨是西北風高土燥。風寒之爲病居多。

雄按亦不盡然。東南地界水溼。

溼熱之傷人獨甚。從來風寒傷形。傷形者定從表入。溼熱傷氣。傷氣者不盡從表入。故治傷寒之法不可用。以治溫熱也。夫溫者暖也。熱也。非寒之可比也。風邪外束則曰風溫。溼邪內侵則曰溼溫。縱有微寒之兼襲。不同栗列之嚴威。是以發表宜辛涼。不宜辛熱。清裏宜泄熱。不宜逐熱。雄按亦有宜逐者。總須辨證耳。蓋風不兼寒。即爲風火。溼雖化熱。終屬陰邪。雄按溼固陰邪。其兼感熱者。則又不可謂之陰矣。自昔仲景著書。不詳溫熱。遂使後人各呈家伎。漫無成章。而凡大江以南。病溫多而病寒少。雄按北省溫病。亦多於傷寒。投以發表。不遠熱攻裏。不遠寒諸法。以致死亡接踵也。悲夫。雄按篇中非伏氣之說。皆爲節去棄瑕錄瑜。後皆倣此。

風溫爲病。春。與。冬。季。居。多。或。惡。風。或。不。惡。風。必。身。熱。發。嗽。煩。渴。
此。風。溫。證。之。提。綱。也。

自注春月風邪用事。冬初氣暝多風。雄按冬暝不藏必定在冬初也。故風溫之病多見於此。但風邪屬陽。陽邪從陽。必傷衛氣。人身之中。肺主衛。又胃爲衛之本。是以風溫外薄。肺胃內應。風溫內襲。肺胃受病。其溫邪之內外有異形。而肺胃之專司無二致。故惡風爲或有之證。而熱渴欬嗽爲必有之證也。三復仲景書。言溫病者再一則曰太陽病發熱而渴。不惡寒者爲溫病。此不過以不惡寒而渴之證。辨傷寒與溫病之異。而非專爲風溫敘證也。雄按此言

雄按冬、曠不藏，必定在冬初也。

伏氣發爲春溫。非冬春所感之風溫。故曰太陽病。以太陽爲少陰之表也。再則曰發汗已身灼熱者。名曰風溫。夫灼熱因於發汗。其誤用辛熱發汗可知。仲景復申之曰。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出身重多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。凡此皆誤汗劫液後變現之證。非溫病固有之證也。續云。若被下者。直視失溲。若被火者。發黃色。劇則如驚癲狀。時瘧癰。若火熏之。逆尚引日。再逆促命期。亦止詳用下用火之變證。而未言風溫之本來現證也。雄按此言溫病誤汗。熱極生風。感之風溫。陳氏不知有伏氣春溫之病。故曰風溫。乃內風也。非冬春外然病之內外雖殊。證之屬溫則一。姑存之以爲後學比例。然從此細參。則知風溫爲燥熱之邪。燥令從金化。燥熱歸陽明。故

肺胃爲溫邪必犯之地。且可悟風溫爲燥熱之病。燥則傷陰。則傷津泄熱和陰。又爲風溫病一定之治法也。反此卽爲過之。用是不辭僭越。而於仲景之無文處求文。無治處索治。敘證施治。列爲條例。知我罪我。其在斯乎。雄按外感溫病仲聖雖未言而葉氏已詳論矣

風溫證身熱畏風。頭痛咳嗽。口渴脈浮數。舌苔白者。邪在表也。當用薄荷前胡杏仁桔梗桑葉川貝之屬。涼解表邪。楊云前胡桔梗一降一升以泄

肺邪誠善然桔梗宜少用。

自注風屬陽邪。不挾寒者爲風溫。陽邪必傷陽絡。是以頭痛畏風。邪鬱肌表。肺胃內應。故咳嗽口渴苔白。邪留於表。故脈浮數。

表未解者當先解表。但不同於傷寒之用麻桂耳。

雄按何西池云。辨痰之法。古人以黃稠者爲熱。稀白者爲寒。此特言其大概而不可泥也。以外感言之。傷風欬嗽。痰隨嗽出。頻嗽而多。色皆稀白。誤作寒治。多致困頓。蓋火盛壅逼。頻欬頻出。停留不久。故未至於黃稠耳。迨火衰氣平。欬嗽漸息。痰之出者。半日一口。反黃而稠。緣火不上壅。痰得久留。受其煎煉。使然耳。故黃稠之痰。火氣尚緩而微。稀白之痰。火氣反急而盛也。此皆當用辛涼解散。而不宜於溫熱者。推之內傷亦然。孰謂稀白之痰。必屬於寒哉。總須臨證細審。更參以脈。自可見也。

風溫證身熱欬嗽。自汗口渴煩悶脈數舌苔微黃者。熱在肺胃也。
當用川貝牛蒡桑皮連翹橘皮竹葉之屬涼泄裏熱。

此溫邪之內襲者。肺熱則欬嗽汗泄。胃熱則口渴煩悶。舌苔轉黃。風從火化。故以清泄肺胃爲主。

雄按苔黃不甚燥者。楊云故條中言微黃亦具見斟酌。治當如是。若黃而已乾。則桑皮橘皮皆嫌其燥。須易括更黃芩庶不轉傷其液也。

風溫證身灼熱。口大渴欬嗽煩悶。識語如夢語。脈絃數乾嘔者。此熱灼肺胃。風火內旋。當用羚羊川貝連翹麥冬石斛青蒿知母花粉之屬。以泄熱和陰。

此溫邪襲入肺胃之絡，灼爍陰津，引動木火，故有煩渴嘔逆等證。急宜泄去絡中之熱，庶無風火相煽，走竄胞絡之虞。

雄按噉且悶麥冬未可卽授嫌其滋也以爲大渴耶已有知母

花粉足勝其任矣。木火上衝而乾嘔則青蒿雖清少陽而嫌乎？

升矣宜去此一味加以梔子竹茹枇杷葉則妙矣楊云議藥細極微芒讀者

不可草讀過。

楊云議藥細
極微芒讀者

風溫證。身熱欬嗽。口渴下利苔黃。讞語。曾痞脹數。此溫邪由肺胃下注大腸。當用黃芩桔梗煨葛豆卷。甘草橘皮之屬。以升泄溫邪。大腸與胃相連屬。與肺相表裏。溫邪內逼。下注大腸。則下利治。

之者宜清泄溫邪不必專於治利按傷寒論下利讞語者有燥
矢也宜大承氣湯是實熱內結偏液下趨必有舌燥苔黃刺
及腹滿痛證兼見故可下以逐熱若溫邪下利是風熱內迫雖
有讞語一證仍是無形之熱蘊蓄於中而非實滿之邪盤結於
內故用葛根之升提不任硝黃之下逐也

雄按傷寒爲陰邪未嘗傳腑化熱最慮邪氣下陷治必升提溫
散而有早下之戒溫熱爲陽邪火必克金故先犯肺火性炎上
難得下行若肺氣肅降有權移其邪由府出正是病之去路升
提胡可妄投楊云小兒患疹必下利與此正同故溫病多有發疹者誤升則邪入肺絡多喘吼而死既云

宜清泄其邪。不必專於治利矣。況有欬嗽脅痛之兼證。豈葛根豆卷桔梗之所宜乎。當易以黃連。桑葉。銀花。須知利不因寒潤藥亦多可用。仲聖以豬膚白蜜治溫病下利。寓意草論肺熱下利最詳。學者宜究心焉。且傷寒與溫熱邪雖不同。皆屬無形之氣。傷寒之有燥矢。並非是氣結成。乃寒邪化熱。津液耗傷。糟粕煉成燥矢耳。溫熱病之大便不閉。爲易治者。以臟熱移腑。邪有下行之路。所謂腑氣通則臟氣安也。設大便閉者。熱爍胃津。日久亦何嘗無燥矢。宜下之證哉。惟傷寒之大便不宜早解。故必邪入於腑。始可下其燥矢。溫熱由肺及胃。雖不比疫證之下不

嫌早而喜其便通。宜用清涼。故結成燥矢者較少耳。憶嘉慶

卯春先君子病溫而大便自利。彼時吾杭諸名醫咸宗陶節庵

書以治傷寒。不知所謂溫證也。見其下利。悉用柴葛升提。而不應。或云是漏底證。漸投溫補。病日以劇。將治木矣。父執翁七

丈忘其字矣似是立賢二字薦浦上林先生來視。浦年甚少。診畢。卽曰是溫

證也。殆誤作傷寒治。而多服溫燥之藥乎。幸而自利不止。熱勢

尚有宣泄。否則早成灰燼矣。待今日耶。卽用大劑犀角石膏銀

花花粉鮮生地麥冬等藥屬煎三天。碗置於榻前。頻頻灌之。藥

未煎成之際。先筭蔗漿恣飲之。諸戚長見方。相顧莫決。賴金履

思丈力持煎其藥。至一周時服竣。病有起色。遂以漸愈。時雄年
甫十二。聆其言而心識之。踰二年。先君捐館。雄餉口遠遊。聞浦
先生以善用清涼爲眾口所爍。乃從事於景岳。而以溫補稱。杜
道徇人惜哉。雄然之究心於溫熱。實浦先生有以啟之也。浦今
尚在。因其遠徙於鄉。竟未遑往質疑。義爲恨。附記於此。聊志感
仰之意云爾。

風溫證。熱久不愈。欬嗽脣腫。口渴胃悶。不知飢。身發白疹如寒粟。
狀自汗脈數者。此風邪挾太陰脾溼。發爲風疹。楊云白疹乃肺胃
溼熱也。與脾無涉。亦與風無涉。用牛蒡荆芥防風連翹橘皮甘草之屬涼解之。

風溫本留肺胃。若太陰舊有伏溼者。風熱之邪與溼熱相合。而連不解。日數雖多。仍留氣分。由肌肉而外達皮毛。發爲白疹。蓋風邪與陽明營熱相併。則發斑。與太陰溼邪相合。則發疹也。又有病久中虛。氣分大虧。而發白疹者。必脈微弱。而氣倦怯。多成死候。不可不知。

雄按白疹卽白癆也。雖挾溼邪久不愈。而從熱化。且汗渴脈數似非荆防之可再表。楊云。此溼亦不必用橘皮之燥。宜易滑石。荳根。通草。楊云。精當。斯合涼解之法矣。若有虛象。當與甘藥。以滋氣液。

風溫證。身熱欬嗽。口渴。脣瘡。頭目脹大。面發泡瘡者。風毒上壅。陽

絡當用荆芥。薄荷。連翹。元參。牛蒡。馬勃。青黛。銀花之屬。以清熱散邪。

此卽世俗所謂大頭病也。古人用三黃湯。西主治。然風熱壅還致絡氣不通。頭腫如斗。終不若倣普濟消毒飲之宣絡滌熱爲佳。

風溫證。身大熱。口大渴。目赤脣腫。氣粗煩躁。舌絳齒板痰欬。甚至神昏識語。下利黃水者。風溫熱毒深大陽明。營分最爲危候。用犀角連翹葛根元參赤芍丹皮麥冬紫草川貝人中黃解毒提班間有生者。楊云葛根麥冬俱與證不甚登對。

有生者。

楊云葛根麥冬俱與證不甚登對。