

補藥論

夫能令胃消化及能令腦與肌肉生力者，卽謂之補劑。顧補劑不一，亦宜分晰。其助胃消化而令生血者，如服黃連、瓜沙及龍膽草等藥是也。其入血養腦而能助腦發力者，如服金匱、納霜及桂枝、先高、等劑是也。其人血而能助血變赤及助肌肉生力者，如服鐵劑等類是也。然而補藥之宜服，正不僅有此妙用也。舉凡士農工商，勤勞過度，而致胃則弱，身則虛，皆宜服也。卽推之婦人，月經過多，白帶過多，及瘡疥流膿過多，而致面則白，唇則青，亦宜服也。惟補藥則由漸獲效，非若吐瀉等劑，隨服隨應耳。且補身之道，雖藉藥力，然或擇醫不精，信醫不專，亦終

無濟此所以得良醫而能篤信亦卽補身之一道也至醫士務宜品學兼優技則熟而心則細彼病者方能以身命相託誠以醫道所關甚重不容不慎也他如身熱及內腑有炎此則雖應服補劑亦不宜驟服蓋必先清後補庶得妥適且補劑雖能補胃益身然使過服久服則或令胃難消化而身體亦將因而轉弱此又不可不知也

鐵劑總論

用金類作補藥，當以此劑爲上品，蓋世上有多種

動植之物，內函有鐵，卽人血亦然。此醫者所爲設鐵劑也。功

用補而斂，能開胃，助消化，服之可令血多而紅。凡血弱血少

者宜服。或瀉大便過多，或癰疽潰膿過多，宜服。婦人胃不

消化，面自唇青，係因瘰癧白帶而致者，宜服。小兒骨軟，係由

鼻內牙內流血過多所致者，宜服。服此藥忌空腹，飯後服之

可也。大抵乍服鐵劑，不甚見驗，惟連服數旬，或數月，方獲功

效。鐵劑服後，翌日糞色必黑，若服至十餘日，而覺大便艱澀，

卽宜暫停，惟俟糞色如常，方可再服。且服鐵劑而致大便乾

結，宜兼服輕瀉藥，誠以瀉藥亦能助鐵入血，而有以補之也。

鐵散

製法

以鐵銹入筒火煨至紅而即以輕氣過之令其

食出養氣自可成爲純鐵但此物亦無甚功用究不如服鐵劑

妙

鐵養溼散

此散木
雨有水

製法

鐵養礦養水

四安
土量

鎔炭養水

三十三
安土量

清水

二十安
土量

先將鐵養礦養水與清水相和然後以鎔炭養水加入少

頃則用布濾去該水而所賸之溼散復以清水漂洗漂至

濾出之水以鉏絲投入而不能結鹽爲度此散須帶溼

入罐不必弄乾誠以散之乾者每百分亦必函水十八分

也



功用

能作補劑

服法

每服一分至二分

但醫家亦鮮用

雜治通用

誤服信石用此救之甚驗緣該散一經入腹即能與信

石相合而結為水不能溶之鹽也但此藥新製者方能解

信石之毒若稍舊便不堪用

鐵養散

即鐵紅散

製法

用鐵礬養

俗名青礬

及鎊炭養水化和勻將

見墜底者即此散也

形色

新製者色青黑少頃即吸養氣

變為紅色

氣味

味澀無臭

溶化

水不能化

服法

作補藥每服八釐至四分每日三服凡身弱血虛者服之宜

方劑

一方

婦人閉經孱弱而致面青唇白者宜服

鐵紅散

一分二釐

衣畢格

二釐

汞石散

三釐

和勻作一服，每日二服，或間服鴉囉瀉藥少許亦妙。但此症須連服二十餘日，亦見效驗。

方論

或面上半邊腦筋痛，係由身虛血弱而致者，每服一錢，每六點鐘一服，但須以漸加多，服至獲效爲度。其小兒七八歲者，每服五分，每日四五服。血少心跳，每服一二錢，每日二三服。或婦人陰戶潛流惡水，或小孩麻痘後而耳出膿，每次服五分，每日三服，均妙。

鐵炭養糖散

製法

鐵礬養

一兩六錢

輕煖炭養

一兩

各以沸水四觔溶化，然後將兩水和勻，急急攪之，隨即蓋密俟

過十二時將水倒去而所賸之粉再用沸水八觔攪勻俟其凝

定又復倒去該水而後將粉入袋用法壓去餘水壓畢取出加

入白糖八錢和勻研幼慢火焙乾用樽貯密又法用鐵炭

養糖散八錢玫瑰花膏二錢和勻作丸功同鐵劑

主治 身虛血弱 **服法** 每服一分至五分每日二三服

淨礬石粉 **製法**

雙鐵礬養水五安半量 鐵礬養水兩安士量 鎢炭養水六十四安士量

清水足用 先用清水三十二安士量次將鐵礬養水兩安士量放入清

水內俟溶化再加雙鐵礬養水後將鎢炭養水和勻煲滾

約兩點鐘時攪之隔以綿花布再過水至加入銀綠此

水不見起烟為度用火焙乾火之熱一百二十度即此藥也

形色

此散棕黑色用磁石試之可吸起此磁石內係鐵質極淨與在山所生者不同

功用

同鐵養散 **服法** 每服八釐半至一分七釐

青礬

即鐵礬養

製法

以淡礬強水化鐵碎俟化盡煎去水自可

凝珠然此猶未淨也惟將該珠再用水化濾隔加入礬強水少許同煎俟其再復結珠庶得純淨

形色

綠豔

味澀

溶化

水能溶若經煨則本體之水可

化已質

功用

補斂為鐵劑之上品凡血弱身虛者宜服

服法

每服此珠二釐至八釐若用枯者一釐至三釐

清水化服或嚼別藥作丸均可

宜忌

但此藥不宜過服，多服否則未免腹痛作嘔，或至壞身。

血少面白者，宜含龍膽草膏及鴉囉硫磺等藥作丸服之。

甚驗。或以青礬水化並加些礬強水同服，均妙。

方劑

一方 身弱血少心跳，婦人月經不行等症。

青礬 一分二釐

鴉囉 一分二釐

玉桂末 三分二釐

以水和勻作丸

八粒，每日飯後服二粒。

一方 瘧疾之後，脾或發脹服之效。

青礬 五分

渣笠散 錢一

大黃散 錢一

鉅齒酸散 錢一

加林啤散 一錢如無此藥不用亦可

共研勻作散，分十包，每日早晚

服一包，至瀉為度。若猶未瀉，則每日須多服，一二次。

鐵燐養

製法

鐵磺養

四兩

鐵燐養

四兩

汽水

一百二十
八安士量

即將汽水分作兩盤，一化鐵磺養，一化鐵燐養，化訖則以二水相和貯俟結鹽，此則鐵燐養也。由是以熱水漂洗，微火焙乾。

功用

同鐵劑

服法

療治各症，悉照鐵劑服之。

鐵火燐養

製法

鐵燐養

七安

鐵磺養

七安士
或足用

檸檬酸

兩安士

輕淡

水

五安半量
或足用

清水

足用

先將鐵燐養全放入磁鍋內，燂鎔復煎至乾，即將此乾散另置鐵鍋內煎至僅見紅色，取起加入清水四十八安，再慢火煎至

鎔化隔淨俟其冷至五十度

係法國度表

乃以鐵礬養水漸漸加入

加至全結成鹽爲度攪勻用布隔時布面有鹽珠再加清水以過出之水味淡極爲止用磁鍋一個先稱過重若干將布面取出之鹽珠放入磁鍋內另用器將檸檬酸與輕淡水全併和勻化清卽傾入磁鍋內與鹽珠和勻慢火煎至臍十六安士爲度攤勻在厚玻片面冷定成爲薄片卽此藥也入玻桎樽貯密收在暗處以不見光爲妙

形色

薄片色綠

氣味

無臭味微鹹頗澀

溶化

水能

化

功用

此藥鐵質多故鐵類補藥之內此爲上品

服法

鐵鈹葡鹽

製法

鐵礬養水

十六安土量

鈹葡酸散

七安土

清水

六十四安土量

先將鐵礬養水照上文第

十

篇內製成鐵養濕散另將鈹

葡酸散和清水六十四安士燂熱至一百四十度勿令熱度減

少將鐵養溼散逐漸加入至不能化為止將此水隔淨另以一

鍋盛熱水以此藥水鍋置其中隔水炖之限以熱不可過一百

四十度為式直煎至如糖水之稠即攤勻於厚玻片上或磁片

上乾成薄片即是藥也收取入樽

形色

色紅燂熱則變黑

氣味

味甜略澀經火燂發出氣

息如沙糖

溶化

水能溶化

功用 凡水能化之鐵劑，此屬佳品。因其氣味純而易入口也。

又與別等鐵類之藥，能令大便結者不同。服之胃亦無礙。

服法 每服八釐半，至三分四釐，每日三服，宜空腹為佳。

鐵梅鹽

製法

檸檬酸 五安半

鐵礬養 十二安士

清水 五安士

先以清水化檸檬酸，再以鐵礬養照上法做成鐵養溼散，復將檸檬酸水燂熱，限以不可過一百四十度為式。到此熱度時，則可漸次加入鐵養溼散，加至不能化乃止。將水隔淨，用隔水鍋炖至如糖水之稠，即攤勻於玻片上，或磁片上，乾成薄片，即此藥也。

鐵士的尼檸檬鹽

形色

結片色黃能過光

氣味

甘澇

溶化

水易化化

得之水作櫻色

功用

平和清補最宜於小兒及虛怯

之人

服法

每服八釐半至三分四釐每日三服

鐵桂拏檸片

形色

薄片棕色

氣味

苦澀

溶化

伊打火酒不能化

冷水亦久而始化惟沸水方易化

功用

功同鐵劑及同金雞納霜能補血補腦

服法

每服三釐至一分

主治

婦嬰身弱血虛面白或胃

口不能遽受鐵劑等類者宜服之

鐵士的尼檸檬鹽

製法



鐵輕淡梔鹽

八錢五分

士的尼

八釐半

檸檬酸

八釐半

清水

一安士零一錢量

先以清水一安化鐵輕淡梔鹽又以清水一錢加入士的尼檸檬酸和勻俟化盡併歸一器勻和照上文隔水炖法限以熱不可過一百四十度爲式煎至稠如糖水攤勻於厚玻片上或磁片上俟乾成薄片卽是藥也收貯入樽

形色

紅

氣味

苦

功用

助胃補腦筋卽鐵與士的尼之功力

服法

每服一釐七或三釐四此藥有毒切宜愼用

鐵綠水

製法

輕綠酸

八安士量

汽水

八安士量

和勻次將鐵線一兩同入瓦

鍋慢火煎之俟鐵線化盡取出瀝淨復加入輕綠酸

四安士量

淡養酸

九地廉量

然後加火煬之煬至發出紅煙而該水變作

橙黃之色由是再將水煎去至賸有十安士為度

形色

橙黃

氣味

澀

功用

補斂內服外用均能止血

服法

內服者每次宜用五滴加水沖服

外用

或以之射入肉瘤令其血凝而結自可化成實物抑或

以療腿下迴管生大之症亦可但此法每易壞人未可妄

用肉瘤破口血箭血痔及子宮瘤破噴血等症即以此

藥水射入立能止血顧射人之藥水亦不宜過濃大約

每用鐵綠水五錢當以清水八兩調勻方合至醫者多

用此製鐵綠酒誠以該酒功用而尤勝於此也

鐵綠酒

用鐵綠水一火酒三和勻卽此酒也

形色

紅黃

氣味

臭同鹽強伊打味酸澀

功用

補斂

服法

每服十滴至三十滴加水沖服

主治

凡內腎膀胱患症係由虛弱而致者宜服小兒夜間

遺尿及婦人月經過多者宜服

方劑

一方婦人行經作痛及患白帶者服之甚驗

鐵綠酒

八滴

鴉片酒

十滴

汽水

一兩或二兩

和勻作一服每四點鐘服一次

