

補養
後表

醫方集解
唐

明

汪訥菴先生著輯

醫

指

掌

醫方集解

宏道堂梓行

敘文

孔子曰能近取譬可謂仁之方也已夫仁爲心性之學尙不可以無方況於百家衆藝可以無方而能善此乎諸藝之中醫爲尤重以其爲生人之司命而聖人之所必慎者也竊嘗思之凡病必有症症者證也有斯病必形斯候者也證必有脉脉者藏府經絡寒熱虛實所由分也有與證相符者有與證不相符者必參驗確而後可施治者也察脉辨證而方立焉方者一定不可易矣名有是病者必主是藥非可移游

彼此用之爲嘗試者也。方之祖始于仲景。後人觸類
擴而充之。不可計殫。然皆不能越仲景之範圍。蓋前
人作法。後人因焉。創始者難爲力。後起者易爲功。取
古人已驗之成規。可斟酌用之。爲効不旣易乎。然而
執方醫病。而病不能瘳甚。或反以殺人者。又何以說
焉。則以脉候未辨。藥性未明。惑于似而反失其真。知
有方而不知方中解故也。方中有解。始于陳無擇。無
擇慨仲景之書。後人罕識。爰取傷寒論而訓詁之。詮
症釋方。使觀者有所循入。誠哉仲景之功臣。而後覺

之先導矣。厥後名賢輩出。謂當踵事增華。析微闡奧。使古方時方。大明于世。寧不愉快。夫何著方者日益多。註方者不再見。豈金針不度歟。抑工于醫者未必工于文。詞不能達意。遂置而不講歟。迨明始有吳鶴皋集醫方考。文義清疎。同人膾炙。是以梨棗再易。豈爲空谷足音。故見之而易喜歟。然吳氏但一家之言。其于致遠鉤深。或未徹盡。茲特博採廣搜。網羅羣書。精窮奧蘊。或同或異。各存所見。以備參稽。使探寶者不止一藏。嘗鼎者不僅一嚮。庶幾病者觀之。得以印

證用者據之不致徑庭。寧非衛生之一助歟。或曰善師者不陣。得魚者忘筌。運用之妙。在于一心。何以方爲。余曰。般倅不棄規矩。師曠不廢六律。夫易之爲書。變動不居。然亦有變易不易二義。故曰。蓍之德圓而神。卦之德方以智。夫卦誠方矣。豈方智之中。遂無圓神之妙也哉。吾願讀吾書者。取是方而圓用之。斯真爲得方之解也已。

康熙壬戌歲陽月休寧詡菴注昂題于延禱堂

凡例

一古今方書星爲繁夥然于方前第註治某病某病而未嘗發明受病之因及病在某經某絡也一方之中第註用某藥某藥亦未嘗發明藥之氣味功能久某經某絡所以能治某病之故也方書徒設醫醫淺術視之憤如乃拘執死方以治活病其不至于悞世殃人者幾希矣及未陳無擇始將仲景之書先釋病情次明藥性使觀者知其緒端漸得解會其嘉惠後人之心可謂切至而世猶以循文訓釋譏之不知仲景之書文淺義深至爲難讀其良法奧旨維非陳氏所能徹盡然不讀陳氏之訓解又安能入仲景之門庭乎自陳氏而後歷年數百竟未有繼踵而釋方書者卽如金匱玉函猶然晦昧文況于金外臺以及後賢之製劑也哉及明興始有吳鶴星之醫方考分病列方詞旨明爽海內盛行茲

倣陳氏吳氏遺意而擴充之採輯古方先詳受病之由次解用藥之意而又博採碩論各言分別宜用忌用惟求義朗不厭詞繁頗竭苦心不知有當世好否也

一醫方考因病分門病分七十門方凡七百首然每症不過數方嫌于方少一方而二三見又覺解多如五積散逍遙散皆未入選不無闕略茲集門分二十有一正方三百有首附方之數過之雖未足以盡醫療之目苟能觸類引伸而醫療之大法用之亦已不窮矣

一本集所載皆中正和平諸書所共取人世所常用之方卽間有一二厲劑亦攻堅瀉熱所必需者猶然布帛菽粟之味也至于藥味幽僻採治艱難及治奇證怪病者槩不選錄又方雖出自古人而非今人所常用者亦不選錄

古人立方分兩多而藥味寡。譬如朝兵專走一路則足以破敵擒王矣。後世無前人之朗識。分兩減而藥味漸多。譬猶廣設攻圍以庶幾于一遇也。然品類太繁。攻治必雜。能無宜于此而不宜于彼者乎。茲集藥過二十味以上者。槩不選錄。

一仲景傷寒論。前人印定眼目。自陳無擇而外。鮮所發明。陶節菴雖著傷寒六書。察合後賢之治。盡更仲景之方名。究未嘗有片言隻字發揮仲景一症一方者。又變前法不復分經論治。仲景之書與渺難窮節菴之書顯淺易讀。世人奉爲著蔡。故識見愈卑猥也。近世如方中行喻嘉言程郊倩輩。各著傷寒論辨。雖有徧駁。未能盡合經意。然間有二新義。爲從前所未發者。故多錄之。不敢重舌而非今也。

一仲景傷寒諸方。爲古今方書之祖。故註釋尤加詳悉。觀者幸勿以其繁

而厭之

正方之後系以附方一則屬章省約一則便于披尋且以示前人用藥加減之法也

一時丁哀晚洞垣窺藏之技世不再覩而村閭市井稍能誦藥性讀回春者輒爾懸壺草菅人命恬不爲怪古云學醫人費豈不信然余竊憫之故著本草備要一書字箋句釋便知藥品有性情施用有宜忌復著是集辨症論方便知受病有源因治療有軌則庶幾平居讀之可使心理開明臨病考之不致攻補誤用脫遇庸劣之手既可據症以校方設處窮僻之鄉不難檢方以用藥豈非衛生之善道簡篋之要編也乎高明之家以爲然否

醫書浩瀚泛覽爲難岐

黃之家尚艱博涉文墨之士奚暇旁通君非篇

章簡要詞理通明則智士不樂披尋淺人復難解于讀方不得其解治
療安所取裁是用裏合諸家會集衆說由博返約用便搜求實從前未
有之書亦醫林不可不有之書也第昂藏書既寡見聞不多集中採用
不滿數十家又恐註釋太繁觀者易倦其中篇章漫衍不能盡錄者不
得不稍爲刪節非敢輕肆以限于尺幅也然出自某人某書必仍有其
名于古今相沿之語相襲之方不知始自何人而不可廢者皆採
錄文法未暢者亦僭爲刪潤間有竊附鄙見者必加昂按二字至
全解有全用昔人者有出自心裁者然作述相半未敢師心自
用也

一古人治癥識見高明而用意深遠其處方用藥多有非後人所易測識
者有上病下取下病上取者有陰病治陽陽病治陰者又有隔二隔三之治者况余不業岐黃又學無師授

寡見聞尤稱固陋。安能盡洞古人立方之本意哉。今始就方書所載及愚心所通曉者採輯成書。至于古方不得其解者尚多。不敢妄加逆億以取罪先賢貽悞後世也。

一綱目準繩二書。多有採用前人而不著其名氏者。不能推原所自。則以綱目曰準繩曰三字槩之。

一集中所分門類。蓋以治病之道。當治于未病。故先補養。及既受病。則有汗吐下三法。故次發表。涌吐攻裏。若表症未除。裏症復急者。當表裏交治。故次發表攻裏。又有病在半表半裏。及在表而不宜汗。在裏而不宜下者。法當和解。故次和解。然人之一身。以氣血爲主。故次理氣理血。若受病之因。多本于六淫。故次風寒暑濕燥火。古云百病皆由痰起。故次除痰。若飲食不節。能致積滯。故次消導。又滑則氣脫。故次收瀉。虫能作

病故次殺車。至于眼目癰瘍婦人各有品科然茲集所以便用故每利
畧取數方以備採擇未附救急良方以應倉卒再附勿藥立詮于卷終
使知謹疾攝生之要無非欲躋斯世于仁壽而已

一本集雖名方解然而病源脉候藏府經絡藥性治法罔不畢備誠醫學
之全書岐黃之捷徑也讀者倘能細心玩索自有深造逢源之妙若厭
其繁多而倦于披閱則作者之苦心無以表見于世矣

服藥節度有食前食後之分古今相傳罔敢或異愚意竊謂不然凡人
飲食入腹皆受納于胃中胃氣散精于脾脾復傳精于肺肺主治節然
後分布于五藏六府是胃乃人身分金之鑪也未有藥不入胃而能即
至于六經者也况肺爲華蓋葉皆下垂以受飲食之薰蒸藥入胃腕疾
搥而下安能停止若有停留則爲噎爲噎矣未聞心藥飲至心間而即

可入心。肺藥飲至肺間而即能入肺者也。若上膈之藥，食後服之，胃中先爲別食所填塞，須待前食化完，方能及後藥。是欲速而反緩矣。且經脈在肉理之中，藥之糟粕如何能到其到者，不過氣味耳。若云上膈之藥須令在上，下膈之藥須令在下，則治頭之藥必須入頭，治足之藥必須入足乎？此理之顯明易見者。但此法相傳已久，集中一仍其舊，不敢擅改，然不能無疑。附記于此，以質明者。

一集中方各用一病症用之精義要義用

十二經絡：手太陰肺、手少陰心、手厥陰

心包、手太陽小腸、手少陽三焦

手陽明大腸、足太陰脾、足少陰腎、足厥

陰肝、足太陽膀胱、足少陽胆、足

陽明胃。附此以備查考。

醫方集解目錄

上卷

補養之劑

正方四十三
附方五十三

內複方六
內複方三

六味地黃丸

六味地黃湯
都氣丸
八仙

桂附八味丸
長壽丸

知柏八味丸
七味地黃丸
六味去澤

瀉加益智仁丸
陰腎氣丸
腎氣丸

還少丹

打老見丸
滋陰大補丸

黑地黃丸

虎潛丸

補益丸
虎濟陰丸
龍

天眞丸

三才封髓丹

三才湯
鳳髓丹

大造丸

補天丸

人參固本丸


參乳丸

頓乳取
粉法

天王補心丹

孔聖枕中丹

大補丸



滋腎丸

療腎滋本丸
大補丸

黃栢
滋腎
潛行丸

斑龍丸

又斑
龍丸

驅鹿三仙丹

補火丸

金液丸
半硫丸

玉真丸
靈砂丹

來復丹
二氣丹

返陰丹
破陰丹
傷
寒百問方
黑錫丹

唐鄭相國方

青娥丸
喝起丸

三至丸

扶桑丸

麥冬白朮散

妙香散

五屏風散

四君子湯

異功散
六君子湯
十味人參
砂六君子湯

散
四獸飲
又六君子湯
三白湯
四順湯
六神散

四君子加行瀝姜汁湯
七味白朮散
銀白湯
八珍湯
十全大補湯

經益元散
大防風湯

四物湯

見血

補中益氣湯

見血
門

升陽益胃湯

益胃升
陽湯

補脾胃瀉陰火升陽湯

歸脾湯

見血
門

養心湯

見血
門

人參養榮湯

見血
門

補肺湯

生肌散見暑門

紫菀湯

黃耆驚風散人參黃耆散

蓋氣聰明湯

卷

發表之劑正方五十八

麻黃湯陽旦湯 大黃湯

桂枝湯疏邪實表湯 桂枝加黃耆湯

各半湯桂枝二麻黃一湯

建中湯桂枝加黃耆湯

大青龍湯

內複方四

破柏于金湯麻黃杏仁甘草石膏湯

甘草湯桂枝加附子湯 桂枝去桂加

芍藥湯桂枝加大黃湯 桂枝去桂加

當歸建中湯桂枝五物湯 小建中湯 黃耆

小青龍湯小青龍加石膏

補肺阿膠散

百合固金湯

秦艽扶羸湯

秦艽驚風散

羊肉湯