

5281

944

徐叶堦

四大家辯
論醫宗必讀
論景岳書

王繩林

改正古方權量說

汪纘功

虛勞論
附保陰煎方

周有吾

三焦說
命門說

陰陽常變論

汪正希

讀先祖保陰煎謹記

沈香巖

六味地黃丸方解
八味地黃丸方解

唐立三

司天運氣徵驗

中道說
三百九十七法攷

吳醫彙講

卷九十一

SS14
010
1部4

吳醫彙講卷九目錄

徐叶壖

四大家辯

論醫示必讀

論讀景岳書不可專得其溫補之旨

王繩林

攷正古方權量說

吳醫彙講卷九

長洲唐大烈立三氏纂輯

門人王與謙履安氏校訂

徐叶壘

名鏞號鉦臺松江南邑人弱冠入諸生卽棄舉業專攻岐黃學

四大家辯

李士材讀四大家論一篇本自王節齋大意謂三子補仲景之未備而與仲景並峙也然仲景醫中神聖德備四時三子則伯夷伊尹柳下惠而已試觀玉函金匱方中黃芩白虎已開河間之先也建中理中已

開東垣之先也。復脈黃連阿膠已開丹溪之先也。然則謂三子得仲景之一德而引伸條暢之則可謂三子補仲景之未備則未確也。

論醫宗必讀

明季李士材先生我城人也。所著醫宗必讀一書固已膾炙人口矣。然余竊有議焉。夫必讀者軒岐之書也。越人仲景之書也。下此而脈經千金外臺以及近代諸名家書雖不能盡讀。或取其十之六七。或取其十之三四。不可不讀矣。苟守張長沙博聞強識之訓。

以探本窮源。則是書又爲淺醫畫限之書矣。改其名曰不必讀其庶幾乎。

論讀景岳書不可專得其溫補之益

竊觀富貴之家。投寒涼則忌。進溫補則合。醫之喜用溫補者。遂有景岳派之名。殊不思景岳亦溫涼補瀉並收之書也。觀其論症。先述古而補以已見。分劑先古方而補以新方。作者以全書名之。讀者以全書貫之。舍其短而錄其長。則上而溯諸河間。易水。金華。諸家。無不合也。更上而溯諸南陽醫聖。亦無不合也。而

得景岳之益者豈特在左歸右歸而已哉不合也而

不合其意而終其其問止而無謂其問長本金華院

古式而蘇以源本者以全書各公蘇皆以全書買

並外之書也購其備或去或留而蘇以日限分價去

蘇諸書涉育景岳之文各極不累景岳與蘇蘇蘇

蘇諸富貴之家好與蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇

蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇

蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇

蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇

蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇

王繩林

名丙號樸莊吳縣恩貢生世居包衙前

攷正古方權量說

古方自靈素至千金外臺所集漢晉宋齊諸名方凡云一兩者以今之七分六厘準之凡云一升者以今之六分七抄準之謹攷定如左

凡古方權量皆起于律黃帝律尺九寸夏尺則加爲一寸而爲十寸今木工之曲尺是也

唐孫真入千金方論述針穴分寸云其尺用夏家古尺司馬法六尺爲步今江淮吳越所用八寸小尺是也据此知卽今曲尺無疑知此尺卽黃帝律尺寸者以藥升之龠積與尺度攷得之

詳見律學淨聞

以曲尺之寸度作方徑一寸六分上下相等深七分八厘強共積
二千分卽古藥升之容積

千金論藥升方作上徑一寸下徑六分深八分當作上下徑一
寸六分深八分弱按管子云釜鑊不得爲侈弁且計其容積僅
五百廿二分不應如此之小故知傳寫之誤也升口自乘得一
百五十六分以深七分八厘強乘之得二千分爲容積云深八
分者舉成數言之也

藥升一升容黃鐘兩龠之實以秬黍二百四十粒爲一兩但秬黍

之重今無可攷依千金論蜜一斤得藥升七合及靈臺儀象志水
與蜜同積異重之比例若二十與廿九而次第以準測之古一兩
今七分六厘也

古律龠容一千一百八十秬黍千金論一撮者四刀圭也

六十

爲圭半之
爲一刀圭

撮爲一勺

勺卽
龠也

兩勺爲一合

合爲升字之誤一升
共二千五百六十黍

也李時珍沿兩勺爲一合之誤更增十合爲一升則誤以傳誤

矣幸千金及外臺原文俱無此五字可證

秬黍一掬二米用以量龠取其圓滑而齊

見攷工記輪人
條下註疏中

自劉

歆變亂古法置秬用柜前明鄭世子特覓秬黍權以今平每龠

一千二百粒重三錢未足爲訓也

鄭世子樂書穿鑿附會其云
黍權黍量盡屬臆斷張介賓

採入類經圖翼
殊誤後人也

知二百四十黍爲一兩者千金三十黍爲一銖

圖翼謂十黍當
作百黍者非也

六銖爲一分四分爲一兩十六兩爲一斤此則神農之秤也

攷正古權之法先作藥升滿曲尺二千分中容井水秤重一兩

二錢而推得其同積異重之比例假如水與蜜各貯一盞中容

積相等而水輕蜜重水若二十兩則蜜必二十九兩以此推算

一藥升之水重一兩二錢者則一藥升之蜜必一兩七錢四分

明矣

以三率明之

水二十

蜜二十九

水一兩二錢

蜜一兩七錢四分

既得蜜一藥升之重以三率重測之如法乘除得蜜七合之重

藥升一升

蜜今重一兩七錢四分

藥片七合

相乘得數三十四兩八錢以第一率之二一為
法除之得第四次一兩七錢四分

蜜今重一兩二錢一分八厘

夫此七合之蜜今重一兩二錢一分八厘者即古蜜十六兩之數也依上法重測之得古一兩今若干之數

古十六兩

今重一兩二錢一分八厘

古一兩

今重七分六厘強

以古方參之

麻黃湯麻黃三兩

準今二錢三分

分三服中病即止

每服止七分六厘

小柴胡湯柴胡八兩

準今六錢

分三服

每服止二錢

承氣湯大黃四兩

準今三錢

分再服中病即止

每服止一錢半

白虎湯石膏一斤

準今一兩二錢

分三服

每服止四錢

藥升之容積二千分以今倉斛之積寸淮之古一升今六勺七抄也

立方筭法滿千分爲一寸曾以倉斛計之合曲尺之寸度積一

千四百九十七寸爲今五斗則知曲尺二寸爲六勺七抄

以古方泰之

半夏秫米湯半夏五合

準今三勺三抄半

秫米一升

準今六勺七抄

甘瀾水

五升準今三合煎取升半準今一合分三次每服飲一小杯杯如杯飲約可

手掬今比此尤小故曰小杯

四逆散每服方寸七準今一錢其泄利下重者加薤白一升煎服

禾藥少而一升之薤其少亦可知

方寸七者作七正方一寸依曲尺之寸度爲之錢七者以五銖錢爲之開元錢亦同皆抄散取不落爲度

古人用散藥以刀圭抄取之七亦刀圭之意也準前論一刀圭爲三十二黍方寸七者十刀圭也立方一寸積千分三除之得三百三十三分爲方一寸七之實容三百二十黍準今一錢藥注

輕重不等今但就黍計之以得其大槩

千金論錢七者以大錢上全抄之若云半錢七者則是一錢抄取半邊耳並用五銖錢也錢五七者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落爲度按五銖錢與開元錢徑相同準曲尺九分其器六十三分以九分乘之得五百六十七分三除之得一百八十九分爲一錢七之實乃以三百三十三分爲首率重一錢爲次率一百八十九分爲三率得重五分六厘爲四率是一錢七之重也半錢七者準今二分八厘錢五七者準今一分四厘也以古方叅之

五苓散四逆散等方每服方寸七準今一錢

桃花湯赤石脂末半斤每服方寸七日三服每方寸七準今之二錢石藥性

重也

燒禪散每服方寸七日三服灰性必輕

大陷胃湯甘遂一錢七分二服每服是半錢七準今二分八厘

十棗湯強人服一錢七準今五分六厘

文蛤散一錢七藥性較輕

一撮者以三指為度

千金論一撮者四刀圭也得一百廿八黍準今四分

以古方參之

澤朮麋銜散藥共二十五分

準今四錢七分五厘

以三指撮為後飯

每服

四分日三服三日後病瘳而藥將盡矣

風引湯藥共五十五兩

準今四兩一錢八分

取三指撮井水煮服

石藥性重

每服八分以五十餘日為度

凡丸藥如梧子大者準藥末一分如彈丸及鷄子黃者準藥末一

錢

千金論刀圭者十分方寸七之一準如梧相子大也一方寸七

散以蜜和得如梧桐子十九為定如彈丸及鷄子黃者以十梧