

丹溪心法附餘卷之六

丁集

暑門

瘧十八

丹溪心法

瘧疾有風 暑 食 痰 老瘧 瘧母 大法風暑富癸

汗夏月多在風涼處歇遂閉其汗而不泄故也 惡飲食者必

自飲食上得之 無汗者要有汗散和為主帶補 有汗者要

無汗正氣為主帶散 一日一發者受病一月 間日一發者

受病半年 三日一發者受病一年 二日連發在一日者氣

血俱病 瘧病感虛者須以人參白朮一二貼托住其氣不使

下陷後使他藥內傷挾外邪同發內必主痰外以汗解散二陳

湯加柴胡黃芩常山草果煎服 久瘧不得汗者二陳湯加檳

榔倣倉木 一方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截 老

瘧病此係風暑於陰分用血藥引出陽分則散入方宜

川芎

撫芎

紅花

當歸

炒栝

白朮

蒼朮

甘草

白芷

左劉水煎露一宿次早服

○治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之若在

陰分者用藥掣起陽分方可截即煎藥之屬

或按瘧在陰分須徹起陽分者即格致論中云臆得出至

臍亂而失期也又當因其汗之多寡而為補養升發之術

下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川芎蒼朮

花葛升麻柴胡之屬此丹溪治瘧之微旨學者所當知也

截瘧常山飲

穿山甲

炮

草果

知母

檳榔

烏梅

甘草

炙

常山

右或咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得吐為順
一云加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚朴又或加青皮陳皮
又方

柴胡

草果

常山

知母

貝母

檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發則二時服

又治瘧母此藥消導

青皮

桃仁

紅花

神麴

麥芽

鱉甲

醋炙

三稜

莪朮

海粉

香附

並用醋炒

右為末凡如梧子大每服五七十丸白湯下

又治癰寒熱頭痛如破渴飲水水外多汗出

人參

白朮

黃芪

黃芩

黃連

山梔

炒

川芎

蒼朮

半夏

天花粉

右以咀水二鍾姜三片煎服

又治癰疾發渴

生芩

麥門冬

天花粉

牛膝

知母

葛根

炒栢

生甘草

右以咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿半斤冬瓜葉 官桂

馬鞭草

右焙乾為末水丸胡椒大每一兩分四服於當發之前一時服盡 又云青蒿半斤冬青葉二兩馬鞭草二兩桂二兩末知孰是姑兩存之以俟知者

截瘧

檳榔

陳皮

白朮

常山各系茯苓

烏梅

厚朴各一多半

右以咀作二服水酒各一鍾煎至一鍾當發前一日一服臨發日早一服服後少睡片時

又瘧疾後

白朮

半夏一兩 黃連半兩 白芍三兩 陳皮半兩

右為末 粥丸梧子大 每服六十九 姜湯下

附諸資論

心法附錄曰世用砒霜等毒不可輕用俗謂之脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒況其他乎在其陽分者易治陰分者難治瘡母必用毒藥消之行氣消堅為主東垣謂寒瘡屬太陽熱瘡屬陽明風瘡屬少陽在三陰經則不分總曰溫瘡此言是但三陰經說不明凡作於子午卯酉日者少陰瘡也寅申巳亥日者厥陰瘡也辰戌丑未日者太陰瘡也

附脈理

脈訣華要曰瘧脈自弦弦遲多寒弦數多熱隨時變遷

心法附錄曰瘧脈多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦有病久而脈極虛微而無力似乎不弦然而必於虛數之中見弦但不搏手耳細察可見也

附諸方

黃連香薷飲

治伏暑發瘧煩渴者

見中著

桂枝羌活湯按粹方治瘧疾頭暑前發頭痛項強脈浮惡寒有

汗者

桂枝

羌活

防風

甘草各半兩

右為粗末每服半兩水煎如吐加半夏麴等分

麻黃羌活湯按粹方治瘧疾頭痛項強脈浮惡風無汗者

麻黃去節羌活

防風

甘草各半兩

右為粗末每服五錢水一盞半煎至如吐加半夏麴等分

麻黃桂枝湯按粹方治瘧疾如前病而夜發者或惡風或惡寒

麻黃一兩去節

炙甘草三兩

黃芩五兩

桂二兩

桃仁二十箇去皮尖

右為末水煎服桃仁散血緩肝夜發乃陰經而有邪用此湯

散血中風寒也

桂枝黃芩湯按粹方治瘧服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽

三陽合病也

桂枝石黃湯內此柴胡黃芩人參甘草

甘草

人參

黃芩各四兩半

半夏四兩

柴胡一兩二兩

石膏

知母各五兩桂枝二兩

右為粗末每服五錢水煎服

桂枝石膏湯

按本方

治瘧疾先寒後熱熱多寒少

桂枝五錢石膏

知母各一兩半

黃芩一兩

右為細末三分服每水二盞煎服間日者邪氣所合故也

○已上數方發散之劑

人參養胃湯

治瘧疾寒多熱少者必須先用此藥發散然後

用四獸飲之類截之因食倍加草果

見胃寒類

萬安散濟生方治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以取

效氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼木泔浸去皮炒

厚朴

姜製

陳皮去白槿榔

恒山酒浸甘草炙各一錢半

右咬咀水一盞半煎至一盞露一宿當發前作二服忌熱性
物片時

定齋草果飲簡易方快脾治瘧

平胃散內加烏梅甘草半盞

草果

蒼木泮浸厚朴

陳皮

半夏麴

甘草炙

烏梅去核各等分

右咬咀每服半兩水盞半姜五片寒二個同煎七分不拘時
服寒多者加乾薑附子熱多者只加柴胡瘴瘧加檳榔

柴胡桂薑湯活人方治瘧疾寒多微熱或但寒而不熱者并治
勞瘧

柴胡四兩桂枝去皮二兩半

黃芩一兩半瓜蒌根一兩

牡蠣炮碎炒甘草炙

乾薑各半兩炮

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服

柴胡加桂湯活人方治瘧先寒後熱兼治支結

柴胡八兩去苗 人參去苳其草炙 半夏炮七次

黃芩 肉桂去皮各二兩

右咬咀每服五錢水盞半姜七片棗二個煎服若渴者去半夏加入人參瓜蒌根同煎服之

○已上數方治瘧寒多熱少發散之劑無汗可用

小柴胡湯 治瘧疾熱多寒少但或單熱頭疼口乾胸滿者方
見溫熱類

柴胡括蕒根湯 治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡去苗一兩七錢半天花粉一兩黃芩去黑心人參

甘草炙七錢半

右服一兩薑五片棗一枚水二盞煎一盞去渣通口服

白虎加桂枝湯治人方治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母六兩甘草炙三兩桂枝三兩粳米三兩石膏一斤

右咬咀每服五錢水盞半煎至一盞去滓溫服

清脾飲治瘧生方治瘧瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽熱小便赤澀

青皮去白厚朴姜製白朮

半夏湯洗七次

黃芩

草果仁

柴胡去苗茯苓去皮甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎七分溫服不拘時候

參蘇飲

治發瘧熱多寒少兼咳嗽者

見傷風類

驅瘧飲 治發瘧熱多寒少者

前胡

柴胡各四兩桂心

桔梗

厚朴

半夏

各三兩

黃芪

乾姜炮

甘草炙各二兩

右剉水

二盞生姜三片棗四個煎

○已上數方治瘧熱多寒少發散之劑有汗可用

大柴胡湯

治瘧熱多寒少目痛多汗脈大以此湯微利為度

餘邪未盡以白芷石膏三物湯以盡其邪

方見溫熱類

白芷石膏三物湯

白芷一兩知母一兩七錢

石膏四兩

右為粗末每半兩水一盞溫服清

○已上二方治瘧熱多寒少推逐調和之劑

四獸飲簡易方治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚延飲
典衛氣相搏癆為瘡疾

人參去芦白朮

茯苓去皮橘紅

草果仁

半夏湯泡棗子

生薑

烏梅去核各等分

甘草炙減半

右咬咀以鹽少許淹食頃用厚皮紙裹了以水濕之慢火炮
令香熟焙乾每服半兩水二盞煎六分未癆前併進數服
七寶飲簡易方治一切瘡疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱
如瘡

厚朴姜製陳皮

甘草炙

草果仁

常山雞骨者

檳榔

青皮各等分

右改咀每服五錢水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿空心
向東溫服時須忌熱性物寒多加酒服

清肺湯三因方治飲食傷脾停滯痰飲癆為寒熱

厚朴四兩姜製炒

烏梅去核半夏湯去滑青皮

良薑各二兩草果去皮一兩甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分未癆前併
三服忌生冷油膩之物

○已上三方治瘧寒多熱少止截之劑

常山飲和劑方治瘧疾癆散不愈漸成癆瘵

知母

川常山

草果各三兩二錢

良薑二兩

甘草

烏梅去核各一兩六錢

右咬咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分溫服
六和湯

人參

知母

草果

貝母

烏梅

白芷

檳榔

柴胡各一錢用酒并常山二錢

右劉姜三片棗一枚酒水同煎露一宿臨發前二時服

○已上二方治瘧熱多寒少止截之劑

鬼哭丹

治瘧一二日一發者

常山一斤醋浸春五夏三日秋七冬十日檳榔各四兩

半夏

貝母各二兩

西

右為末用雞子清麵糊

為丸如梧桐子大每服三十九隔夜

臨睡冷酒吞服次日早再進一服

秘方清脾丸 治瘧三日一發或十日一發

姜黃三兩 白朮二兩半 人參 檳榔 草果

莪朮 醋炒厚朴 各半兩 黃芩 半兩 青皮 各二兩

甘草三兩

右為末飯丸如梧子大每六十丸食遠白湯下日二服

紅丸子濟生方專治食癰

青皮炒三兩 阿魏醋化二兩五分 蓬朮 醋煮京三稜 醋煮各二兩

胡椒一兩

右為末別用陳倉米同阿魏醋煮糊丸如梧子大每服五十丸至百丸淡薑湯下或因食生果成癰用麝香湯吞下

老瘡飲三因方治久瘡結成癥痕疥癬在胸脇諸藥不愈者