


共六本

幼幼集成
雲



鼎鑪幼集成卷之四

羅浮陳復正飛霞氏輯

盧陵劉勳棠氏

遂陽周宗頤虛中氏

金谿周光霽頤堂氏

重校

卷之四

中醫藥大學圖書館版權所有

○腫滿證治

經曰膚脹者寒氣客於皮膚之間腹太身盡腫皮厚按之陷不起腹色不變此其候也又曰諸溼腫滿皆屬於脾又曰水病下爲胕腫大腹上爲喘呼不得臥者標本俱病夫腫滿之證悉由脾胃之虛也脾土喜燥而惡溼因中氣素弱脾虛無火故水溼得以乘之而脾愈不運則乳食凝而不化停積於中而腫滿作焉治腫者當以脾胃爲本而以浮腫爲

標斯庶幾矣若以消伐剋削爲能事未有不致危殆者也

治腫當分上下經曰面腫者風足腫者溼凡腫自上而起者皆

因於風其治在肺宜發散之麥蘇飲合五皮湯

起者因於腎虛水沉或因於脾氣受溼宜滲利之

治溼不利小便非其治也宜五苓散加防己檳榔

一身盡腫者或胎稟不足卒冒風寒或因瘧痢脾虛

輕者薑苓丸重者加味胃苓丸當與未條參攷

凡小兒之腫在表者頭痛身熱此風寒在表宜微汗之五苓散

少加麻黃葛根蘇葉杏仁以發之若身無熱五苓散加肉桂

膀胱氣化小便利而腫消矣○陽水腫身熱大便秘小便赤

澀煩燥口渴以五皮湯作前送沉澀丹微下之○陰水腫身

不熱口不渴身冷怯寒二便自調平胃散加白芍
凡腫證先起於腹而散於四肢者可治先起四肢而後歸於腹
者不可治○若小兒元氣本虛復遇大病之後而腫身冷腫
四肢冷不渴小便清長大便滑泄不思飲食此陰病之極脾
胃將治腫之方俱不可用惟以四君子湯加青化桂枝湯砂
仁白蔻以救其脾胃斯可矣昧者但見其腫不知元氣之竭
絕而猶消導利水復以舟車功暨大戟芫花甘遂劫奪之
者此殺人之事慎之戒之

○入方

參蘇飲 方見三卷咳嗽門

五反湯 方見二卷傷寒門

力力集

五苓散 方見二卷傷暑

胃苓丸 方見二卷傷濕

加味胃苓丸 卽胃苓丸本方加後藥○頭面腫初起略加

作喘加桑白皮杏仁○小便黃赤加水通○身腫如蠶加皮

腹脹加砂仁白蔻丁香枳殼○脚冷不溫加附子桂枝已

平胃散 方見三卷瘧疾門

加味四君子湯 治脾敗胃傷陰寒作腫多服自消

官揀參錢一漂白朮錢一白雲英錢五上青桂八分黑炮薑錢一西砂仁

錢白芷錢一公丁香分二炙甘草分五大棗三枚水煎牛飢溫服以愈爲度

○水腫簡便方

凡小兒患腫切須忌鹽鹽助水邪服之愈甚必待腫消之後以

鹽煨過少用之○治水腫從脚起入腹則難治用紅飯豆

五升水煮極熟取湯四五升溫浸兩膝之下冷則重煨

入腹以^紅煮湯日服之亦消蓋紅豆之功專於利便也

治脚腫掘杉木根切斷而肉色紅者為油杉方可煎若切開白

色者不堪以紅根切碎煎濃湯將腫脚先熏後洗

又方以紅糟一大碗加入生薑生葱三味同煎湯先熏後洗

又治頭面手足俱腫用苦亭薤一兩隔紙炒熟研細末以大紅

棗蒸過去核取肉和藥末杵勻為丸如小豆大每服七粒白

湯下日三服^{五日}則小便多腫自消也忌鹹酸生冷之物

傷寒傷溼腫以菴活切片菴蓰子二味等分同炒香取起揀去

菴蓰不用只以菴活為末每服一錢初日一服二日二服三

日三服效

腫證氣喘男婦大小腫因積得既取積而腫再作小便不利者
再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者至此束手蒿中不
焦氣不升降爲陰寒否隔水遂凝而不通用熟附子三錢生
薑二錢沉香三分同煎濃湯冷服大人附子一兩生薑六錢
沉香麝濃汁以附子生薑煎湯對服不拘服數以愈爲度
身面浮腫坐臥不得取向東桑枝燒灰淋汁煮紅豆數升每飯
卽食之不得別飲湯水

水腫本於脾虛不能制水水積妄行而爲腫當以參朮補脾爲
主使脾氣實則能健運而水自行切不可下

○脹滿證治

經曰足太陰虛則鼓脹又曰胃中寒則脹滿又曰濁氣在上則
生臌脹○夫脹滿者腹脹氣滿也由於脾肺氣虛不能運道
所以作脹也有虛脹實脹熱脹寒脹大抵虛脹冷脹寸之七
八實脹熱脹寸之二三蓋實熱之證人所易見或因傷食或
因傷寒入裏所以易知而易治虛冷之證由中氣虛弱脾氣
不化而脹所以難見而難醫若以虛冷之脹而誤以爲實熱
之脹治之其變不可勝言矣○虛脹者或因吐瀉之後或因
服藥攻下太過致成腹脹者宜溫中調氣厚樸湯中湯若虛
而兼寒者加附桂○實脹者腹中原有食積或飲食過飽因
結於中外證則胃口胸前高脹身熱口渴倦臥不語腹微
喘口閉不開儼然虛極之象小兒此證最多而難識昧者不

爲詳審見其四肢不舉口閉不開誤以爲慢驚而用寧神導
痰之藥十中十死無一活者不知太實有羸然卽此是也急
宜下之集成沆瀣丹集成三仙丹同服○熱脹苦或瀉寒熱
邪入裏大便閉結小便短赤渾身壯熱面赤燥煩或瀉寒
寒脹者由中氣素寒冷滯鬱結無身熱口渴面唇青或瀉
氣喘腹先以場氣丸消之後以異功散調其脾胃○凡遍身
瘡疥因淋洗塗搽逼毒歸內而腹脹者輕則荆防敗毒散并
散之重則集成沆瀣丹微利之瘡出脹消者吉瘡不出者凶
經謂臍寒生脹滿蓋脾爲陰中之至陰因脾溼有餘無陽不能
施化如上之久於雨水則爲泥矣豈能生自萬物必待和風
暖日溼去陽生自然生長也凡此宜以辛熱之藥運用之可也

經謂下之則脹已此以溼熱飲食有餘脾胃素實形體氣質壯
實者言之也若脾虛內寒而氣不能運精微以成脹滿者
宜以甘溫補脾爲主少佐辛熱以行壅滯之氣庶使脾木健
旺脹滿運行斯可愈矣此經之所謂塞因塞用從治之謂耳
醫者不察乎此惟執下之脹已急於獲效病者豈得創藥以
求通快不知暫快一時則真氣愈傷脹滿愈甚去死不遠矣
諸家治脹治腫俱知行氣利水剋削並行輒用猛劑示之此速
死之道不知脾氣虛極而腫而脹愈下愈虛惟切目前之快
而陰損真元禍不旋踵後賢幸加意焉

○人方

厚樸溫中湯 治胃寒心腹脹

紫厚樸一錢五分 真廣皮一錢五分 墨薑灰一錢 白雲苓一錢 蔓薏仁五分

南木香五分 炙甘草五分 虛寒者加熟附子五分 青化桂薑五分

場氣丸 治寒氣鬱結肚腹虛脹

胡椒仁一兩 全蝎尾五錢 子洗淨去鈎

右以胡椒略去皮取肉

兩炒過和蝎尾研末麪糊丸極小每服一二錢陳皮湯送下

集成沆瀣丹 方見二卷胎疾門

集成三仙丹 方見二卷類摘門

異功散 方見二卷傷食門

荆防敗毒散 治瘡疥毒氣內陷肚腹作腫

荆芥穗 北防風 淨連翹 陳枳殼 綠升麻

南薄荷 川羌活 川獨活 粉乾葛 川木通



金銀花 片黃芩 正川芎 黑梔仁 炙甘草各一錢

上身腫加葱三莖下身腫加燈心十莖水煎服

○腹脹簡便方

治氣脹水脹用羯雞糞乾者一升炒焦黃色出火毒紙細末以
百沸湯三升淋汁每服一盞調木香煨末各五分分七滿
蠱毒脹有一無二之方也○治食脹氣脹用蘿蔔子二兩研
細末水調濾汁用砂仁二兩以蘿蔔子汁浸一宿炒乾又浸
又炒共七次為末每服一錢米飲調下

○黃疸證治

經曰身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也又曰溺黃赤安
臥者黃疸已食如饑者胃瘕○夫黃疸之證古人多言為濕



熱及有五癰之分皆未足以盡之予謂黃之大要亦惟有一
曰陽黃曰陰黃而寒熱虛實總括二者之中無餘義矣
一陽黃證因溼多成熱熱則生黃此則所謂溼熱證也其證
身熱煩渴或燥擾不寧或消穀善饑或小便熱痛或大便
結其脈實而有力此證不拘外感風溼內傷食飲積聚之
但察兒之元氣尚強脾胃無損而溼熱果盛者直宜清人邪
利小便茵陳五苓散最穩胃苓湯加茵陳亦佳若大便秘結
熱甚者集成沆瀣丹

一陰黃證全非濕熱而總由氣血之敗蓋氣不生血所以血敗
血不華色所以色敗凡病黃而絕無陽證陽脈者便是陰黃
或因大病之後或脾胃久虧致脾土之色自現於外其證喜

靜惡動喜暗畏明神思困倦言語輕微畏寒少食四肢無力
或大便不實小水如膏此皆陽虛之候與溼熱發黃者異
冰炭使非速救元氣大補脾胃終無復元之理且此證多
而昧者不察遂云黃疸同是溼熱而用茵陳梔子清利水
則無有不隨藥而斃者即四君子五苓散溫胃飲是其一也
凡小兒脾胃素弱常有積滯面色多帶黃白不可消積惟以
成肥兒丸多服使脾胃健食自消濯滯臟腑流行榮衛自然
五色修明何黃之有○小兒黃病昧者一槩呼爲溼熱無非
除溼利水清熱退黃除此之外無別法矣豈知溼熱發黃者
少脾虛發黃者多蓋脾土强者足以捍御溼熱必不生黃惟
其脾虛不運所以溼熱乘之治此者無非暫去溼熱茵陳五

苓散亦佳黃稍退即速健脾不得屢用消耗而謂有是病用
若面目俱黃而帶虛浮唇白舌淡口不渴身不熱夜無煩熱
便不澁不可認為溼熱而分利之速救脾胃四君子湯六
是其宜也○凡服分利之藥黃久不退以致口淡心虛四肢
軟弱憎寒發熱小便帶濁皆為虛甚宜四君子煎送之
黃丸不可再行分利以致脾敗腎絕而死矣

○入方

茵陳五苓散 方見二卷傷濕門

胃苓湯加茵陳 方見二卷傷濕門此加茵陳一錢

集成沆瀣丹 方見一卷胎疾門

四君子湯 方見三卷虛疾門

五君煎 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼溼者

官揀參錢一漂白朮錢二白雲苓錢二炮薑灰錢一炙甘草錢二

溫胃飲 治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食

官揀參錢一漂白朮錢二白扁豆錢一廣陳皮錢五炮薑灰錢一

大當歸錢一炙甘草錢六水一鐘煎七分服

集成肥兒丸 治小兒脾胃虛弱飲食不消肌膚瘦削多眠能

令兒肥此丸久經效驗比諸家肥兒丸功獨勝

建連肉二兩西砂仁六錢漂白朮一兩官揀參一錢焙

京查肉四錢杭白芍四錢廣陳皮四錢法半夏四錢白雲苓

一兩乳二錢真雅連二錢普製六錢六神麴六錢炙甘草錢一

共為細末煉蜜為丸彈子大每日早午晚各服一丸米飲下



六君子湯 方見二卷類摘門

八味地黃丸 方見一卷保產門

○黃輝簡便方

小兒急黃以絲瓜連皮帶子火燒存性研末每服一錢米湯下連進數服愈○小兒黃如金色因積滯凝於脾家以糯稻草煎濃湯飲之數次效○治小兒黃輝如金取山間薏苡仁極洗極淨煎湯服之自愈○治溼熱發黃用生薑半觔茵陳半觔同搗爛以布包之時時周身擦之其黃自退

○腹痛證治

帝曰願聞人之五臟卒痛何氣使然岐伯對曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行客於脈外則血少客

