

景岳全書外科鈐目錄聖集

卷之四十六

外科上

經義一

脉候二

論證三

善惡逆順四

虛實五

淺深辨六

總論治法七

敗毒八

托裏九

論汗下十

論灸法十一

膿針辨十二

論針法

十三

用針勿忌尻神

十四

圍藥

十五

腐肉

十

含時從證

十七

陽氣脫陷

十八

溫補按則

十九

定痛

二十

生肌收口

二十一附漏證

用香散藥

二十一

槐花酒

二十三

忍冬酒

二十四

腫瘍

二十五

腫瘍不足

二十六

潰瘍

二十七

潰瘍有餘

二十八

潰瘍作痛

二十九

潰瘍發熱

三十

發熱煩躁 三十一

作嘔 三十二

作渴 三十三

瀉痢 三十四

大便秘結 三十五

小便淋瀝不利 三十六

發瘰 三十七

無寐 三十八

瘡瘍出血 三十九

戒忌調護 四十

陰陽證變 四十一

論列方 外科上

卷之四十七

外科下

發背 四十二

腦疽 四十三

耳瘡 四十四

鬢疽 四十五

疔瘡 四十六

療癰 四十七

疔瘡 四十八

時毒 四十九

肺癰肺痿 五十

乳癰乳巖 五十一

胃脘癰 五十二

腹癰 五十三

腸癰 五十四

附骨疽 五十五

腎癰 五十六

流注 五十七

鶴膝風 五十八

多骨疽 五十九

下疳瘡 六十

便毒 六十一

楊梅瘡 六十二

囊癰 六十三

懸癰 六十四

脫疽 六十五

腳發 六十六

足跟瘡 六十七

腎臟風瘡 六十八

膝瘡 六十九

天泡瘡 七十

赤白遊風 七十一

翻花瘡 七十二

痔漏 七十三
附臟毒
下血按

跌打損傷 七十四

杖瘡 七十五

破傷風 七十六

類破傷風 七十七

班疹丹毒 七十八

癰瘡 七十九

泥八十

論列方
外科下



景荷全書卷之四十六聖集

外科鈴

金稽 張介賓 會卿著

臨海 賈棠 青南訂

外科鈴

經義

癰疽篇黃帝曰血氣已調形氣乃持余已知血氣之平與不平
未知癰疽之所從生成敗之時死生之期有遠近何以度之
可得聞乎岐伯曰經脉流行不止與天同度與地合紀故天

宿失度、日月薄蝕、地經失紀、水道流溢、草壹不成、五穀不殖、
經路不通、民不往來、巷聚邑居、則別離異處、血氣猶然、請言
其故、夫血脈營衛周流不休、上應星宿、下應經數、寒邪客於
經絡之中、則血泣、血泣則不通、不通則衛氣歸之、不得復反、
故癰腫、寒氣化爲熱、熱勝則腐肉、肉腐則爲膿、膿不瀉則爛、
筋筋爛則傷骨、骨傷則髓消、不當骨空、不得泄寫、血枯空虛、
則筋骨肌肉不相榮、經脈敗漏、薰於五藏、藏傷故死矣。○黃
帝曰、願盡聞癰疽之形、與忌、曰、名、岐伯曰、癰發於嗌中、名曰
猛疽、猛疽不治、化爲膿、膿不爲塞咽、半日死、其化爲膿者、寫

則合豕膏冷食三日已。○發於頸名曰天疽其癰大以赤黑
不急治則熱氣下入淵腋前傷任脈內薰肝肺薰肝肺十餘
日而死矣。○陽氣大發消腦留項名曰腦爍其色不樂項痛
而如刺以針煩心者死不可治。○發於肩及臑名曰疵癰其
狀赤黑急治之此令人汗出至足不害五藏癰發四五日暍
熇之。○發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長
疎砭之塗以豕膏六日已勿熨之。○其癰堅而不潰者爲馬
刀挾纓急治之。○發於胸名曰井疽其狀如大豆三四日起
不早治下入腹不治七日死矣。○發於膺名曰甘疽色青其

狀如穀實、蘇、蘇常苦寒熱、急治之、去其寒熱、十歲死、死後出膿、○發於脇、名曰敗疵、敗疵者、女子之病也、灸之、其病大癰、膿治之、其中乃有生肉、大如赤小豆、剉蔞、蔞草根各一升、以水一斗六升、煮之、竭爲取三升、則強飲、厚衣坐於釜上、令汗出至足已、○發於股脛、名曰股脛疽、其狀不甚變而癰、膿搏骨、不急治、三十日死矣、○發於屍、名曰銳疽、其赤堅、大急治之、不治三十日死矣、○發於股陰、名曰赤施、不急治、六十日死、在兩股之內、不治十日而當死、○發於膝、名曰疵癰、其狀大癰、色不變、寒熱如堅石、勿石、石之者死、須其柔乃石之者

生○諸癰疽之發於節而相應者不可治也發於陽者百日
死發於陰者三十日死○發於脛名曰兔齧其狀赤至骨急
治之不治害人也○發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變
數石其輪而止其寒熱不死○發於足上下名曰四淫其狀
大癰急治之百日死○發於足傍名曰厲癰其狀不大初如
小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死○發於足
指名脫癰其狀赤黑死不治不赤黑不死不衰急斬之不則
死矣○黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯曰榮衛稽留於
經脉之中則血泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而

不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐腐則爲膿然不能陷骨髓不爲焦枯五藏不爲傷故名曰癰黃帝曰何謂疽岐伯曰熱氣淳盛下陷肌膚筋髓枯內連五藏血氣竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者上之皮夭以堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以澤此其候也

玉版篇黃帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣有餘營氣不行乃發爲癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化爲膿小鍼能取之乎岐伯曰以小治小者其功小以大治大者多害故其已成膿血者其唯砭石鉞鍼之所取也黃帝曰多

害者其不可全乎。岐伯曰：其在逆順焉？以爲傷者其白、眼青、黑、眼小，是一逆也。內藥而嘔者，是二逆也。腹痛渴甚，是三逆也。肩項中不便，是四逆也。音嘶色脫，是五逆也。除此五者爲順矣。

寒熱病篇曰：五藏身有五部。伏兔一腓，二腓者，膈也。背三五藏之腧，四項五，此五部有癰疽者死。○凡刺之害中而不去，則精泄不中而去，則致氣精泄，則病甚而恆致氣，則生爲癰疽也。

生氣通天論曰：高粱之變，足生大疔。受如持虛。○汗出見濕，乃

生痿痺。○勞汗當風，寒薄爲皴，鬱乃痊。○營氣不從逆於肉，理乃生癰腫。○陷脉爲癭，留連肉腠。○因而飽食，筋脉橫解，腸澼爲痔。

陰陽別論曰：三陽爲病，發寒熱，下爲癰腫。

脉度篇曰：六府不和，則留結爲癰。

異法方宜論曰：東方之域，其民食魚而嗜鹹，其病皆爲癰瘍。其治宜砭石，故砭石者亦從東方來。

氣穴論曰：肉之大會爲谷，肉之小會爲谿。肉分之間，谿谷之會，以行榮衛，以會大氣。邪溢氣壅，脉熱肉敗，榮衛不行，必將爲

膿內消骨髓外破大膿留於節湊必將爲敗積寒畱合榮衛
不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痹外爲不仁命曰不足
大寒畱於谿谷也

刺節真邪論曰虛邪之中人也洒淅動形起毫毛而發腠理其
入深內搏於骨則爲骨痺搏於筋則爲筋攣搏於脈中則爲
血閉不通則爲癰○虛邪之入於身也深寒與熱相搏久畱
而內著寒勝其熱則骨疼內枯熱勝其寒則爛肉腐膿爲膿
內傷骨內傷骨爲骨蝕○有所疾前筋筋屈而不得伸邪氣
居其間而不反發爲筋澀○有所結氣歸之衛氣歸之不得

反津液久留、合而爲腸溜。○久者數歲、乃成。以手按之、柔已、
有所結、氣歸之、津液溜之、邪氣中之、凝結、日以易甚、連以聚、
居爲昔瘤。○以手按之、堅、有所結、深中、骨氣因於骨、骨與氣、
并、日以益大、則爲骨疽。○有所結、中於肉、宗氣歸之、邪留而、
不去、有熱、則化爲膿、無熱、則爲肉疽。○凡此數氣者、其發無、
常處、而有常名也、

病能論黃帝問曰、人病胃脘癰者、診當何如、岐伯對曰、珍此者、
當候胃脉、其脉當沉細、沉細者、氣逆、逆者、人迎甚盛、甚盛、則、
熱、人迎者、胃脉也、逆而盛、則熱聚於胃口、而不行、故胃脘爲、

癰也。○帝曰：有病頸癰者，或石治之，或鍼灸治之，而皆愈，其真安在？岐伯曰：此同名異等者也。夫癰氣之息者，宜以鍼開除去之。夫氣盛血聚者，宜石而寫之。此所謂同病異治也。

脈要精微論：帝曰：諸癰腫筋攣骨痛，此病安生？岐伯曰：此寒氣之腫，八風之變也。帝曰：治之柰何？岐伯曰：此四時之病，以其勝治之，愈也。

厥論曰：少陽厥逆，機關不利，機關不利者，腰不可以行，項不可以顧，發腸癰不可治，驚者死。

寒熱篇：帝曰：寒熱瘰癧，在於頸腋者，皆何氣使然？岐伯曰：此皆