

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第三十八

霍亂門

霍亂統論

論曰霍亂者水穀之道路氣之所終始也因風冷或飲食傷胃致中焦不和則正氣不守而邪得以干揮霍之間便致撩亂故名霍亂蓋清濁相干於腸胃之間心痛則吐腹痛則利甚者吐利俱發其不吐不利俗謂之乾霍亂亦以冷氣暴爭於中而不得出也然脉必代者以氣不足也脉大能言者為可治若其脉微氣劣而不欲言者為難治

霍亂吐利

論曰霍亂吐利者以三焦氣不升降而清濁相干於腸胃間若先心痛則吐先腹痛則利心腹並痛則吐利俱發治此者當以中焦為本中焦既和則清濁自分而吐利止矣

治霍亂吐利不止藿香湯方

藿香

去梗半兩

白芷

縮沙

去皮各壹兩

丁香

壹分

右四味粗擣篩每服二錢匕水一中盞煎至六分去滓熱呷不計時候

治霍亂吐利不止正胃湯方

枇杷葉

拭去毛炙桂皮去粗

厚朴

去粗皮薑汁炙陳橘皮各半兩

右四味擣羅為粗末每服二錢匕水一盞入生薑三片煎至六分去滓熱服不計時候

治霍亂吐利白朮湯方

白朮

三兩

甘草

炙

附子

炮裂去皮臍

人參

各壹兩

桂皮

去粗

當歸

切焙

陳橘皮

去白焙各二兩

右七味剉如麻豆每服五錢匕煮小麥汁一盞半入竹葉一握生薑半分拍碎煎至八分去滓溫服日三

治霍亂吐利陳橘皮湯方

陳橘皮

去白焙二兩

甘草

炙壹兩

白朮

三兩

右三味粗擣篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片生薑半分小麥汁半盞煎至八分去滓溫服日三

治霍亂大豆飲方

大豆

香薷

蘆根

枇杷葉

拭去毛炙竹筴

前胡法蘆頭

陳橘皮去白焙

右七味等分咬咀每服五錢匕以水一盞半入生薑一分切煎取一盞去滓溫服

治霍亂吐利不止理中湯方

人參

白朮各三兩

甘草炙

乾薑炮各二兩

右四味粗擣篩每服五錢匕以水一盞半煎取一盞去滓溫服若胸滿腹痛吐下者加當歸二兩切焙厚朴二兩去粗皮薑汁炙透

治霍亂吐下虛冷厥逆腹痛乾嘔四順湯方

乾薑炮

甘草炙

人參各二兩

附子壹枚炮裂去皮臍

右四味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎取一盞去滓溫服一方下甚加龍骨二兩腹痛不止加當歸二兩切焙

治霍亂吐瀉不止芎藭飲方

芎藭切焙

高良薑

青橘皮去白焙各壹兩

白朮

甘草炙各半兩

右五味擣為粗末每服三錢匕以水一盞煎十數沸傾出放溫頓服

胡椒

萊豆各壹兩

人參壹分

右三味生擣羅為散每服三錢匕水一盞同煎五六沸去滓熱服

治食飲過傷霍亂吐瀉丁香丸方

丁香

白木

縮沙人

木香

肉豆蔻去皮

乾薑炮

桂去粗皮各三分

陳橘皮去白焙壹兩

枳殼去瓢炒

紅豆蔻去皮各半兩

右一十味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎生薑木瓜湯嚼下

治霍亂吐利心腹疼痛氣逆手足冷乾薑湯方

乾薑炮

甘草炙

桂去粗皮

附子炮裂去皮臍

草豆蔻去皮

肉豆蔻去殼麩裏煨

木香

高良薑炒

乾木瓜各半兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

霍亂嘔吐不止

論曰霍亂嘔吐不止者胃氣逆故也胃氣逆則氣上而不下故嘔吐不止也若上下升降陰陽和平而吐自止矣

治霍亂吐逆不定手足厥冷面青不樂青金散方

硫黃壹兩蓋子內鎔作汁

水銀壹兩二味結作沙子

右二味為細散每服一錢匕冷木瓜湯調下冷米飲亦得

治霍亂定嘔逆止心腹刺痛進飲食化痰益氣人參藿香湯方

藿香葉

厚朴去粗皮薑汁炙各二兩

人參

白茯苓去黑皮

乾薑炮

青橘皮湯浸去白焙

枇杷葉拭去毛

半夏為末生薑汁和作餅子暴乾各

壹兩

甘草炙三分

丁香半兩

草豆蔻去皮六枚

右一十一味粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓熱服不

拘時

治霍亂心腹痛嘔吐不止吳茱萸湯方

吳茱萸

湯浸焙炒乾薑壹兩

甘草炙壹兩半

右三味粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂吐逆不止煩悶香薷湯方

香薷

經霜後收陰乾壹斤

厚朴

去粗皮薑汁炙藟豆各半斤

右三味粗搗篩每服五錢匕水一盞酒半盞同煎至一盞去滓放冷併二服

未効再服

治下虛陰陽錯逆霍亂吐逆粥食不下正氣丹方

硫黃

蓋內鎔成
汁三分

半夏

為末薑汁
作餅暴乾

藿香葉

各壹
兩

水銀

入硫黃汁內
結沙壹分

附子

炮裂去皮
臍半兩

右五味為細末酒煮麴糊丸如梧桐子大以丹砂為衣每服二十九至三十

丸米飲下不拘時

治霍亂嘔吐不止水壺湯方

高良薑

對生

右一味粗擣篩每服三錢匕水一盞棗一枚去核煎至五分去滓用水沉冷

頓服立定

治冷熱氣不調霍亂吐逆不定腹脇脹滿高良薑湯方

高良薑

桂

去粗皮

人參

各壹兩

甘草

炙半兩

右四味粗擣篩每服三錢匕水一盞棗一枚去核煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂嘔吐不思飲食厚朴湯方

厚朴

去粗皮薑汁炙二兩

人參

白朮

各壹兩半

半夏

為末生薑汁
調作餅暴乾

陳橘皮

湯浸去白
焙各壹兩

右五味粗擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚去核煎至七分去滓
溫服不拘時

治一切霍亂嘔逆手足厥冷返魂湯方

鹽

壹分

生薑

洗切
壹兩

右二味用童子小便一椀半煎取一椀去滓分溫三服

治脾藏有積霍亂吐逆乾薑散方

乾薑

炮

訶梨勒

去核

白礬

燒汁
盡

丁香

甘草

炙各
半兩

右五味為細散每服一錢匕飯飲調下不拘時

治霍亂下焦熱氣逆上嘔吐不止名曰走哺人參湯方

人參

梔子人

姜

黃芩

去黑
心

知母

各壹
兩

白茯苓

去黑
皮

白朮

陳橘皮

湯浸去白
焙各壹兩半

石膏

碎壹
兩半

右九味粗擣篩每服三錢匕生薑三片水一盞煎至七分去滓溫服日三

治霍亂走哺嘔吐不止或噎塞心熱滿悶香豉湯方

豉

炒二
兩

生乾地黄

洗切
壹兩焙

白朮

二
兩

甘草

炙壹
兩

石膏

碎三兩

白茯苓

去皮壹兩半

右六味粗搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉十片葱白二寸煎至一盞去滓

溫服日三

治霍亂走嘔嘔吐不止噎塞滿悶芒消湯方

芒消

研別

生乾地黄

洗切焙

白朮

甘草

炙各兩

豉

炒

白茯苓

去黑皮各壹兩半

石膏

碎二兩

右七味粗搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉十片葱白二寸煎至一盞去滓

溫服日三

治霍亂吐嘔四汁煎方

生藕汁

生葛汁

木瓜汁

各壹合

生薑汁

銚

右四味銀器中慢火熬如錫每服兩匙頭許含化徐徐嚥津

治嘔吐煩悶及霍亂雞子湯方

人參

壹兩

右一味粗搗篩用水三盞煎至一盞半去滓重煎令沸投入雞子白一枚打

轉掠去沫頓服

治冷熱不調霍亂吐利宿食不消理中丸方

人參

白朮

高良薑各制

乾薑炮

桂去粗皮 各六兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心米飲下日再

治霍亂吐逆開胃和氣藿香散方

藿香葉

焙壹兩

訶梨勒皮

焙拾枚

人參

丁香

各半兩

糯米三石

石蓮心

二石

甘草炙分

右七味搗羅為散每服二錢匕煨和皮生薑一塊棗兩枚同煎濃湯調下食

前空心

治脾胃虛冷嘔逆霍亂瀉痢脹滿訶梨勒丸方

訶梨勒皮

五倍子

黃連去須

鍾乳粉

白礬

熬令汁枯 各四兩

縮沙蜜

去皮

厚朴

去粗皮生薑汁炙

當歸

焙切

酸石榴皮

炒

胡椒

樗根皮

剉各二兩半

乾薑

炮一兩半

乾木瓜

剉

烏梅肉

炒

橡實

微炒各伍兩

肉豆蔻

煨去殼 伍枚

陳橘皮

湯浸去白 焙二兩

右一十七味搗羅為末醋并艾葉汁煮麴糊和丸梧桐子大每服五十九棗

湯下空心食前日二服

治冷熱不調霍亂吐利宿食不消五味理中丸方

甘草

炙

人參

桂

去粗皮

乾薑

炮

高良薑

右五味各等分搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下空心食

前日再服

霍亂四逆

論曰四肢為諸陽之本陽氣之所通也霍亂吐利陽氣暴厥故四肢逆冷而脉微欲絕也古法治四逆專於通脉蓋榮衛行流氣道升降則手足自和逆者順矣治霍亂多寒手足冷厥脉絕四逆茱萸湯方

吳茱萸

洗炒當歸

切

桂

去粗皮

芍藥

各三兩

細辛

去苗葉

木通

剉

甘草

炙各二兩

右七味粗搗篩每服五錢匕生薑一棗大拍碎棗三枚擘破水一盞酒半盞

煎至八分去滓溫服

治霍亂嘔逆四肢厥冷煩悶流汗飲食不化心腹虛滿拘急短氣理中湯方

麥門冬

去心焙六兩

人參

白朮

各伍兩

乾薑

炮六兩

甘草

炙伍兩

附子

炮裂去皮臍

白茯苓

去黑皮各三兩

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至五分去滓溫服

治霍亂四逆吐下煩嘔轉筋肉冷汗出體痺氣急垂死音聲不出脉不通者附子湯方

附子

炮裂去皮臍

人參

厚朴

去粗皮生薑汁塗炙乾

白茯苓

去黑皮

甘草

炙

陳橘皮

去白炒

當歸

切焙

葛根

剉

桂

去粗皮

乾薑

炮各壹兩

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服隨藥吐者

更服勿止

治霍亂脉微欲絕或惡寒四肢拘急手足厥逆或吐利已定汗出而厥四逆不解通脉四逆湯方

甘草

炙二兩

附子

炮裂去皮臍二枚

乾薑

炮三兩

右三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服脉出即愈面色赤者加葱白二莖同煎腹痛去葱白加芍藥二兩嘔加生薑一分切同煎咽痛去芍藥加桔梗并人參二兩以吐利止為度

治霍亂吐利手足逆冷龍骨湯方

龍骨

碎白者

附子

炮裂去皮
臍各壹兩

乾薑

炮

甘草

炙

人參

各壹兩半

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治霍亂吐利已定汗出厥冷四肢拘急腹中痛不解脉欲絕桔梗湯方

桔梗

剉炒壹兩

甘草

炙

附子

炮裂去皮
臍各二兩

乾薑

炮壹兩

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治霍亂吐下虛冷厥逆乾薑湯方

乾薑

炮

甘草

炙

人參

各二兩

附子

炮裂去皮
臍壹枚

右四味咬咀如麻豆每服六錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服下甚者加龍

骨搗研二兩腹痛不止加當歸二兩切焙

霍亂欲死

論曰霍亂欲死者真氣厥而邪氣盛也或邪氣暴爭而未得吐利或吐利雖極而邪氣猶勝故真氣為之困乏其證煩悶痞滿四逆自汗脉微若絕者是也此由陰陽痞隔不得升降內經所謂出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危治霍亂吐利已止汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕通脉四逆湯方

附子

炮裂去皮臍壹枚

甘草

炙壹兩半

乾薑

炮三兩

右三味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服脉出即愈若面色赤者每服加葱白三寸腹中痛者每料加芍藥二兩仍去葱白嘔逆者每服加生薑五片咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩皆與方相應乃服之

仲景用通脉四逆加猪膽汁湯

湯方

人參

附子

炮裂去皮臍

厚朴

去粗皮生薑汁炙

白茯苓

去黑皮

甘草

炙

陳橘皮

湯浸去白焙

當歸

切焙

葛根

剉

乾薑

炮

桂

去粗皮各二兩

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時治霍亂吐利不止腹痛轉筋煩悶欲死赤茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

五味子

藿香葉

各半兩

黃耆

剉

當歸

切焙

白朮

炒各壹分

乾木瓜

人參

各壹兩

右八味粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂不吐不利氣脹滿悶欲絕者阿魏丸方

阿魏

研

青橘皮

湯浸去白焙各壹分

酸石榴皮

五味子

各半兩

陳麴

炒壹兩

右五味先擣後四味細羅為末與阿魏同研令勻用糯米糊丸如梧桐子大每服二十九丸溫熟水下如脚轉筋絕甚者研開溫熟水調下

治霍亂吐不止欲死生薑散方

生薑

二兩切焙

陳橘皮

湯浸去白焙

乾木瓜

各壹兩

右三味擣羅為散每服二錢匕溫水調下連三五服

治飲食傷飽取涼過度霍亂脹悶欲死上下不通雄雀糞散方

雄雀糞

二粒炒拾壹

右一味研細用煖酒半盞調服未効再服

治霍亂多寒手足厥冷脉絕吳茱萸湯方

吳茱萸

半升洗焙

當歸

切焙

桂

去粗皮

芍藥

各三分

細辛

葉去苗

木通

剉

甘草

炙各半兩

右七味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞酒半盞入生薑一棗大拍碎棗

二枚擘煎至一盞去滓溫服如氣痞加葛根半兩去棗

霍亂心腹痛

論曰霍亂者由脾胃虛弱客風冷之氣陰陽不和致水穀相并清濁莫分變亂於腸胃之間令人心胸煩懊悶亂不安因名霍亂然邪氣上干於陽絡則心痛而嘔吐下搏於陰經則腹痛而泄利故謂之霍亂心腹痛也

治霍亂吐逆心腹疼痛或便利數多冷熱不調訶梨勒丸方

訶梨勒皮

炒

陳橘皮

湯浸

去白

焙各壹兩

生薑

切炒

三分

甘草

炙半

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎生薑米飲下不計時候

治霍亂吐瀉心腹疼痛理中丸方

高良薑

剉

白朮

各壹兩

桂皮

去粗

甘草

炙各

半兩

下
右四味擣羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸不計時候濃煎橘皮湯化

治霍亂心腹痛煩嘔不止桂心湯方

桂

去粗皮

厚朴

去粗皮

塗生

薑汁炙四兩

枳實

去瓢

炒伍兩

右三味粗搗篩每服三錢匕生薑三片水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂中冷心腹痛當歸湯方

當歸

切焙三兩

桂皮去粗皮

甘草炙各二兩

右三味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂吐下虛煩不止心腹絞痛溫中湯方

人參

乾薑炮

白朮

甘草炙

當歸切焙

右五味等分粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂心腹痛薺苳飲方

薺苳

厚朴去粗皮塗生薑汁炙剉

知母焙

桔樓實

枳殼

去瓢麩炒

葛根剉

犀角鎔

桔梗炒

陳橘皮去白切焙

白茯苓

去黑皮

甘草炙

人參

藍實炒

黃芩去黑心各壹兩

右一十四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治霍亂宿食不消心腹疔痛抵聖散方

厚朴

去粗皮生薑汁塗炙四兩

白朮二兩

吳茱萸湯洗焙乾炒壹兩

高良薑

半兩

人參

白茯苓

去黑皮

甘草炙剉

木香