

吐藥論

凡病人往往有因嘔後而略覺安然者此醫者所爲參悟其理而設爲吐藥也但吐藥宜服於乍病之時蓋病初起爲患尙輕於此服之殆欲其身之津液流行而爲治病之一助也大抵吐藥入胃之後原胃之腦筋既與各臟之腦筋相連而胃則從而作嘔此所以能令全體發動也且吐藥服後則心窩頓覺不安面色轉白口津發多未幾作悶而全身胥覺軟弱此殆由肚下之肉筋與膈膜抽搐及胃亦隨而斂縮而各處則由是發力然後能將胃內之積物吐出也顧作嘔時而胃與各臟之津液一若逼之使出此蓋先令其血流行而津液自生多也所

以各臟或有積血而一經嘔後亦能使其舒散又況令各臟多發津液及外皮發表者實欲使血略少並散去血毒也 迨嘔

時則面色復紅手足覺煖渾身發汗而脈亦洪大 大約所吐

出者先屬食物繼屬酸水終屬苦水而取吐之原委不外如此

若論吐劑之妙復有五 一則胃內或有毒物及有食滯能

令吐出

抑或跌打脫離骨錢及小腸疝氣肉筋抽痛取吐之後合筋寬鬆並可將所患者納還原位西國未有藥之前多用是法

二則能平心平腦及

令各肉筋之力少減 三則令肝肺生液及肺管化痰外皮發

表 四則能斂臟腑血管而止血 五則各物或誤入氣喉服

是藥亦能吐出 且間有作嘔而大小便一併出者此取吐之

後所為殊覺困倦而奄奄欲睡也 然俟其醒後則病體亦略

覺自然。至若忌服吐藥亦不一。如心經有壞及身內大脈管或成跳血囊者不宜服。腦部有病如患頭風等症者不宜服。腹內發熱及小腸疝氣者不宜服。卽年高氣弱者亦勿服。若小兒十歲以下者服之無礙。蓋兒科吐劑或用依畢格或用鈹銻葡吐藥均合。而究以依畢格爲尤佳。凡服吐藥必待一刻或半點鐘久方能吐出。然或不應或吐少宜用雞翎探喉及多服煖水助嘔。不然則欲吐無物而胃必困苦。若業經嘔吐不宜多進食物。更有服藥之後而連吐不止者宜服鴉片酒或鴉片樟腦酒止嘔。抑或用布蘸煖水以鋪胃部或開調芥末以貼胃部亦妙。至服鹽類吐藥如鈹銻葡吐鹽等若已足

一服之數而服後猶不應卽宜改服別種或用草本吐藥尤妙
救服鴉片毒者雖應比常額略加然亦當小心弗可過服
且吐藥應服若干亦不宜遽作一服須分數次每刻一服爲妥
蓋恐嘔吐太甚故也 服吐藥亦有其候最妙莫如下午蓋吐
後疲倦恰合寢時也 要之吐藥之性或急或緩不一最捷者
銅礬養即膽礬 錐礬養及鉅錦葡吐藥是也若草本吐藥厥力稍緩
而惟悶逆殊甚用藥者宜分晰焉

阿甫磨啡

製法

磨啡精 一份

濃鹽強水 二十份

二味併入堅厚玻璃筒內

此筒形度要除藥外至少餘空四份乃合用

於是封固筒口外用合式

鐵筒套護螺絲扭緊筒口將鐵筒放油鐺內熬三點鐘要熱至

百度表之一百四五十度為止停冷取出玻璃筒打開加入清水

開淡些

再加入鎬雙炭養

器多

和勻俟其散墜底去盡上面

之水加入伊打酒化後加鹽強水數滴凝結又以沸水化之俟

其凝結仍以水少許化之再入鎬雙炭養後凝結之散乃阿甫

磨啡也用冷水快手洗過立即焙乾入樽貯好

形色

或白略灰不能結珠若溼時見天氣則變青色

溶化

水及伊打酒哥囉方俱能化

藥性

與麼啡及鴉片不同彼能甯睡止痛此則服後抽筋與服阿顛那唏拜阿相似甚至頭重眩困之患故或服或節入皮皆合作悶發嘔

用法

內服可用一釐之五份一射入皮可用一釐之十份

一

服驗

平人每服後五咪呢至二十咪呢則必嘔雖止

復作務將胃內所有盡嘔一空故小兒服此速見困憊但於血脈無涉吐時脈速止則脈靜其心脈無力者亦緣其人平素弱耳

論身熱雖不加而呼吸變常初則喘速漸至氣緊

欬絕 論腦部初見煩躁不久顫動終則痿痺抽筋僵厥不



但運動知覺各腦筋
如常無恙不同癱瘓

因藥力專行於腦脊根也

方論

此吐藥乃近年覈出製法精妙與各等吐藥用意不同
但凡迷蒙不醒大醉中毒一切不能服藥之候及平素最不
肯服藥之人遇應吐之症者以此藥開水節射入皮而嘔功
效最捷 若遇氣管發炎閉塞之症不能不嘔者用此雖能
令頑痰盡吐而元神必傷則用者不可不慎也

依畢格

產南亞美利加巴西麥西等國形如小菜高約一尺

樹身之蟠於地上者長約二尺采根入藥用根大如鵝翎管外
有厚皮而函木質皮外四週均有圓紋澀衣取皮研末色微黃

氣味

味苦辛而帶悶

此藥末研無臭研幼則自成臭味一

依畢格



種嗅之或氣逆噴嚏

溶化 火酒浸

及冷水泡均能提出其功力若沸

水泡煎反敗其功而且經光亦然

製樹根皮內函有淹微顛即依畢格

精之用法取出其功力比依畢格尤

峻此物無色無臭無味不能作珠清水難化火酒可溶若含以酸類則能作苦鹽彼藥肆所售者廢色略黃而不甚純淨也

考訂 大抵該淹微顛不能多服每服一釐之四份一或六份

之一便能作嘔若依畢格則作嘔不甚烈然亦必吐且吐後

並無困苦之累小孩及身弱者皆宜

功用

一發表

詳下文發表篇內

化痰

服法

每服三分至五分，開煖水一兩，分兩三次服，每刻一服。

可吐

方劑

一方 治胃弱能嘔瀉

依畢格末

三分

大黃末

三分

和勻加煖水作一次服，能嘔瀉，每用八釐至一分。

喫腸可補胃

一方

依畢格根

八錢 搗爛

車釐酒

二十安 士量

或用雙蒸酒亦可

入瓶浸七日，隨時攪動，濾淨此酒，能化痰發表，每服十滴。

至二十滴，若作吐藥，大人宜服。

三五

錢小兒宜服二十滴。

至六十滴。



一 方

依畢格末 二分

銀錫葡吐散 一釐

煖水調化分三四次每刻一服至嘔爲率由是再多飲煖水助嘔 患哮喘者當痰作時每服三分至作吐爲度若
在平時每朝服八釐連服一兩月庶可獲痊 久患咳症
每日服三四次每服 二 釐亦佳 彼肺內皮發炎而致
咳者當症乍起每半點鐘服半釐至一釐俟其嘔吐自可
去痰止咳 小兒傷風氣緊而致咳者亦服之良 久咳
內傷將此藥或調水或作丸服之均妙 胃不消化每朝
空心服二釐 若春秋二季作瘧及患熱症當初起時宜

先服此藥取吐吐後再服金鷄納霜如此則該症自易調

治痢症每朝空心服二釐晚間另服些鴉片酒甚效

患紅痢者宜先服鴉片酒藜免藪也次服此藥三分服後或

仍有嘔俟過十一二點鐘再服至不作嘔爲度凡紅痢初

起以此療之屢試屢驗

一方可止吐血鼻血及婦人經水太多

濃依畢格水二錢濃了葛水四錢

濃毛地黃水二錢
以上各藥水濃淡均有一定製法不得妄爲增減另詳

和勻每服三十滴至六十滴每三點鐘一服以血止

爲度濃依畢格水製法詳下文第 卷 篇

路卑利

此藥產自美國俗名土煙蓋因其入口與煙葉同烈

故名之耳而實非煙類也該樹高約尺許有壳內包數核美國田間類多叢生不須栽種大抵葉殼均堪入藥宜研末以作散藥性服後頓覺昏倦沉悶恍如吸煙致悶一般故此不宜過服過服能壞人蓋因其性酷烈恐致嘔吐非常

勸法

取吐每服八釐至分半若用以化痰治病每服葉末

二釐或四釐每日三四服

方劑

作藥酒方

此酒取吐去痰可治嘔喘

路卑利 二兩

淡火酒

二十安士即火酒與水各半便是

將淡火酒十五安士浸路卑利兩日用漏斗隔出其酒入

樽餘酒五安士亦全傾入樽內揼盡藥內之酒再濾隔要
得回原酒二十安士爲度如不足加些淡酒添足

功用 取吐服四錢 去痰每服十滴至三四十滴治

嘔喘每服十五滴至五分每兩三點鐘一服

芥末 此物中國西國皆有之

形色 西國分黑白二種黑者有油白者則否

氣味 未研無味研細則色黃而味苦辛以法榨去其油苦辣

略減黑者一種尤爲辛辣

藥性 服至一錢卽能作嘔

功用 胃不消化每服三分日三服 誤服鴉片者用此救之

頗驗並能引炎詳下文卷 第 篇

方劑

一方

芥末 四錢

牛奶 半斤

同煎服能調胃每日 三 服每服一茶盃

鈹銻葡吐散

製法

銻養末 三兩七錢
一分八釐

鈹葡酸散 四兩四錢六分二釐
宜再研至極幼

汽水 三十兩兩
水亦可

先將銻葡二散以少水研和如漿貯十二時久加入餘水同納
鐺內約煎一刻頻攪之濾淨取水俟冷凝珠將珠取出餘水入
鐺復煎去三分之二取起俟再結隨將前後珠和勻鋪在紙上

由是用軟紙提去水溼卽是藥也

形色 此珠無色而體有稜芒能過光露天氣則水耗散其珠

變爲不能過光之白散

氣味 味辛而澀悶以水化之則無味小兒易服

溶化 冷水十五倍可化一沸水兩三 倍能化一卽常酒亦能

化些須惟火酒全不能化 但以水化此藥久則恐變壞惟

加火酒五分之一則無此弊

功用 能止瀉發表散痰散熱平脈外敷亦能起粒釣炎

服法 發表化痰每一釐分十次至三次服 平脈每一釐分

三次或兩次服 作吐藥每服可用二 三釐

相反

酸類

蛤利類

蛤利合炭養酸所成之鹽

金類合

養氣鉛霜

沒石子酒

及醋斂藥

方劑

一方

取吐用

鈇銻葡吐散

五釐

白糖

一錢

清水

四兩

攪和分四次服每刻一服若既吐卽停服由是多飲暖水助嘔惟當胃部發炎則忌服也

一方 能令吐瀉熱症宜之

鈇銻葡吐散

三釐四

鎂礬養

八錢

清水

五兩

和勻每點鐘服八錢

又方

嘔吐發表

鉅錒葡吐散

一釐七至二釐半

依畢格散

二分

和勻分四次沸水開服每一刻服一次

方論

熱症初發脈洪大服少許能令脈平細發表出汗跌

打脫離骨鉸在患者力大患痛不能送還原位可服此藥

些須令患者卽行作吐而身體略爲軟弱由是醫者卽乘

此時而用力送回原骨之位可也 凡脈浮身熱口乾頭

重不寐服他藥而弗應者宜服此藥若服後腹痛而致嘔

吐太甚可服鴉片散或鴉片酒及甘菊花各潤物解之

老人孕婦及虛弱之輩忌用此藥且凡有小腸疝氣腦內