

合病併病汗下吐後不解 合併病 發汗後不解 下後不解 汗吐下後不解

喘

短氣

身重

難轉側

面赤

壞病

振戰慄

筋惕肉瞤

叉手冒心

驚悸

驚

悸

藏結與結胸痞氣小異

結胸

痞

心下滿

心痛心下痛

煩

煩躁

懊懷

咳

直視

鬱冒

不能言

鼻鼾鼻鳴

準繩寒科

傷寒證治準繩帙之五

金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

合病併病汗下吐後等病

表裏合病必下利汗太陽與陽明合病必自下利和葛根湯主之不下利但嘔者葛根加半夏湯主之


陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之陽明與少陽合病必下利脉滑而數者有宿

食也當下之宜大承氣湯

俱詳下利

併病三陽併病太陽出汗不徹因轉屬陽明自汗不惡寒汗太陽證不罷面赤躁煩短氣者更發汗則愈

下二陽



併病太陽證罷潮熱譫語者下之則愈論見太陽與

少陽併病項強眩冒心下鞭如結胃者刺胃脘肝脘論見

項強論見當下之宜大承氣湯

太陽與少陽合病必下利和散而後下

太陽與少陽合病下利者與黃芩湯

太陽與少陽合病下利者與黃芩湯

太陽與少陽合病下利者與黃芩湯

合藥治諸病不可對症

金匱玉函堂

劉宗素

劉宗素

合併病

合病兩經俱病併則一經證罷而併歸于一經也太陽與陽明合病有三證其邪湊有淺深之殊故用藥有汗下和解之異治見各條三陽合病有二證其一證用白虎湯其一證無治法後人用小柴胡白虎之類蓋此二證俱有三陽之候故不可汗下二陽併病有二證表未解者汗之表已解有裏證者下之太陽與少陽併病有三證其一由誤下以致心下鞅成結胸其一項強如柔瘕狀心下鞅如結胸刺肺俞肝俞慎勿發汗汗則譫語不止宜刺期門其一心下鞅項強而眩者刺大椎肺俞

不宜下也

合病

汗

太陽與陽明合病胸滿而喘者不可下麻黃湯

太陽

解肌

與陽明合病自下利葛根湯不下利但嘔者葛根

加半夏

或曰

由太陽表未罷而陽明裏又至兩陽合病

嘔者邪氣

雖攻裏未入于胃但氣逆而嘔故加半夏以

止嘔逆

浮大太陽受病也

長者陽明也

頭腰太陽也肌目鼻陽明也

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加

半夏湯

或曰此表實裏虛熱入攻裏故自下利若兼痰飲則嘔也

陽明少陽合病必下利脉長者為順脉弦者為負負者

尅賊也脉滑而數者有宿食大承氣湯

或曰陽明土少

陽未其脉弦者

木乘土也不弦者不負也負者必死
苦渴而數者有宿食非負也故宜下

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢讖語遺尿
不可汗下若自汗者白虎湯 三陽合病脉浮大見關

上但欲眠目合則汗小柴胡白虎湯 或曰此二證俱有三陽之證此不可

汗下

解肌

併病二陽併病太陽初得時汗之不徹轉屬陽明續自

微汗不惡寒大柴胡湯 若太陽證不罷不可下可小

發汗設面色緣緣正赤陽氣怫鬱在表汗之不徹其人

煩躁短氣不知痛處宜更發汗則愈葛根湯 下二陽併

病太陽證罷潮熱手足汗大便難讖語者大承氣湯

太陽少陽併病反下之成結胸心下鞭下利不止水漿不下心煩生薑瀉心湯小陷胸湯刺太陽與少陽併項強痛或眩冒時如結胸心下痞鞭刺大椎第一間肺俞肝俞不可汗汗則讎語不止刺期門 太陽少陽併病心下鞭項強而眩者刺大椎肺俞慎勿下

趙愚嘗疑合病併病之難明也久矣姑釋之蓋合病者二陽經或三經同受病病之不傳者也併病者一陽經先受病又過一經病之傳者也且如太陽陽明併病一證若併而未盡是傳未過尚有表證仲景所謂太陽證不罷面色赤陽氣怫鬱在表不得越煩躁

氣短是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是謂傳
過仲景所謂太陽證罷潮熱手足汗出大便鞭而譫
語者是也法當下之以承氣湯是知傳則入府不傳
則不入府所以仲景論太陽陽明合病止出三證如
前太陽陽明併病則言其有傳變如此也又如陽經
互相合病皆自下利仲景於太陽陽明合病則主用
葛根湯太陽少陽合病主以黃芩湯少陽陽明合病
主以承氣湯至於太陽少陽併病其證頭項強痛眩
冒如結胸心下痞鞭當刺大椎肺俞肝俞不可汗下
太陽陽明併病已見上論但三陽合病仲景無背惡

傷寒傳病 卷五
寒語句雖別有口燥渴心煩背微惡寒者乃屬太陽
證而非三陽合病也活人言三陽合病背惡寒者非
也三陽若與三陰合病卽是兩感所以三陰無合病
例也

張夫併者乃催併督併之義非吞併就之理然催併
係去聲吞併之併乃上聲史記曰始皇初併天下卽
此理也夫併之理乃前病未解後病已至有逼相併
之義故曰併病也經曰太陽與少陽併病頭項強痛
或眩冒云云如果併作一家則仲景不具兩經之證
而言也其非併字明矣

又曰或云三陽合病有太陽陽明有正陽陽明有少
陽陽明似乎重出予曰各有所指不過表裏之分耳
夫三陽合病在表三陽陽明病在裏事在兩途卽非
重出在表者宜解散以痊安在裏者非攻下則不可
然表裏證治迥各不同惟編目有似乎重出

然其與前不同者蓋曰其出天下之
重出谷其音宜顯顯以爲安其與昔非也下照不
夫三國合海其音三國則其音與昔兩發則其
則其音與昔重出字曰谷其音則不與昔與之衣耳
又曰其音三國合海其音三國則其音五國則其音少

發汗後不解
傷寒初感始以太陽故以發汗爲首汗行如雨散雲收
其病乃愈倘汗行不解者或表邪未盡或熱邪傳裏或
邪氣乘虛內客故有汗後而不解者

發汗病不解反惡寒虛也芍藥甘草附子湯
發熱汗不解仍發熱心下悸振振欲擗地真武湯

汗後身疼痛脉沉者桂枝加芍藥人參新加湯
太陽

發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢拘急難以屈伸

桂枝加附子湯
大汗出熱不去內拘急四肢疼下利

惡寒四逆湯
發汗過多冒心心下悸欲得按桂枝甘

草湯汗後腹脹滿厚朴生薑人參湯 太陽病發汗
後大汗出胃中乾燥不得眠欲飲水者少少與之則愈
若脉浮小便不利微熱消渴者五苓散 發汗已脉浮
數煩渴五苓散 服桂枝湯脉洪大與桂枝湯如前法
若形如瘧日再發汗出必解麻黃湯 發熱汗出不解
心中痞鞭嘔吐不和大柴胡湯 服桂枝湯大汗出大
煩渴不解脉洪大白虎加人參湯 發汗後臍下悸欲
作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯 發汗後不惡寒但惡
熱蒸蒸發熱者實也調胃承氣湯 發汗後不可更行
桂枝汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草湯

下後不解

去傷寒之邪不過汗吐下之三法也三法得當病勢易衰則愈矣三法失宜病勢危惡傳變不已誠可慮也況發汗吐下後邪氣乘虛而未散或壅塞而未盡則當量其虛實以治之先賢謂知邪氣之虛實發汗吐下之不差溫補針艾之適當則萬全之功可得矣若過經者以六日傳六經七日爲一候若不愈十三日乃再傳經盡所以謂之過經也傷寒五六日大下後身熱不去心中結痛未欲解也梔子豉湯下後心煩腹滿臥起不安梔子厚朴湯陽明

病下之心中懊憹而煩梔子豉湯若有燥屎者大承氣湯
太陽病下後脉促胸滿桂枝去芍藥湯微惡寒者
去芍藥方中加附子醫以丸藥下之身熱不去微煩梔
子乾薑湯 太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促
者表未解喘而汗出者葛根黃連黃芩湯 服桂枝湯
或下之仍頭痛項強無汗翕翕發熱心下滿微痛小便
不利桂枝去桂加茯苓白朮湯 太陽病過經十餘日
二三下之嘔不止心中微煩大柴胡湯下之 六七日
大下後寸脉沉而遲手足厥逆下利脉不至咽喉不利
吐膿血瀉利不止爲難治麻黃升麻湯

汗吐下後不解

五六日已發汗復下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔
但頭汗出往來寒熱心煩爲未解柴胡桂薑湯 太陽

汗吐下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭石湯

太陽先發汗不解而復下之脉浮者則知病在外當須
解外桂枝湯 發汗若下之病仍不解煩躁不得眠茯

苓四逆湯 大汗若大利而厥者四逆湯 下後復發

汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉
微身無大熱乾薑附子湯 下後復發汗必振寒脉微
細此內外俱虛也 傷寒本寒後復吐下之食入口卽

吐乾薑黃連黃芩人參湯 發汗吐下後虛煩不得眠
劇者反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯 發汗若下之煩
熱胸中窒梔子豉湯 吐下後不大便五六日至十餘
日日晡發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀循衣摸床脉弦
者生濇者死但發熱譫語者大承氣湯 吐下後腹脹
滿邪熱入胃也調胃承氣湯 太陽吐下後微煩小便
數大便鞭小承氣湯 吐下後七八日不解結熱在裏
表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥煩欲飲水白虎加
人參湯 吐下後心下逆滿氣上衝胸頭眩脉沉緊發
汗則動經身爲振搖茯苓桂枝白朮甘草湯