

醫學摘要

外科

醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑

外科
卷十四之十六

御纂醫宗金鑑卷十一

編輯外科心法要訣

脛部

三里發

三里發腫牛眼形膝眼之下冷痛凝勞力傷筋兼胃熱腫色青黑紫血膿〔註〕此證生膝眼下三寸外側前廉兩筋間初腫形如牛眼拘急冷疼由勞力傷筋胃熱凝結而成漸增腫痛其色青黑潰出紫血次出稀膿內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

三里發生膝眼下三寸初生如牛眼其色青黑左右皆同



三里發圖

腓脰發

腓脰發在小腿肚憎寒煩躁積熱成癰腫痛潰膿血吉漫腫平塌清水凶計
於腓脰卽小腿肚也由腎水不足膀胱積熱凝結而成古方云不治若癰赤高腫
潰出正膿而兼血者吉爲順或漫腫平塌紫暗譽痛潰出清水者凶爲逆初服仙方
命飲潰服八珍湯氣血虛者服十全大補湯下虛者以桂附地黃丸補之外治法同癰
疽潰瘍門

仙方活命飲

見腫門

八珍湯

十全大補湯

俱見
潰瘍門

桂附地黃丸

見面
部

腓脰發生腿肚正中左右皆同

腓脰發圖



黃鱖癰

黃鱖癰生腿肚旁疼痛硬腫若鱖長肝脾溼熱微紅色順出稠膿逆敗漿〔註〕此證生在小腿肚裏側疼痛硬腫長有數寸形如泥鱖其色微紅由肝脾二經溼熱凝結而成應期潰破出稠膿者爲順若出污水敗漿者屬逆初服五香流氣飲其次內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

黃

鱖

癰

吉

利

青香散

黃鱖癰生腿肚裏側長數寸紅腫形如泥鱖左右皆同



青香

小茴香

溫蠶

炒

羌活

獨活

連翹去心

栝萎仁

各一錢

藿香

五錢

丁香

二錢

木香

沉香

甘草

錢一

分爲十劑水煎隨病上下服

〔方歌〕五香流氣治黃鍼流注結核也能瘳丁木茴沉殭藿草銀花羌獨翹栝萎

青

青蛇毒生腿肚之下長二三寸結腫紫塊頭大尾細左右皆同

蛇

毒



青蛇毒

青蛇毒生腿肚下形長三寸紫塊殭腎與膀胱溼熱結急鍼蛇頭血出良〔註〕此證又名青蛇便生於小腿肚之下形長二三寸結腫紫塊殭硬憎寒壯熱大痛不食由腎經素虛膀胱溼熱下注而成蛇頭向下者毒輕而淺急刺蛇頭一半寸出紫黑血隨鍼孔

搽拔疔散外敷離宮錠內服仙方活命飲加黃蘗牛膝木瓜亦有蛇頭向上者毒深而
惡急刺蛇頭一二寸出紫黑血鍼孔用白降丹細條插入五六分外貼巴膏餘腫敷太
乙紫金錠內服麥靈丹俟毒減退次服仙方活命飲調和之若毒入腹嘔吐腹脹神昏
脈躁俱爲逆證

拔疔散

見齒部

離宮錠

仙方活命飲

麥靈丹

俱見腫門

白降丹

接

接骨發生脛骨之下足後跟相接處初如胡桃腫似物打磕碰之狀兩足皆同一

骨發圖



太乙紫金錠

見胸腹部

巴膏

白降丹

接骨發

接骨發如核桃形腿肚之下硬脹疼色紅漫腫宜速潰遲損筋脈缺踵行〔註〕此證生於腿肚之下接骨之上脛骨與足後跟骨相接處故名接骨發屬膀胱經溼熱凝結而成初如核桃其硬如物打磕碰之狀急脹微疼色紅漫腫膿宜速潰遲則膿毒損筋脈既傷腿缺踵行踵行者不能全足踐地惟恃足指著力而行也始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

附

附陰疽生內踝之上三寸紅腫如雞卵左右皆同



陰疽圖

附陰疽

附陰疽發內踝上初如紅粟日增疼堅硬赤腫漸如卵三陰交會溼熱凝〔註〕此證生於內踝骨之上三寸初如紅粟疼痛日增疼堅硬赤腫漸如雞卵係三陰交會溼熱積聚而成始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門但三陰交係純陰之穴收斂遲緩調養不可不慎

內 跛 痘 外 跛 痘 圖



內踝疽 外踝疽

內外踝疽溼寒成血澀氣滯阻於經三陽外側三陰裏初用宣通蒜灸靈〔註〕此二證生兩足踝近腕之處在內踝者名走緩又名鞋帶疽在外踝者名脚拐毒蓋內踝骨屬三陰經脈絡也外踝骨屬三陽經脈絡也俱由溼寒下注血澀氣阻而成其堅硬漫腫皮色不變時時隱痛難於行立者初服瘡科流氣飲加牛膝木瓜防己以宣通之外用蒜片灸法以消之發三陰經者服內託黃耆湯發三陽經者服內託羌活湯若虛弱欲作膿跳痛無時者俱服十全大補湯外敷烏龍膏其腫潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

瘡科流氣飲

見 潤門 背部
發

內託黃耆湯

見 潤門 腹部

內託羌活湯

見 馬齒門 腹部

十全大補湯

見 潤門

烏龍膏

見 潤門

穿踝疽

穿踝疽由脾溼寒裏發串外踝骨間有頭屬陽陰悶腫潰出清水廢疾纏〔註〕此證由脾經溼寒下注血澀氣阻而成先從裏踝骨發起串及外踝致令裏外通腫以有頭爲陽易破若惟悶腫無頭爲陰難潰其證初起寒熱往來有紅暈兼有熱也宜服荆防敗毒散皮色不變者服萬靈丹其餘腫潰治法俱同內外二踝疽若潰出清水或投方不應纏綿日久者必成廢疾難治

荆防敗毒散

見 潤門 腹部

萬靈丹

見 潤門 腹部

穿踝疽圖



溼毒流注

附
藤瓜

溼毒流注腿脛生頂如牛眼漫腫形紫輕黑重膿水漬寒溼暑熱在膝凝(註)此證生於腿脛流行不定或發一二處瘡頂形似牛眼根脚漫腫輕則色紫重則色黑潰破膿水浸漬好肉破爛日久不斂由暴風疾雨寒溼暑火侵在膝理而肌肉爲病也初覺急服防風通聖散加木瓜牛膝防己蒼朮消之若腿脛至晚發熱者宜服當歸拈痛湯加牛膝外治初搽三妙散腫痛全消換搽輕粉散斂之即效若遠脛而發卽名瓜藤纏結核數枚日久腫痛腐爛不已亦屬溼熱下注而成治法同前

輕粉散

輕粉

五一
錢各三

乳香

「方歌」輕粉黃丹蘖陀僧末茶乳麝共研成溼毒流注臍瘡證化腐除溼又止疼

防風通聖散

見禿頭部

黃丹

麝香

五分

黃藥

密陀僧

高末茶

當歸拈痛湯

見腿遊風部

三妙散

見腹癰部



二證初如牛眼次則漫腫色紫者輕黑者重左右同
溼毒流注生脛骨一二箇者是也

腎氣遊風

腎氣遊風腿肚生紅腫如雲火烘疼證由腎火蘊於內膀胱氣滯外受風〔註〕此證多生於腎虛之人腿肚紅腫形如雲片遊走不定痛如火烘由腎火內蘊外受風邪膀胱氣滯而成也初服紫蘇流氣飲次服檳榔丸外用豆腐研調黃藥末貼敷之甚效

腎

腎氣遊風生於腿脛腫暈如雲片

氣 遊 風



紫蘇流氣飲

紫蘇

陳皮

黃藥

川芎

木瓜

厚朴

薑炒

檳榔

白芷

香附

獨活

米泔水

蒼朮

枳殼
鈎炒

等分薑三片棗一枚水煎服

〔方歌〕紫蘇流氣蘡瓜榔香附陳芎厚芷蒼烏藥荆防甘獨枳腎氣遊風服最昌
檳榔丸

檳榔

枳殼

鈎各二
炒兩

木瓜

五
錢兩

木香

一
兩

大黃

四
兩

共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸空心白滾湯送下亦可

〔方歌〕檳榔枳殼木瓜痛木香大黃煉蜜丸腎氣遊風紅腫痛空心水送自然痊

臘瘡

臘瘡當分內外廉外廉易治內難痊外屬三陽溼熱結內屬三陰虛熱纏法宜搜風除
溼熱外貼三香夾紙餳〔註〕此證生在兩脰內外廉骨外廉屬足三陽經溼熱結聚早
治易於見效內廉屬三陰有溼兼血分虛熱而成更兼廉骨皮肉澆薄難得見效極其
綿纏初發先癢後痛紅腫成片破津紫水新起宜貼三香膏色紫貼夾紙膏日久瘡色
紫黑貼解毒紫金膏又年久頑臘瘡皮烏黑下陷臭穢不堪者用蜈蚣餳法去風毒化
瘀腐蓋貼黃蠟膏漸效初服黃耆丸日久者服四生丸下元虛冷者宜虎潛丸常服甚
效但腿脰在至陰之下生瘡者當戒勞動發物其證可愈否則難痊

三香膏

輕粉

乳香

松香各等分

共爲末香油調稠用夾紙一面以鍼密刺細孔將藥夾擦紙內先以蔥湯洗淨患處
將藥紙有鍼孔一面對瘡貼之三日一換

〔方歌〕三香輕粉乳松香研末油調紙內藏蔥湯洗患方貼藥初起瞼瘡用此良
夾紙膏

黃丹 炒

輕粉

兒茶

沒藥

雄黃

血竭

五倍子 炒

銀朱

枯礬

各等分

共爲末量瘡大小翦油紙二張夾藥於內紙周圍用麵糊黏住紙上用鍼刺孔先將
瘡口用蔥椒煎湯洗淨拭乾然後貼上以帛縛之三日一洗再換新藥貼之
〔方歌〕夾紙膏貼瞼瘡破黃丹輕粉兒茶沒雄黃竭倍銀朱礬油紙夾貼腐可脫
解毒紫金膏

明淨松香

皂礬

各一
赤
觔

共研極細末香油調稠先用蔥艾甘草煎湯洗淨患處再擦此藥油紙蓋住以軟布
紮緊三日一換此藥又治楊梅結毒腐爛作臭膿水淋漓用之甚效

〔方歌〕解毒紫金膜瘡爛明淨松香皂礬
二味研末香油調蔥艾草湯先洗患

蜈蚣餚

蜈蚣

甘草

獨活

白芷

錢
一

桐油二兩將藥煎滾

先以米泔水洗淨臙瘡水和白麵作圈圍在瘡之四邊勿令洩氣將腿放平以茶匙挑油漸漸乘熱加滿待油溫取下已後風毒自散腐肉漸脫其功甚速

〔方歌〕蜈蚣錢治久臙瘡皮黑下陷臭難當桐油煎草獨活芷白麵圈瘡油燙強

黃蠟膏

血竭

赤石脂

煅

龍骨

各三錢
煅

一團煤枯去滓再入黃蠟一兩白膠香三錢溶化盡離火下血竭等末攪勻候冷磁罐盛之用時捲作薄片貼瘡上絹帛縛定三日後翻過貼之

〔方歌〕黃蠟血餘竭白膠石脂龍骨入油調蜈蚣錢後此膏蓋肌肉能生痛自消

臙

瘡

圖

臙瘡生兩腿脰之裏外廉骨



黃耆丸

黃耆

川烏頭

炮去皮弦去

赤小豆

蒺藜

炒去刺

地龍

去土炒

川棟子

鹽水泡去核

茴香

炒去

防風

兩各一

烏藥

五錢去皮

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒送下鹽湯亦可婦人用醋煎滾候溫送下

四生丸

地龍

炒去

白附子

殭蠶

炒去

草烏

去皮尖炮去

五靈脂

各等分

右爲細末米糊爲丸如梧桐子大每服三四十丸食前茶酒任下

〔方歌〕四生臘瘡久纏綿骨節多疼舉動難地龍白附殭蠶炒草烏靈脂米糊丸虎潛丸

敗龜板

鹽水四兩去皮炒

知母

黃藥

二味鹽水炒去

熟地

各三兩去皮

牛膝

酒蒸去

白芍

酒炒去皮

陳皮

鹽水各二兩潤去皮

瑣陽

酒潤去皮

當歸

錢酒洗各一兩去皮

虎脰骨

一兩酥炙去皮

共研末羯羊肉酒煮爛搗膏和入藥末內爲丸如梧桐子大每服三錢空心淡鹽湯送下冬月加乾薑一兩

〔方歌〕虎潛丸療筋骨痿下元虛冷精血虧龜板瑣陽膝虎脰知藥芍陳熟地歸