

临證指南

卷四



臨證指南醫案目

卷四

積聚

痞

噎膈

噫噎

嘔吐

吐衄

不食

腸痺



便閉 肺痺 胸痺 哮喘 呃逆 疝



臨證指南醫案卷四

四月 王荅溪漫士臨本

許關李大膽附圖

古吳葉桂天士先生著

錫山鄒錫琬滋九全校

華旦玉堂

積聚

才犯
土虛
中挾
滯

嘔、怒、強、食、肝、木、犯、土、腹、痛、突、如、有、形、緩、則、泯、然、無、跡、
氣、下、鳴、響、皆、木、火、餘、威、乃、癰、疽、之、屬、攻、伐、消、導、必、變、腹、
滿、以、虛、中、挾、滯、最、難、速、功、近、日、痛、瀉、恐、延、秋、痢、

丁香

厚朴

茯苓

炒白芍

廣皮

煨益智仁

又

下午倦甚暮夜痛發陽微陰沉乃陽用溫通陽明法

瘧發神

人參

吳萸

半夏

薑汁

茯苓

炒白芍

又

照前方去白芍加川棟仕螞

無此論

脾胃

白

四瘕久留結聚血分成形仲景有緩攻通絡方法可

傷氣

宗但瘕母必在脇下以少陽厥陰表裏為病今脈弦太

成瘕

而色黃滯腹大青筋皆露頸脈震動總是脾胃受傷積

聚內起氣分受病痞滿勢成與瘕母邪結血分又屬兩

途經年病久正氣已亡觀東垣五積必疎補兩施並緩



南京中醫藥大學圖書館藏

攻為宜

生於朮

雞肫皮

川連

厚朴

新會皮

薑渣

水法丸

氣滯
濕熱
腑聚

馬三

病後食物失和腸中變化傳導失職氣滯釀成鬱而

成熱六腑滯闕為之聚昔潔古東垣輩於腸胃宿病每
取丸劑緩攻當倣之

川連

蘆薈

不切
箸葉
上炙

雞肫皮

不落水去垢
新瓦上炙脆

煨木香

小青皮

萊菔子

南山查

紫厚朴

蒸餅為小丸

濕熱
食滯

陳十濕勝脾胃食物不化向有聚積腸腑不通熱氣固鬱

當進和中忌口勿勞不致變病。

黃芩

枳實

廣皮

萊菔子

白芍

白朮

蒼朮

雞肫皮

水泛丸

痰凝脈絡

吳三

右脇有形高突按之無痛此屬癥痞非若氣聚凝痰

難以推求然病久僅阻在脈須佐針刺宜通正在伏天

宜商

眞蛤粉

白芥子

瓜蒌皮

黑梔皮

半夏

鬱金

橘紅

薑皮

脈絡凝滯

曹

著而不移是爲陰邪聚絡診脈弦緩難以互積氣

攻治大旨以辛溫入血絡治之。

當歸鬚

延胡

官桂

橘核

韭白

主三騎射馳驟寒暑勞形皆令陽氣受傷三年來右胸脇
形高微突初病張痛無形久則形堅似梗是初爲氣結
在經久則血傷入絡蓋經絡系於臟腑外廓猶堪勉強
支撐但氣鈍血滯日漸瘀痺而延癥瘕怒勞努力氣血
交亂病必旋發故寒溫消刻理氣逐血總之未能講究
絡病工夫考仲蠶於勞傷血痺諸法其通絡方法每取
蟲蟻迅速飛走諸靈俾飛者升走者降血無凝著氣可
宣通與攻積除堅徒入臟腑者有間錄法備參末議

蜚蠊蟲

麝蟲

當歸鬚

桃仁

川鬱金

川芎

生香附

煨木香

生牡蠣

夏枯草

用大酒麴末二兩加水稀糊丸無灰酒送三錢

洛陽書有伏梁

伏梁

伏梁病在絡日後當血凝之慮脈數左大是其徵也

厚朴 一錢

青皮 八分

當歸 一錢

鬱金 一錢

益母草 三錢

茯苓 一錢

澤瀉 一錢

某

脈數堅伏梁病在絡宜氣血分消

桃仁 三錢炒研

鬱金 一錢

菴蔚子 一錢

枳實 七分

厚朴 一錢

茯苓 二錢

通草 五分

自難經分出積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六

腑所成後巢氏病源另位癥瘕之名以不動者為癥

積聚之症
各殊治法
亦迥別案
中皆泛之
方治積聚
之法未及
皆分之一
學者宜廣
求之

動者為痕。究之亦即難經積聚之意也。前賢有「積聚者就其肯膜結聚之處以經脈所過部分屬腑者為陰。陰主靜。靜則堅而不移。屬腑者為陽。陽主動。動則移而不定。故是案中又從而悟出云。著而不移是為陰。邪聚絡大旨以辛溫入血絡治之。蓋陰主靜。不移即主靜之根。所以為陰也。可容不移之陰邪者。必無陽動之氣。以旋運之。而必有陰靜之血以倚伏之。所以必藉體陰用陽之品。方能入陰出陽。以施其辛散溫通之力也。又云。初為氣結在經。久則血傷入絡。輒仗蠕動之物。鬆透病根。是又先生化裁之妙於

古人書引伸觸類而得。若夫蒼朮之去執滯芥胎之
豁疑痰。不過爲先生用古處也。案中積症第見伏邪
不能盡備。然宋時諸賢於五積九積治法。誠在善
者。頗多太略。消補兼施。并以所惡者攻。所喜者誘。而
業醫者自當知之稔也。姚亦陶

瘥

痰熱
內閉
宋

前議辛潤下氣以治肺痺謂上焦不行則下脘不通
古稱痞悶都屬氣分之鬱也兩番大便胸次稍舒而水
為全爽此豈有形之滯乃氣鬱必熱陳腐粘凝膠聚故
脘腹熱氣下注隱然微痛法當用仲景梔子豉湯解其
陳腐鬱熱此方不治痰替以另進白金丸一錢蓋熱必生痰氣阻痰
滯一湯一丸以有形無形之各異也

黑山梔

香豉

鬱金

杏仁

桃仁

瓜蒌皮

降香

另付白金丸五錢

此所云不
 與藥為中
 言說也近
 曰醫者之
 藥一概俱
 存天下遂
 無枉死之
 人矣

熱邪
 裏結

孫

寒熱由四末以擾胃。非藥從口入以擾胃。邪熱津液。

五膠成痰氣不展舒。阻痺腕中。治法不但攻病前議。停藥欲謬藥氣盡病自退避三舍耳。

人參

川連

鹽水炒

枳實

半夏

鬱金

石菖蒲

某

脈不清神煩倦中痞惡心。乃熱邪裏結進瀉心法。

炒半夏

黃芩

黃連

乾薑

枳實

杏仁

劉

熱氣痞結。非因食滯胃汁消燦。舌乾便難苦辛開氣。

酸苦泄熱是治法矣。



氣閉
化熱
顧

川連

橘紅

生薑

烏梅

人參

生芍白

枳實

氣閉久則氣結不飢不食不大便

當用酒制

川貝母

白蔻仁

鬱金

杏仁

金銀花

萊豆殼

又氣結必化熱乃無形之病故徒補無益

鮮首領草

川斛

甜杏仁

川貝母

麻仁

何三煩勞之人衛氣少固露露雨濕傷其流行清肅瘡瘕

外涸腕脇反痺乃經脈為病無關腑臟

鈎藤

生白朮

鬱金

白蔻仁



南京中医药大学图书馆藏

陰人熱厥邪

桑葉

橘紅

又氣室熱鬱。仍治上可以通痺。

杏仁

鬱金

香附

瓜蒌皮

黑山梔

蘇梗

周

寒熱嘔吐。恍惚。目利。是暑濕熱外因。因嘔。氣動肝邪。

氣入於厥陰。胸滿腹脹。消渴。議以開痞方法。

瀉心湯去參甘加枳實白芍

伊

因驚而得邪。遂入肝。故厥後熱神識昏狂。視得面青。

舌白微嘔渴。飲胸次按之而痛。此屬痞結。乃在表之症。

宗仲景以瀉心湯為法。



暑濕
伏邪
夾食

川連

半夏

乾薑

黃芩

人參

枳實

尤

面垢油亮目黃黃頭脹如束胸脘痞悶此暑濕熱氣
內伏因勞倦正氣泄越而發既非暴受風寒發散取汗
徒傷陽氣按脈形濡滑豈是表症凡傷寒必究六經伏
氣須明三焦論症參脈壯年已非有餘之質當以勞倦
傷伏邪例診治

滑石

黃芩

厚朴

醋炒半夏

杏仁

薏仁

竹葉

又胸痞自利狀如結胸夫食滯在胃而胸中清氣悉為



濕濁阻遏與食滯兩途此清解三焦卻邪湯藥兼進保

和丸消導

合仲景法

淡黃芩

川連

淡乾薑

厚朴

醋炒半夏

鬱金

白蔻仁

滑石

送保和丸三錢

暑邪
阻氣

談氏

胸痞不饑熱不止舌白而渴此暑邪未盡仍清氣分

鮮竹茹

淡黃芩

知母

橘紅鹽水炒

滑石

桔梗

枳殼汁

鬱金汁

某四一惡寒泄瀉悉減胸脘仍悶餘暑未盡胃氣未甦故耳

大麥仁四錢

佩蘭葉三錢

新會皮一錢

半夏炒一錢半

金斛一錢半

茯苓三錢

