

張氏醫通

卷三



張氏醫通卷之二

清

長洲石頑張

璐路玉父纂述

男

登誕先

叅訂

倬飛疇

日本

大泉長菴前田安宅子仁

再訂

男

典子守

諸傷門

傷寒

傷寒雜病。世分兩途。傷寒以攻邪為務。雜病以調養為先。則知工傷寒者。胸中執一汗下和解之法。別無顧慮正氣之念矣。雜病家寧不有攻邪之證耶。祇緣膠執已見。不能圓通。以致傷寒一切虛證壞證。不敢用補。雜病一切表證實證。不敢



用攻。舉俗所見皆然。病家亦寧死無怨。良由聖教久湮。邪說橫行之故。是不得不以傷寒入門。見證定名真訣一句喝破。令雜病家粗知分經辨府。不致妄爲舉措。寧無小補於世哉。

姑以陰陽傳中冬溫溫熱時行大綱辨述如左。

陰陽傳中。如交霜降節後。有病發熱頭痛自汗。脈浮緩者。

風傷衛證也。以風爲陽邪。故只傷於衛分。衛傷所以腠理疎。

汗自出。身不疼。氣不喘。脈亦不緊。如見惡寒發熱頭疼骨節

痛。無汗而喘。脈浮緊者。寒傷營證也。以寒爲陰邪。故直傷於

營分。營傷所以腠理固閉。無汗而喘。身疼骨節痛。而脈不柔

和。如見發熱惡寒頭痛身疼。汗不得出。而煩躁脈浮緊者。風

寒併傷營衛也。以風爲陽邪。無竅不入。風性善動。法當有汗。

寒爲陰邪。萬類固閉。寒氣斂束。鬱遏腠理。所以不得外泄。熱

勢反蒸於裏而發煩躁也。上皆太陽經初病見證。有桂枝麻黃青龍鼎峙三法。○若交陽明之經。則惡寒皆除。但壯熱自汗。而脈浮數。以陽明內達於胃。多氣多血。邪入其經。蒸動水穀之氣。故皆有汗。但以能食爲陽邪屬風。不能食爲陰邪屬寒。辨之。○若交少陽之經。則往來寒熱。口苦脇痛。以其經居表裏之半。邪欲入則寒。正與爭則熱。所以只宜和解。而有汗下利小便三禁。○至其傳變。雖有次第。本無定矩。有循經而傳者。有越經而傳者。有傳遍六經者。有傳至二三經而止者。有犯本者。有入府者。有邪在太陽。不傳陽明之經。卽入陽明之府者。有陽明經府相傳者。有從少陽經傳入陽明府者。所以仲景有太陽陽明正陽陽明少陽陽明之異。或云少陽無逆傳陽明之理。殊不知胃爲十二經之總司。經經交貫。且少

陽之經在外。而陽明之府在內。何逆之有。至若傳入陰經。亦有轉入胃府而成下證者。太陰藏府相連。移寒移熱最易。少陰亦有下利。清水色純青。心下痛。口乾燥者。厥陰亦有下利。讖語者。此皆陰經入府之證。少陰更有移熱膀胱之府。一身手足盡熱。小便血者。厥陰亦有轉出少陽。嘔而發熱者。二經接壤故也。又有轉出太陽表證者。如下利後。清便自調。身疼痛。此陰盡復陽也。○夫所謂犯本者。太陽經邪入膀胱之本。如煩渴引飲。水入即吐。小便不利者。風傷衛之犯本也。如熱結膀胱。其人如狂。或下血者。此寒傷營之犯本也。所以仲景有五苓桃核承氣之分。○邪熱入胃。則當詳三陽明之原。而與三承氣緩急分治。蓋陽明居中。萬物所歸。無所復傳。至此悉宜攻下。但須俟結定。則熱邪盡歸於胃。然後下之。若結未

定而下早。則有結胸痞斬挾熱利等證。以邪熱歸併中土未盡乘機內入而爲變矣。故傷寒家有汗不厭早。下不厭遲。發表不開。不可攻裏之戒。邪在少陽。入犯膽府。則胸滿驚煩。小便不利。一身盡重。不可轉側。或入血室。則晝日明了。夜則譫語。如見鬼狀。皆宜按證求治。但此經之要。全重在於胃氣。所以小柴胡中必用人參。仲景云。胃和則愈。胃不和則煩而悸之語。乃一經之要旨也。○至傳三陰。太陰則腹滿時痛。少陰則腹痛自利下重。小便不利。甚則口燥心下痛。厥陰則寒熱交錯。寒多熱少則病進。熱多寒少則病退。大抵少陰傳經熱邪。必從太陰而入。厥陰必從少陰而入。非若陰證有一入太陽。不作鬱熱。便入少陰之理。當知傷寒傳經之證。皆是熱邪。經中邪盛而溢入奇經。故其傳皆從陽維而傳布三陽。陰

維而傳布三陰。與十二經藏府相貫之次第無預也。其邪必從太陽經始。以冬時寒水司令。故無先犯他經之理。但有他經本虛。或爲合病。或爲越經。或陷此經。不復他傳。非若感冒非時寒疫之三陽混雜也。大抵寒疫多發於春時。春則少陽司令。風木之邪必先少陽。而太陽陽明在外。病則三經俱受。以是治感冒之方。若香蘇芎蘇參蘇正氣十神之類。皆三經雜用不分耳。試觀夏暑必傷心包。秋燥必傷肺絡。總不離於司運之主令也。○其有誤治而成壞證者。證類多端。未能悉舉。卽如結胸痞滿。良由誤下表邪內陷。故脈必有一部見浮。蓋寒傷營。營屬血。而鞭痛者爲結胸。風傷衛。衛屬氣。而不痛者爲痞滿。然痞滿之基。多由其人痰溼內蘊。非若結胸之必因下早而陽邪內陷。此大小陷胸五種瀉心。分司結胸痞滿。

諸治也。至於懊懣諸證。無結可攻。無痞可散。惟梔子豉湯。可以開發虛人內陷之表邪。一湧而迅掃無餘。卽勞復食復。但於方中加枳實一味。其溫熱時行。亦可取法乎此也。○至於陰證。旣無熱邪氣蒸。萬無傳經之理。卽有陰邪。陰主靜。斷不能傳。原其受病。必先少陰。或形寒飲冷傷脾。則入太陰有之。其厥陰之證。無不由少陰而病。所以少陰溫經之藥。峻用薑附四逆。厥陰風木之藏。內伏真火。雖有陰寒。不過萸桂之屬。若當歸四逆加吳茱萸。換肉桂足矣。不必薑附也。然仲景厥陰例中。非無四逆等治也。當知厥陰之寒。皆是由少陰虛寒而來。故用薑附合少陰而溫之。所謂腎肝同治也。卽太陰未嘗不用四逆也。亦是命門火衰。不能生土致病。故必兼溫少陰。所謂治病必求其本也。○夫治傷寒之法。全在得其綱領。

邪在三陽則當辨其經府。病入三陰則當分其傳中。蓋經屬表。宜從外解。府屬裏。必須攻下而除。傳屬熱。雖有陽極似陰。厥逆自利等證。但須審先前曾發熱頭痛。至四五日或數日而見厥利者。皆陽邪亢極。厥深熱深之證。急當清理其內。誤與溫藥必死。但清之有方。須知陽極似陰之證。其人根氣必虛。卽與救熱存陰。須防熱去寒起。間有發汗太過而成亡陽之候。亦有攻下太過而陰陽俱脫者。不妨稍用溫補。然脫止陽回。卽當易轍。不可過劑以耗其津。況此證與真陰受病不同。中屬寒。雖有陰極似陽。發熱躁悶等證。但須審初病不發熱。無頭痛。便嘔吐清水。蹇卧足冷。自利腹痛。脈來小弱。至四五日或六七日。反見大熱躁亂。欲坐卧泥水中。渴欲飲水而不能下喉。脈虛大不能鼓激者。此陰盛格陽之假熱。陽欲

脫亡之兆。峻用參附無疑。○有卒暴中寒。厥冷不省者。此真陽大虛。寒邪斬關直入之候。丹溪所謂一身受邪。難分經絡是也。非頻進白通通脈。不能挽回。○更有少陰中風。雖不發熱。亦無自汗厥冷嘔吐下利等證。但覺胸中痞滿不安。不時心懸若饑。自言腹滿。他人按之不滿。手足自溫。六脈小弱而微浮者。此爲陰經陽邪。人罕能識。惟宜黃耆建中稍加人參熟附。溫散其邪。若挾飲食。則氣口濇滯。亦有糲糊不清者。當與枳實理中。手足微冷加附子。若誤與發散必死。破氣寬中亦死。消尅攻下亦死。若峻用四逆。傷犯真陰。多有欬逆血溢之虞。此證初時不以爲意。每每委之庸師。所以犯之。百無一生也。

冬溫 ○冬時天氣大煖。而見發熱欬嗽者。此爲冬溫。以伏藏

北京中医药大学图书馆版权所有

不味。而血寒中見血其阻血益血脈發斑疹并并不利。
而按俞陳重阻變風盛以燔而致亦不可用辛熾。冬延剛到。
阻少式艱育風寒吐下交用風藥止舉其邪脾阻燔愈出。
阻此燔阻自平却於阻來乳舉阻燔其中對阻痺臥重越。
口氣大良燔手吳燔合如育武醫冬盛更吐暴寒寒燔燔。
也苦習屢本蓋阻只中燔茲暮阻燔寒發燔素常屢蓋阻屢。
內鬱出其阻如蓋繇如蓋大無心亦育小阻皆燔阻屢。
熱不同於阻臘燔昔火屢土並也按其阻難阻阻屢昔火屢。
疥嗽之論屢姑剛痺爽餘甚阻見血與胃風之一按其寒阻。
知蠶阻以知蠶不酢阻裏阻以風之氣昔阻自味也冬盛本。
劉之蠶阻屢發伏阻以發燔燔阻屢阻以按燔其蠶土酢。
去今而又阻屢大斯少劉不蠶非弗不王之屢醫以入阻也。

之令。而反陽氣大泄。少陰不藏。非時不正之氣。得以入傷少陰之經。陽氣發外。所以發熱。熱邪傷氣。所以欬嗽。其經上循喉嚨。所以喉腫。下循腹裏。所以感之深者。則自利也。冬溫本秋燥之餘氣。故咽乾痰結。甚則見血。與傷風之一欬其痰卽應不同。欬則顫脹者。火氣上逆也。欬甚則藏府引痛者。火氣內鬱也。其脈或虛緩。或虛大無力。亦有小弱者。熱邪傷氣故也。若腎氣本虛。則尺中微弦。暮則微寒。發熱素常氣虛。則氣口虛大。身熱手足微冷。或有先傷冬溫。更加暴寒。寒鬱熱邪。則壯熱頭痛。自汗喘欬。脈來浮舉。則微弦。中候則軟滑。重按則少力。雖有風寒。切不可妄用風藥。升舉其邪。輕則熱愈甚。而欬愈劇。重則變風溫。灼熱而死。亦不可用辛散。多致咽喉不利。唾膿血。痰中見血。甚則血溢血泄。發斑。狐惑。往往不救。

又不可用耗氣藥。多至欬劇。痛引周身。面熱足冷。而致危候。惟宜加減葱白香豉湯調之。兼有風寒外襲。則加羌活紫蘇。寒邪盛極而發煩躁者。但於前藥中。稍加麻黃五七分。石青錢許。或歲時湯本方主之。緣此證見於冬時。舉世醫流。莫不以傷寒目之。而與發散致夭枉者。不可枚舉。曷知西北三方。患真中風傷寒者最多。患冬溫者絕少。間有傷於火炕者。亦有傷於火而復傷於寒者。可與越脾湯。桂枝二越脾一湯。以其地厚質實。可勝攻伐。非若東南之稟氣孱弱也。至如大嶺以南。陽氣常泄之地。但有瘴癘之毒。絕無傷寒之患。即使客遊他處。感冒風寒。僅可藿香正氣之類。若麻黃青龍。絕不可犯。誤用而發動。身中素蘊之瘴溼。則壯熱不止。每致殞命。不可不慎。

溫病○有冬時觸犯邪氣。伏於經中。至春分前後。乘陽氣發動而爲溫病。素問所謂冬傷於寒。春必病溫是也。其證不惡寒。但惡熱而大渴。其脈多數盛而渾渾不清。越人所謂溫病之脈。行在諸經。不知何經之動。絕不似傷寒浮緊之狀。且有尺與氣口。必倍於人迎。信非人迎緊盛之比。此證大忌發汗。若誤與表散。必躁熱無汗。悶亂不寧而死。以其邪伏經中。日久皆從火化而發。其熱自內達外。必用辛涼以化在表之熱。苦寒以泄在裏之熱。內氣一通。自能作汗。有服承氣。大汗淋漓而愈者。有大渴飲水。通身汗出而熱頓除者。有渾身壯熱。服黃芩湯。葱白香豉湯得汗而解者。有發熱自利。服葛根黃芩黃連湯而愈者。有舌乾便秘。服涼膈散而安者。故古諺有溫熱病。誤下不爲大害。誤汗爲害。

有非時寒疫。間雜其間。不可不審諦明白而爲治療。蓋暴感風寒之證。初時畏寒不渴。至二三日。熱邪傷耗津液方渴。與溫病熱病之一病。便昏昏不爽。大熱煩渴不同。其脈多浮盛。而見於左手。與溫病之右脈數盛亦異。若兼右脈滑盛。或滯滯模糊者。必停飲食之故。故治寒疫當先發散爲主。卽有宿滯。兼與橘半枳朴。不得濫用裏藥。倘邪未入裏而誤與攻下。不無引賊破家之虞。故其治與伏氣迥乎不類也。

熱病○伏氣之發於夏至後者。熱病也。其邪乘夏火鬱發。從少陰蒸遍三陽。與傷寒之逐經傳變不同。亦有兼中暍而發者。其治與中暍無異。暍雖熱毒暴中。皆緣熱耗腎水。汗傷胃汁。火迫心包。故用白虎之知母以淨少陰之源。石膏以化胃府之熱。甘草粳米護心包而保肺胃之氣。與熱病之邪伏少

陰。熱傷胃汁。火迫心包。不殊。故可異病同治。而熱邪皆得渙散也。若熱毒亢極不解。腹滿氣盛者。涼膈雙解承氣解毒兼苦燥而攻之。或三黃石膏梔子豉湯汗之。用法不峻。投劑不猛。必不應手。非如傷寒待陽明胃實而後可攻下也。時行。○時行疫癘。非常有之病。或數年一發。或數十年一發。多發於饑饉兵荒之後。發則一方之內。沿門闔境。老幼皆然。此大疫也。亦有一隅偶見數家。或一家止一二人。或三五人。病證皆同者。此常疫也。卽如痘疹麻疹之類。或越一二年。或三五年一見。非若大疫之盛行。所以人不加察耳。卽如軟腳瘟證。醫者皆以脚氣目之。捻頸瘟證。醫者皆以喉痺目之。絞腸瘟證。醫者皆以臭毒目之。楊梅瘟證。醫者皆以丹腫目之。黑骨瘟證。醫者皆以中毒目之。瓜瓢瘟證。醫者皆以畜血傷