

醫燈續焰卷十六

錢塘後學潘

楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

高鴻奎君錫

門人

曹毓貞元起校

壻施安祖孔安

小兒脉證第七十八

小兒之脉。七至爲平。更察色證。與虎口文。

三歲以下小兒純陽之體。形質小。呼吸促。脉之周行駛而應指疾。大約以七至爲平。非若大人四至爲平也。其太過爲數爲熱。不及爲遲爲寒。則與大人無異矣。雖然脉至七八。難全爲準。必察其色。與所見之證。更視虎口之文。而病情始無隱匿。蓋五藏之列於面。各有定部。如左腮屬肝。右腮屬肺。額上屬心。鼻屬脾。頰屬腎是已。諸邪之見於部。亦各有定色。如赤爲熱。白爲寒。黃爲積。青黑爲痛是已。

虎口者。食指內側。連大指作虎口形。故曰虎口。是處肌皮嫩薄。文色顯明。卽肺手太陰經脉之盡處。諸脉大會此經。察色者。卽所以察脉也。故色赤爲熱。在脉則數。色白爲寒。在脉則遲。色黃爲積。在脉則緩。色青黑爲痛。在脉則沉弦。此皆自然之理。非可牽會。雖無五部之分。而有三關之別。指初節曰風關。二節曰氣關。三節曰命關。文色見風關者輕。再進。則上氣關爲重。再進。則直透命關爲最重。甚

則主死。由風邪而干正氣。正氣不能勝而迫及於命。漸進漸深之象也。至如外證。肝病主諸風顫掉。實則目直叫呼。脇痛項急。呵欠頓悶。二便閉塞。虛則咬牙多欠。目閉羞明。心病主驚。實則發搐叫喊。或笑。發熱。欲飲水。頻吐舌。虛則悸。卧不安。畏見人。舌痿不能乳。脾主困。實則困頓。身重肌熱。腹脹硬。唇腫而渴。虛則吐瀉不食。慢風。四肢不收。口流涎。肺主喘。實則胸滿喘促悶亂。虛則哽氣。呵欠寒慄。

腎主恐怖。畏明。不能立。二便清泄。足冷。但有虛證。而無實證。已上諸證。不過言其大槩耳。至於傾移傳變。何可勝紀。唯圓機之士。參合色脉。識本知標。源流窮源。緒綜體認。縱不能臻聖神之域。諒亦不在工巧之下矣。

小兒雜述

襁褓 千金論云。小兒宜用父故絮。女用母故絮。爲衣。勿用新綿。及過厚。令壯熱生瘡。發癰。又令筋

骨緩弱。宜時見風日爲佳。

乳哺

乳者。奶也。哺者。食也。乳後不得便與食。哺

後不得便與乳。小兒脾胃弱。乳食相併。難以尅化。周歲已上。必成乳癖。食癖。作熱作疼。疳病從此始。丹溪曰。小兒腸胃薄窄。一切酸醎甜辣。魚肉水果。

濕麵煎炒。俱是發熱難化之物。皆宜禁絕。只與熟菜白粥。非唯無病。且不縱口。可以養德。婦人無知。唯務姑息。畏其啼哭。無所不與。積成痼疾。雖悔何

及乳母尤宜謹節。飲食下咽。乳汁便通。情欲中動。乳脉便應。兒得此乳。疾病立至。不吐則瀉。不瘡則熱。驚搐夜啼。口糜腹痛諸疾。所由來矣。病之初來。其溺必少。便須詢問。隨證治母。可消患於未形也。乳母亦不宜用狐臭。癭癭。喘嗽。疥癬。頭瘡。聾啞。龜鼻。癰證之人。

肘後云。兒生三日。宜助穀神。碎米作飲如乳。與兒大豆許。令嚙之。頻與三豆許。三七日可哺。

千金云。兒哺早。不勝穀氣。令頭面體生瘡。愈而復發。疳羸難養。一月後。雖哺勿多。不嗜食。勿強與之。寶鑑云。兒五十日。可哺如棗核。百日彈丸。早晚二哺。莫當風解衣澡浴。及帶哭而乳。冒冷而哺。又不可在神佛驢馬畔。及各房異戶。皆令兒爲病。

錢乙云。惜兒過當。三兩歲。猶未飲食。致脾胃弱。一生多病。半年後。宜煎陳米稀粥時與之。十月後。漸與稠粥助中氣。自然易養少病。

外臺崔氏。初哺兒。用平定成日。丑寅辰巳酉日吉。
男忌戊巳。女忌丙丁日。

小兒四五歲。當斷乳而不肯斷者。

宜盡
眉膏

斷後。肉食

宜少少漸進。則無疳癖之患。

田氏曰。大凡小兒過煖生熱。熱極生風。提抱生癰。
餵飼生癖。盛夏浴後。勿卽乳兒。兒啼勿卽與乳。令
兒成胃毒。或秋成痢。浴後良久。身體燥。兒啼後。俟
氣息平。方可乳。盛啼卽乳。多令氣逆成呃。

千金論曰。乳兒勿過飽。飽則溢而吐。若乳來多猛。取出授後再乳。或先捏去宿汁乳之。乳母欲寐。當以臂枕兒頭。與乳平。母欲睡熟。卽奪其乳。恐其不知飽足。亦成嘔吐。父母交合。兒卧於側。或驚起。勿與乳。蓋氣亂未定。亦能害兒。

顱頤經曰。夏不去熱乳。令兒嘔吐。冬不去寒乳。令兒瀉痢。侵早乳兒。皆須捏去宿乳。乳汁勿投於地。虫蟻食之。令乳無汁。宜沃東壁上。

張渙曰。乳母須每日三時。摸兒項後風池。若壯熱者。卽須熨之。使微汗卽愈。風池在頭項筋兩轅之邊切不可妄鍼灸。亦不可輒吐下。蓋鍼灸傷兒經絡。吐下動兒藏府也。

嬰兒半歲。尻骨已成。乳母當教兒學坐。二百日外。掌骨成。教令地上匍匐。三百日。臍骨成。教令獨立。周歲。膝骨成。教令行步。此皆一定之法。世人惜兒。懷抱過時。柔痠筋骨。爲害非淺。

初生兒在胎。藉胎液以生藏府。分娩時。口含血塊。啼聲出。卽嚙下此毒內伏命門。外感天時。多發爲驚風瘡疹等病。須於未啼時。用綿裹指。急空去。用黃連豆豉硃蜜甘艸解之。後出痘亦輕。又或難產。或冒風寒垂危者。勿卽斷臍帶。急烘綿絮。包抱懷中。以胎衣置火中。更用火紙捻於臍帶上下往來燎之。使煖氣入腹。必自甦。尤戒浴。恐腠理泄而外邪乘也。看舌下有膜如榴子連舌。致啼不出。聲

不轉。速以指爪斷。或用葦刀割之。微有血出。卽活。若血出多。燒髮灰。猪脂和塗之。見上下唇。與齒齦連處。皆有一筋牽引。若上唇筋緊。卽生上煉。下唇筋緊。卽生下煉。上煉生瘡滿頭。或眉間如癰狀。瘙痒不已。復流黃汁。至處生瘡。下煉起腰背。漸至四肢。患亦如上。若不治。或頭面相通。累年不輕。令天折。或成大病。唯每早拭口佳。

兒生三日。以桑槐榆桃柳嫩枝。各三寸。長者二三

十節煎湯適冷熱。入猪胆汁一枚浴之。勿久。浴湯用猪胆。益母草。不生疥瘡。用金銀花。虎頭骨。麝。丹砂。辟惡氣。客忤驚癇。用桃梅李楮根葉。解體熱溫疫。須臨浴時煮。紀用經浴法。用寅卯酉日吉。壬午丁未癸巳凶。不能上三日。勿犯下三日。又三日五日七日宜浴。

小兒浴。勿先斷臍帶。恐水濕侵臍。有臍風臍瘡等證。用清油調髮灰傅臍佳。

千金云。臍勿以刀割。隔單衣咬斷。以煖氣呵七遍。
卽纏結。所留帶。致兒足跌上。斷訖。看臍帶中多有
虫。急剔去。不爾。入臍成疾。臍當長六寸。長則傷肌。
短則傷藏。不以時斷。及按汁不盡。煖氣漸微。卽生
寒。令兒臍風。寶鑑論斷臍。若用剪刀。先於懷中令
剪煖。又水入臍。多天釣。痛苦啼叫。面青黑。臍傷動。
久不乾。傷外風。卽口噤不可救。聖惠云。兒生一宿。
抱近明無風處。看臍上有赤脉直上者。卽於脉盡

頭灸三壯。赤散卽無患矣。裹臍必用軟練帛。若十許日。怒啼不止。必臍燥刺腹。或衣中有刺物。或換衣。或換裹。須細察之。

崔氏云。兒衣須清水洗。勿令污濁。新瓶盛。密蓋。置便宜處。三日後。依月吉地向陽處理之。入土三尺。須牢築。令兒壽。若不謹。或爲虫畜傷食。主兒不壽。或橫亡。宜天德月空處埋吉。

正月天德在丁月空在丙辰餘詳官本曆

日若遇反支。宜挂宅外福德上。向陽高燥處。待過

月。然後依法埋藏吉。甲乙日生。丙丁日藏。丙丁日生。戊巳日藏。戊巳日生。庚辛日藏。庚辛日生。壬癸日藏吉。

集驗方云。小兒初剃頭。不擇日。皆於滿月日剃之。

蓋俗所尚。前產婦未得出房。於滿月。卽與兒俱出。謂胎髮穢惡。有觸神竈。令兒不安。故於此日剃頭而出。凡剃頭。須避風。就煖。剃後。以杏仁三枚。去皮尖研碎。入薄荷三葉。再同研。却入生麻油三四滴。