

第二卷第四冊

禁慄如喪神守

忌同火

宜同躁擾狂越

氣逆衝上

忌同火

宜降氣

酸斂

甘寒

苦寒

鹹寒

蘇子

枇杷葉

橘紅

五味子

番降香

山茱萸

白芍藥

麥門冬

本草經疏卷一

驚擾狂越罵言驚厥

禁慄喪神守絀

若氣逆上衝

石斛

黃蘗

牛膝

桑白皮

童溺

胸痹腎瘕

忌同火

宜清熱和肝

酸寒

苦寒

辛寒

甘寒

白芍藥

生甘草

竹葉

玄參

黃連

黃蘗

生地黃

甘菊花

麥門冬

知母

石膏

○雜證門

瘧經曰夏傷於暑秋必痃瘧其證大都多熱多
寒或熱多寒少或寒多熱少或單熱不寒或單
寒不熱或先寒後熱或先熱後寒或有汗無汗
或汗少汗多或自汗盜汗或頭疼骨痛或大渴
引飲口苦舌乾或嘔吐不思食或煩躁不得眠
或大便燥結或瀉利或連發或間發或三日發
或發於陽或發於陰要皆中氣不足脾胃虛弱

暑邪乘虛客之而作雖隨經隨證投藥解散必先清暑益氣調理脾胃爲主有食者兼消導奪食有風兼散風有老痰伏飲者兼豁痰逐飲感瘴癘者兼消瘴癘汗多者固表無汗者解表泄利者升發兼利小便便燥者兼益陰潤燥病有陰陽藥分氣血證有緩急治因先後人有虛實法異攻補久而不解必屬於虛氣虛者補氣血虛者補血兩虛者氣血兼補非大補真氣大健

脾胃不得瘳也

忌破氣下

諸藥俱見前

瘧必由於中氣虛破氣則傷中氣邪不得
解甚則中滿不思食作泄惡寒口乾惟傷
食宜消不同此法

誤下則邪氣陷於內變爲滯下或腹滿腫
脹嘔惡不思食凡屬破氣下泄藥切戒勿

施

宜清暑益氣 健脾開胃 兼消痰 宜分

臟腑手足六經所見證施治 先清暑熱多

者宜服白虎湯加減

硬石膏

自一兩至四兩

知母

自四錢至二兩四錢

竹葉

自一片

至四片麥門冬

自八錢至三兩二錢

粳米

自一小撮至二大撮

病

人素虛或作勞者加人參

自三錢至一兩

○有痰

加廣橘紅

三錢

竹瀝

一杯

大渴者

加

栝樓

根

三錢至六錢

○不渴者用清暑益氣湯○兼

飲食停滯者加枳實青皮草果一二劑食
消卽止勿多服多服則損中氣其藥俱宜
黃昏煎以井水澄冷須露一宿五更時溫
服蓋瘧乃暑邪爲病暑得露則散也

足太陽經屬膀胱其證令人腰痛頭痛頭重寒
從背起先寒後熱熛熛喝喝然熱止汗出難已
或遍身骨痛小便短赤

羌活一錢至四錢廣陳皮去白二錢五分黃芩二錢前

胡二錢甘草炙五分猪苓一錢知母二錢五分○

若口渴者即兼陽明宜加石膏麥門冬倍

知母渴而汗少或無汗并加葛根○若涉

深秋或入冬無汗宜多加薑皮○因虛而

無汗或汗少者加人參三五錢麥門冬四五錢

佐以薑皮二三錢露一宿發日五更溫服○

因虛汗多者加黃耆三四錢桂枝七八分汗止

卽去桂枝不可多服○若病人素有熱者
勿服桂枝以芍藥五味子代之○若發於
陰并加當歸○小便短澀或赤者與六一
散二三服○有溼者以猪苓茯苓代滑石
下午服理脾健胃藥

橘紅

二錢五分

白豆蔻

五分

白茯苓

三錢

山查

三錢

麥芽

炒三錢

藿香

一錢

人參

三錢

白朮

二錢

白芍藥

三錢

白扁豆

三錢

○有肺火

者去人參白朮加麥門冬五錢石斛三錢

烏梅肉一枚○停食者必惡食加山查傷

肉食者加黃連紅麴傷穀食者加枳實草

果各七分傷麪食者加炒萊菔子食消卽已

不可多服多服則損中氣○胃家素有溼

痰者其證不渴寒多方可用半夏橘紅二

朮大劑與之嘔甚者兼用薑皮

足陽明經屬胃其證發熱頭疼鼻乾渴欲引飲

目眴眴不得眠甚則煩躁畏火光入聲水聲

宜服大劑竹葉石膏湯無汗或汗少不嘔者

可加乾葛

二三錢

○病人虛而作勞者加人

參○汗多加白朮○痰多加貝母橘紅得

汗卽解○寒熱俱甚渴甚汗多寒時指爪

皆紫黯者加桂枝

七八分

○久而不解屬氣

虛用人參

兩許

薑皮兩許煎成露一宿五

更溫服○下午服理脾健胃藥如前方加

減亦如之

足少陽經屬膽其證往來寒熱口苦耳聾胸脇
痛或嘔

宜服小柴胡湯○渴者去半夏加石膏麥門

冬○肺家有熱者去人參加知母倍門冬

○有痰不渴者本方加貝母三錢至八錢求茯苓

苓各三錢薑皮一錢至三四錢○病人陰虛而有熱

者准區土忌用半夏主薑吳茱投則員人津

液令人聲啞宜用竹茹橘皮麥門冬白茯苓烏梅以代之

○以上三陽經瘧邪客之者其證多熱多渴亦易得汗藥宜大劑急逐暑邪毋使遲留則病易愈繼以理脾開胃大補真氣蔑不瘳矣邪在三陽藥宜辛寒如石膏知母柴胡甘寒如葛根麥門冬竹葉粳米苦寒如黃芩之屬爲君乃可以散暑邪除熱渴墜

頭疼兼寒甚者則間用辛溫如薑皮桂枝
以爲嚮導以伏其邪則病易退凡寒甚者
病因於虛或作勞者亦因於虛皆宜甘溫
以人參黃耆朮爲君佐以辛甘如桂枝薑
皮之屬脾胃虛弱飲食不消者則補之以
參朮佐以消導如白豆蔻麥芽砂仁草豆
蔻枳實橘皮山查之屬在陰分者則以當
歸牛膝爲君佐以薑桂如熱甚而渴者去

薑桂加知母麥門冬竹葉牛膝鼈甲

足厥陰經屬肝其證先寒後熱色蒼蒼然善太
息甚者狀如欲死或頭疼而渴

宜先服三黃石膏湯加柴胡鼈甲橘皮以祛

暑邪後用當歸

兩許

橘皮

三四錢

鼈甲

四五錢

牛膝

兩許

柴胡

一二錢

濃煎露一宿發日五

更溫服○如熱甚而渴加枯樓根

三四錢

麥

門冬

五六錢

竹葉

一百片

知母

三四錢

鼈甲

五六錢

○如脾胃薄弱或溏泄去當歸加人參三五

錢

○如有肺火不可服參者祇照本方多

服自愈○寒多或寒甚指爪青黯者加桂

枝薑皮人參

足太陰經屬脾其證先寒後熱或寒多若脾瘧
必寒從中起善嘔嘔已乃衰然後發熱熱過汗
出乃已熱甚者或渴否則不渴喜火

宜服桂枝湯建中湯○病人虛者以人參薑