

痔漏方凡五類

九漏第一論

矣法十六首

方八十三首

論曰夫九漏之為病皆寒熱癰瘻在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣捉留於脈而不去者也
鼠瘻之本皆根在於臟其末上出於頸腋之上其浮於脈中而未者於肌肉而外為膿血者易去去之奈
何曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往來以去之其小如麥者一刺知三
刺已決其死生奈何曰反其目視其中有赤脈從上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二
脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死赤脈不下貫瞳子者可治也○凡項邊腋下先作癰瘻者
欲作漏也宜禁五辛酒麵及諸熟食凡漏有似石癰累累然作瘻子有核在兩頸及腋下不痛不熱治者
皆練石散傅其外內服五香連翹湯下之二方並見卷之十已潰者治如癰法諸漏結核未破者火鍼鍼使
著核結中無不瘥者何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰蝶站漏四曰蠱漏五曰蚍蜉漏六曰蟬螬漏七
曰浮沮漏八曰癰瘻漏九曰轉脈漏

空青商陸散 治狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺盆之上連延耳根腫大此得之憂恚氣上不得下
其根在肝肺一作空青主之商陸為之佐方 空青 蜈蚣各二分 蜈肝一具 商陸 獨活 黃芩 當歸
乾薑 婦人辱草 鱉甲 蟹蟹 地膽 苓香 磬石各一錢 半分 蜜椒粒三十 右十六味治
下篩酒服方寸匕日三服十五日服之
下篩酒服方寸匕日三服十五日服之

衍義

嘗讀內經僅有鼠瘻寒熱而無九漏之名詳推受病之源多由憂恚所致屬於肝腎居多再參
千金瘻瘻一定名何漏因於何病屬諸何臟言雖繫繫不無破缺混玉之疑如狼漏之毒根於肝而
用空青商陸散首取空青利竅通津佐以商陸利水導氣然在始病元氣未漓者庶為合宜更取蜈蚣

蝟腦入肝追毒蟹蠶地膽攻堅破血礬石滌除腐穢一皆眼眩之藥其餘皆歸於獨鱉甲茴香椒薑之屬約雖稍平不過為空青等味之助力至用犀草其義未詳

狸骨知母散 治鼠漏始發於頸無頭尾如鼴鼠使人寒熱脫肉此得之食有鼠毒不去其根在胃以狸骨主之知母為之佐方 犺骨 知母 桂心 鮫鯉甲 山龜殼 雄黃 甘草 乾薑等分 右八味治下篩飲服方十七日三仍以蜜和內瘡中無不瘥者先灸作瘡後以約傅之已作瘡不用矣

衍義 犺專捕鼠鼠漏用之每效故用狸骨佐以知母龜殼鯉甲薑桂雄黃都是腎家辟除邪毒之藥方下雖言其根在胃而後方之用鼠灰亂髮地黃膏傅並屬腎約恐是腎字之誤亦未可知以二字形頗相似也

治鼠漏方 用蛇虺所吞鼠燒末服方寸七日二不過三服此大有驗但難得耳并傅瘡中佳○又方

死鼠形者 中亂髮如雞子一枚 右二味以臘月猪脂煎令消盡膏成分作二分一分稍稍塗瘡一分稍稍酒服之瘥鼠子當從瘡中出良

地黃膏

治鼠漏瘡瘥復發及不愈出膿血不止方 以不中水猪脂咬咀生地黃內脂中令脂與地黃相淹和煎六七沸其瘡先用桑灰汁洗去惡次以地黃膏傅上日一易

衍義 衍義并見狸骨知母散內

桂子桔梗丸

治蠼螋漏始發於頸項狀如腫此得之食瓜果實毒不去其根在大腸桂子王之桔梗為

之佐方 桂子 龍骨各半附子一兩 蜀椒百粒 桂心

桔梗 乾薑 磬石 獨活 芒硝各一

右十味為末以乘二十枚合搗醋醬和丸如大豆溫醬下五丸加至十九丸

衍義

桂子芳香遍達肺氣佐以桔梗開提胸膈更兼桔梗桂附辛溫破結獨活芒硝祛風活血礬石

深垢龍骨收津使不隨辛溫耗散深得散中寓斂之義

惟荀子本草

治猝漏治食於頭瘻歷三四處俱相連以膏北得之飲流水中有終毋不方其根在脾誰

右八味治下篩傳瘡日一度十日止

行義 蜂漏用雄黃芩解毒清熱仍取蜂房助之其餘椒薑茴菜輔雄黃以破陰毒鱉甲輔黃芩以泄旺氣此雖外治之方未嘗不可內服

譽石防風散 治蛇蟲漏始發於頸初得之如傷寒此得之食中有蛇蟲毒不去其根在腎譽石主之防風為之佐方 譽石 防風 知母 雄黃 桃白皮 乾地黃 獨活 青黛 蟹螯 白芷 松脂脂一作脂 菖蒲 約海藻 當歸各二分 白木 蜈皮各四分 蜀椒百粒 右十七味治下篩飲服一錢七日三

行義 本經言譽石治寒熱鼠瘻死肌風癆腹中堅癧邪氣諸臟腑經絡無不達之佐以防風開泄風熱其外諸味分解各經原不專主腎病若言得之食中未嘗不傷在胃亦未可確指蛇蟲也

譽石白木散 治蟬蠅漏始發於頸下無頭尾如聚核塊累移在皮中使人寒熱心滿此得之喜怒哭泣其根在心譽石主之白木為之佐方 譽石 白木 空青 當歸各二分 細辛一兩 蜈皮 蟹螯 枸杞 地膽各一乾烏腦立許 右十味為末以醋醬服方寸七日三病在上側輸臥在下高枕以便藥流下

行義 譽石專除氣分之垢膩佐以白木專理氣分之津液餘皆散堅利竅之品惟乾烏腦專於截風然其病得之喜怒哭泣則肝與肺未必無預則不獨在心矣

地膽甘草散 治浮疽漏始發於頸如兩指使人寒熱欲卧此得之憂愁思慮其根在膽地膽主之甘草為之佐方 地膽 雄黃 乾薑 繢斷 石決明 蔴蔴根 龍膽草各三分 甘草一分 細辛二分

右十味治下篩傳瘡日四五度

古今錄驗無雄黃有硫黃

行義

本經言地膽治鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破瘻墮胎其破血辟毒之力最猛甘草之佐非助其力解其毒耳其餘諸味雖寒熱錯雜不出解散之意以浮疽病不在裏僅用外敷足矣

雌黃芍藥丸 治癰癧漏始發於頭有根初苦痛令人寒熱此得之因新沐濕結髮汗流於頭所致其根在腎雌黃主之芍藥為之佐方 雌黃 芍藥 茯苓 繢斷 乾地黃 穴青 輿石 乾薑 桔梗 蜀椒 恆山 虎腎 狸肉 烏腦 蟹螯 磐石各一附子一兩 右十七味為末蜜丸如大豆酒服十九日二

行義

新沐中風則為首風新沐受溼著於腦則為癰癧日久不散失其陽和蘊毒而成其漏故用雌黃陰毒之物以破陰毒之結佐以芍藥除血痹破堅積此本經主治專取養營之功以和失調之血則脾自開積自散矣其餘虎腎狸肉烏腦蟹螯截風解毒磐石空青附子恒山破結開痰專賴芍藥以固陽根之力

蟹螯白芷丸 治轉脈漏始發不銷灌灌脈轉若驚惕身振寒熱此得之因驚卧失枕其根在小腸作心
續斷 蟹螯主之白芷為之佐方 蟹螯 白芷 緑青 大黃各二升 麻 鍾乳 甘草 防風 地膽
續斷 蒜香 豉石各一人參 當歸 桂心各二白木 麥冬各一右十七味為末蜜丸如大豆
酒服十九日二勿食菜慎房室百日外臺無大黃桂心麥門冬白木鍾乳

衍義 轉脈之漏因於驚卧失枕驚卧失枕有何大毒而用蟹螯地膽峻攻之味况有鍾乳白木之相反大振格敵之威豈在白芷相佐之力歟其綠青與空青同出銅礦功專上涌風痰濟以磐石窮搜積垢且得參术彌助其雄如虎斯翼故略借大黃以通下泄之機而為毒邪開一去路也於是再推致病之由苟非別有所觸而蘊毒但需和血榮筋便可向安又何必竭厥從事於峻攻耶

治九漏方 空青 商陸 知母 狸骨 桔梗 防風 莪子 磐石 黃芩 白芷 芍藥 甘草
雌黃 白朮 豉石 地膽 蟹螯 雄黃等分 右十八味為末蜜丸如大豆以酢服三丸三十日知四十日愈六十日平復百日内慎房室 一方為散酢服一刀圭日二服老小減半

地榆 通草 乾漆 牡丹皮 惠苡仁 疾藜子 漏蘆一作蘆 龍膽一作膽 土瓜各二分 蟹蠚四分

蛇牀子 苦參 大黃 蛇蛻皮 雄黃 間茹 細辛各二分 雄黃各等分

為度日一服○又方 蟹螯七枚 蜈蚣 真珠 雄黃各等分

右四味治下篩酒服半錢七日三○又

方 成煉松脂填瘡孔滿日三四度七日瘥有神驗○又方 蟹螯二枚 雄黃

桂心 犀角各二兩

右四味為末酒服一錢七日二服痛從小便出○又方 馬齒莧陰乾 臉月燭燼等分

右二味為末以臘月豬脂和其瘡先以暖泔清洗淨拭乾後以約敷日三○又方 乾牛屎

乾人屎等分 右二味搗先以綿絮瘡上綿上著屎蟲聞屎氣即出若瘡即以絲去之更別取屎及綿著其上如前蟲盡乃

止○又方 苦匏四枚大如盞者各穿一孔如指大置湯中煮數沸取一竹筒長一尺一頭內匏孔中

一頭注瘡孔冷則易之

治一切漏方

蟹螯四十枚 豉九枚 元青二十枚 生大豆一斤 黃

地膽各十枚

蜈蚣半寸 犀角 牛黃各一兩

右八味為末蜜丸如梧子大飲服二丸須臾多作酸醬粥冷飲之病從小便出視尿盆中如有蟲形狀又似

膠汁乃病出也間日一服飲粥如常小弱者隔三四日候無蟲出瘡漸瘥特忌油膩一切器物皆須灰

洗乃作食崔氏云治九漏初服約夜少食明日服二丸至七日甚虛悶可者食羹普菜美其餘脂膩

洗乃作食酸物果子之類並不得食入戒隔日一服瘥後仍作二十日將息不能將息便不須服

又方 煮鹽花以麵擁病上內鹽花麵匡中厚二十其下以桑葉三重藉鹽候冷熱得所可忍冷則無

益則傷肉一日一度候瘰疬根株勢消則止若已作瘡者搗穄穀為末粉之○又方 槟榔白皮三

十斤剉碎以水一石煮取一斗去滓煎如餳又取都廁上雄雌鼠屎各十四枚燒令汁為末內煎中又

溫酒一升投煎中合攪之羸人服半升當有蟲出○又方 霜下匏花曝乾為末傅之○又方 搗土

瓜根傅之燥則易不限時節○又方 死蛇去皮肉取骨為末合和封瘡上大痛以杏仁膏摩之痛止

○又方 死蛇和臘月猪脂合燒為末內孔中○又方 燒死蟻蟎為末醋和塗之又死蛇灰醋和傅之○又方 故布裹鹽如彈丸大燒令赤為末酒服之○又方 服白馬屎汁一升○又方 猪脂一升酒五合煎沸頓服之○又方 水研杏仁服之○又方 鹽麵和燒灰傅之○又方 正月雄狐屎陰乾搗末水和服

治漏作瘡孔方 用露蜂房為末以臘月猪脂和傅孔中

治漏發心胸以下者方 松脂 武都雄黃各三兩 右二味和為塊刀子刮為散飲服一方寸七日二不瘥更合

治漏方 鍛落鐵屑 狗炳車連齒骨火 虎屎 鹿皮帶毛 右四味等分治下篩以猪脂和內瘡中須臾即易日五六度

治一切冷瘻方 用人所吐蛔蟲燒灰先用甘草湯洗去瘡惡然後著灰無不瘥慎口味

治鼠瘻脾核痛未成瘻者方 以柏葉傅腫上熬鹽著葉上熨之令熱氣下即消

治風漏及鼠漏方 赤小豆 白斂 黃芪 牡蠣等分 右四味為末酒服方寸七日三

治蠟姑瘻方 先以泔清煮槲葉取汁洗瘡拭乾次以槲葉灰內瘡中

治蜂漏方論

初生狀如桃而瘻搔之則引大如雞子如覆手者熬鹽熨之三宿四日不瘥至百日成瘻其狀大如四五寸硬廣三寸中生蜂作孔乃有數百以石硫黃隨多少燃燒令汁出著瘡孔中須臾間見蜂數十蜂盡乃瘥

治蜂瘻方 以人屎蛇蛻灰臘月猪膏和傅之○又方 鷄頭燒灰傅之○又方 取蜂窠燒灰臘月猪脂和傅孔中

治蠟漏孔容鍼亦有三四孔者方 用喟皮肝心燒灰為末酒服一錢七○又方 死蛇腹中鼠以微月

以附用本上

治瘰癧漏橫閼作頭狀若杏仁形亦作瘰癧方

雄雞糞燒灰臘月猪脂和封之

治蟄蠅漏方 用牛屎燒灰臘月猪脂和傅之○又方 蟄蠅丸即蟄蠅所為未傳之

○又方 热牛屎塗之數易應有蟄蠅出

為未傳之癧即撥却更摩封瘥乃止○又方

乾牛屎

治蟄蠅瘻方 雞屎 蟄蠅屎等分

右二味為末用壯猪下領髓和傅之

治蟄瘻五六孔皆相通者方 捣茅根汁著孔中

治蛇瘻方 用五月五月蛇頭及野猪脂同水衣封之

治蛇瘻方 用蛇腹中蛇燒灰封之

治蛇瘻方 用蛇皮燒灰臘月猪脂和封之

治蛇瘻方 用蛇腹中蛇燒灰封之

治蛇瘻方 用蛇腹中蛇燒灰封之

治蛇瘻方 取母猪屎燒灰臘月猪脂和傅上當有蟲出如雀形

治蛇瘻方 以桃花為末猪脂和封之

治蛇瘻方 取母猪屎燒灰臘月猪脂和傅上當有蟲出如雀形

治蛇瘻方 以桃花為末猪脂和封之

治蛇瘻方 以大鉸鍼破之次用鼠粘葉二分為末和雞子白一枚封之

○又方 捣槐子和升花水封之○又方 捣生商陸根捻作餅子如錢大厚三分安漏上以艾灸餅

上乾易之灸三四升又瘻外臺灸

○又方 七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合搗作

炷用灸瘻上百壯外臺灸

灸法

九漏灸肩井二百壯 漏灸鳩尾骨下宛宛中七十壯 諸漏灸瘻周圍四畔瘻

諸惡漏中冷息肉灸

足內踝上各三壯 二年六壯 寒熱胸滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣胸中有音喉中鳴天池主之

江左書林發行

千金要方

附張路玉先生衍義

寒熱頸腫後谿主之。寒熱酸痛四肢不舉。腋下腫馬刀瘻。喉脾膝脛骨搖酸痺。不仁陽輔主之。寒熱頭脣下腫申脈主之。胸中滿腋下腫馬刀瘻。善自嚼舌煩天牖中腫寒熱。胸脇腰膝外廉痛臨泣主之。寒熱頸腫丘墟主之。腋下腫馬刀肩腫。吻傷太衝主之。寒熱頭瘻。大迎主之。五白骨治鼠漏及瘻瘞方。白牛皮。白馬屎。白猪屎。白羊屎。白雞屎。格一漏蘆二斤。右六味各于石上燒作灰研篩以猪骨一升三合煎亂髮一兩半令極沸盡消乃內諸末微火上煎五六沸約成去瘻。加以鹽湯洗淨帛拭乾傳此膏若無痂亦須湯洗日再敷若著膏當以帛裹上勿令中風冷神驗。曾青散治寒熱瘻瘞及鼠瘻方。曾青。桂子。礬石。一作附子。各半兩。桔梗根。露蜂房。當歸。防風。芎藭。黃芪。黃芩。狸骨。甘草。各二兩。細辛。乾薑。各一兩。斑貓。蛇青。各五枚。右十七味治下篩酒服一方寸七日再○又方。治寒熱瘻瘞方。土瓜根。連翹。龍膽。黃連。桔梗根。苦參。芍約。恒山。各一兩。右八味為末酒服五分七日三。一方有當歸無桔梗恒山。翼方及外臺有狸骨一枚翼。薔薇丸治身體有熱瘻瘞及常有細瘻并口中生瘻方。薔薇根。三兩。黃芪。石龍芮。防風。一作白斂。龍胆。各一兩。梔子仁。四兩。右十二味為末蜜丸如梧子大飲服十五丸。日再服。翼方有黃柏一兩。

治療瘻方用白殼蠶治下篩水服五分七日三服十日瘥○又方。狸頭一枚炙搗篩飲服方寸七日二○又方。故履內襪替燒末五七和酒一升平旦內日服之。强行須臾吐鼠出三朝服○又方。狸頭蹄骨等灸黃鵝篩為散飲服一錢七日再○又方。貓兩眼陰乾燒灰井花水服方寸七日再○又方。乾貓舌為末傅瘻上○又方。狼屎灰傳之○又方。孤頭狸頭灰傳之○又方。五月五日取一切種種雜草煮取汁洗之○又方。貓腦。莽草。等分右二味為末著瘻孔中。炎漏方。草薢子一合。政一升。右二味和搗令極熟作餅子如大錢厚二分許取一枚當瘻孔上作

蒜大小貼膿子上灸之勿令上破肉但取熱而已七壯

易蒜日日灸之取消止一切癰疽

灸兩脇裏

患癰處宛中日一壯七日止神驗

又炙五里人迎各三十壯

又灸耳後髮際直脈七壯

又灸

患人背兩邊腋下後文上隨年壯

行義

治九漏方已下至此凡六十餘方無大小一一類次靡遺所謂牛溲馬勃皆可收之藥籠也

腸癰

第二論三首

方二十九首

灸法二首

論曰卒得腸癰而不曉其病候愚醫治之錯則殺人腸癰之為病小腹重而強抑之則痛小便數以淋時汗出復惡寒其身皮皆甲錯腹皮急如腫狀其脈數者小有膿也巢氏病源云數者已有膿也其脈遲緊者未有膿也甚者腹脹大轉側聞水聲或遠脣生瘡或膿從脣中出或大便出膿血問曰官羽林婦病醫服之何以知婦人腸中有膿為下之即愈師曰寸口脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛數下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹痞堅小便或澀或復汗出或復惡寒膿為已成設脈遲緊即為瘀血血下則愈

大黃牡丹湯

大黃四兩

牡丹三兩

芒硝二兩

瓜子一升

桃仁

五十粒

右五味㕮咀以水五升煮取一升

頓服當下膿血

金匱方用

牡丹一兩瓜子半升

芒硝二合

刪繁方用

瓜子半升芒硝半合

劉涓子用

石三合云腸癰之病小腹痞堅或在膀胱左右其色或白堅大如掌熱小便欲調時自

汗出其脈遲緊者未成膿可下之當有

血脈數

膿成不復可下

肘后方瓜子湯

腸癰湯方

各三

瓜瓣

二升

右四味

㕮咀以水六升煮取二升

分二服

姚氏不用

桃仁用杏仁崔氏有芒硝二

飲食小便澀此病多是

腸癰人多不識

婦人產後虛

熱者多是此証總非癰疽但是

便服此方無傷損也

凡腸癰其狀兩耳輪

文理甲錯初患腹中

苦痛或繞脣

有瘡如粟皮熱

便膿血出似赤白下不治必死方

千金要方

卷二十三

附張路王先生衍義

三

汪左書林發行

以馬蹄灰雞子白和塗即拔毒氣不過再塗瘥○又方 以瓜子三升搗末水三升煮取一升半分三服○又方 以馬牙燒灰雞子白和塗乾即易

〔行義〕內癰癧證不早每多誤治之失嘗攷金匱大黃牡丹湯與平金無異者取大黃下瘀血血閉牡丹治瘀血留舍芒硝治五臟積熱滌去蓄結推陳致新之功較大黃尤銳桃仁治疝瘕邪氣下瘀血血閉之功亦與大黃不異甜瓜瓣別錄治腹內結聚成潰膿血壅於閉痰利氣為內癰脈遲潔膿未成之專約其後腸癰湯一方即金匱薏苡附子敗醬散之變方以治膿成脈數不可下之證金匱脈薏苡十分附子二分敗醬五分千金慮附子助熱易以牡丹又因敗醬難覓易以瓜瓣更加前方中桃仁以助牡丹之力又以小方之力雖再不若大方兼培津血故特立腸癰湯方已潰可以排膿未潰可以解毒良工苦心無以過之其餘丹方如馬蹄灰和雞子塗則有散血之功馬牙灰和雞子塗則有拔毒之用單服瓜瓣湯則有開痰利導之益故并存之

灸腸癰方 屢兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血即瘥

論曰產後宜勤擠乳不宜令汁蓄積蓄積不去便結不復出惡汁於內引熱溫壯結堅牽掣痛大渴引飲乳急痛手不得近成妒乳非癰也急灸兩手魚際各二十七壯斷癰脈也不復惡手近乳汁亦自出便可手助逆捋之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯外以小豆薄塗之便瘥 婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出浸淫為長百種治不瘥者動經年月名為妒乳婦人飲兒者乳皆欲斷世謂前抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傅二物飛烏膏及飛烏散佳若始作者可敷黃芩漏蘆散及黃連胡粉散並

佳

赤龍皮湯方 桤皮切三升以水一斗煮取五升夏冷用之冬溫用之分洗乳亦洗諸敗爛久瘡洗竟傳膏散

飛鳥膏方 傾粉是燒麻砂作水銀上黑煙是也一作細粉

礬石各三兩

右二味為末以甲煎和如脂傅乳瘡日三傅之作

散者不須和汁自者可用散其諸瘡瘍黃爛瘡浸淫汁癢丈夫陰蝕瘡濕瘡小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡癰瘡等並皆主之

黃連胡粉散 黃連二兩 胡粉二兩 水銀一兩

右三味為末相和粟皮裹熟接之自能和合縱不得成一家亦得水銀細散入粉中也以傅乳瘡諸溼瘡黃爛肥瘡等若乾者甲煎為膏

治妒乳乳生瘡方 蜂房 猪甲中土 車轍中土

各等

右三味為末苦酒和傅之

鹿角散 治婦人乳生瘡頭汁出疼痛不可忍者方

鹿角二分 甘草一分

右二味治下篩和以雞子

黃於銅器中置溫處灸上傅之日再即愈

治妒乳方 以葵莖灰搗篩飲服方寸七日三即愈

集驗方直搗為散不為灰

○又方 燒自死蛇為灰以豬脂和塗

大良

衍義

婦人經斷則有軀生育則乳子乳母有故則乳汁蓄積不出壯熱結痛便宜服連翹湯分利其熱外用赤龍皮湯及天麻草湯洗之飛鳥膏專祛膿垢黃連胡粉散兼收溼熱蜂房二王杜風解毒鹿角甘草散熱行血葵莖利竅通津蛇灰截風拔毒皆乳患小方之可採用者也

炙法

以蒲櫛度口以度從乳上行灸度頭二七壯

論曰產後不自飲兒并失兒無兒飲乳乳蓄結癰不飲兒令乳上腫者以雞子白和小豆散傅乳房令消結也若飲兒不泄者數稔去之亦可令大孩子含水使口中令為嗍取滯乳汁吐去之不含水漱去熱喜令乳頭作瘡乳孔塞也 凡婦人多患乳癰年四十已下治之多瘥年五十已上慎勿治治之多死不治自得終天年

連翹湯

治妒乳乳癰方 連翹

芒硝各二兩

芍藥

射干 升麻 防己

杏仁 黃芩 大黃

柴

胡

甘草各三兩

右十一味㕮咀以水九升煮取二升五合分三服

衍義

妬乳乳癰總以清熱利竅解毒為主連翹治癰腫惡瘡甘草治臟腑邪氣黃芩治惡瘡疽癰芍藥治血痹止痛射干治胸中結氣杏仁治產乳金瘡升麻治風腫諸毒柴胡治腸胃結氣防已行通十

二經大黃下瘀血歸芍硝破五臟積熱上下宣通而乳癰解矣

治乳癰方

麥門冬一升

黃芩

芍藥

茯苓

各二兩

桑寄生

人參

黃芪

防風

甘草各三兩

粘糖八

兩

大棗五枚

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓內糖一沸分四服

衍義

連翹湯治乳癰全盛之實故用硝黃此方治乳癰清後之虛故用參芪佐以芩防兼清風熱助以東糖專資津氣門冬清膈上之熱茯苓調心下之虛芍藥和血斂陰寄生去風逐溼甘草治五臟六腑寒熱邪氣也

又方 先服前湯五日後服此丸即愈方

天門冬五兩

澤蘭

五分

大黃

十分

升麻

六分

羌活

桑寄生

防風

人參

黃芪

乾地黃

白芷

通草

各二兩

黃芩

枳實

五味子

茯神

天雄

芍窮

當歸

各一錢

右十九味為末蜜丸酒服二十九日二加至四十九

衍義

乳癰服湯不瘥元氣漸衰邪毒愈熾以故補瀉兼施益以天雄亟通乳竅蜜丸酒服緩行諸藥之力

治乳癰始作方

廣濟方云治乳癰大堅硬赤紫色衣不得近痛不可忍者

大黃

棟黃

芍藥

馬蹄

各等

寸七取汗出瘥

廣濟方云酒服方寸七

覆取汗

膏睡

者覺後腫處散而不痛

經宿乃消

衍義

乳癰始作勢在亟攻故用棟黃佐大黃導溼熱下走芍藥助馬蹄以斂津使不隨毒邪散漫也

人方

黃芩

白斂

芍藥等分

右三味為末

以漿水飲服半錢日七三若左乳汁結者即捋去左乳

汁若右乳汁結者可捋去右乳

外品云

鹿角生坐而未服此其消腫散血乳癰用之最捷

疾藜丸

治婦人乳腫痛方 疾藜子

大黃兩一敗醬三分薏苡仁 桂心

人參 附子 黃氏

黃連 雞骨當歸 芍藥 枳實

通草各二

右十四味為末蜜丸如梧子大未飲食服三丸不

知益至五丸日三無所忌 一方無大黃敗醬黃連通草為散酒服方寸七

行義

方用大黃黃連解熱桂心附子散結人參黃芪固本當歸芍藥和營敗醬薏苡敗腫枳實通草利竅尤賴疾藜破除惡血雞骨引入厥陰也

排膿散

治乳癰除惡肉方 茼容 鐵精 桂心 細辛 黃芩 芍藥 人參 防已

一作當歸

乾薑各二 甘草五分

右十一味治下篩酒服方寸七日三夜一服約十日膿血出多勿怪○又方

生地黃

三升 芒硝 三合 攝一升

右三味合搗傅上熱即易之取瘥止一切癰腫皆用之 一方單用

地黃傅之

行義

乳癰潰久不愈元氣大傷血氣凝滯致生惡肉故用蓴容歸芍人參甘草護持元氣細辛桂心

乾薑溫理伏邪防已通行經脈鐵精鎮攝虛火黃芩清解風熱并緩桂之性庶不隨膿外脫外用地

黃芒硝香豉傅之惡肉可漸化矣

治乳癰方

大黃 鼠屎新者各一分 黃連二分

右三味為末以黍米粥清和傅乳四圍痛止即愈無黍米

即粟米梗米亦可○又方 大黃 莪草 生薑各二 伏龍肝半升 右四味搗為末以酢和塗乳痛即止

行義

大黃黃連辟除毒熱鼠屎通厥陰經為乳癰之藥

又方以大黃消腫熱葎草祛風毒生薑

消脹滿伏龍肝和營血醋和塗乳取其酸收即漿水服散之義

又方

取葱自搗傅之并絞汁一升頓服即愈

治乳癰二三百日衆療不瘥但堅紫色青柳根熨方 以柳根削取上皮搗令熟敷令溫盛者練囊中熨乳上乾則易之一宿即愈

治如乳乳癰腫方 取研米楂一枚炙令熱以絮及故帛搗乳上以楂更互熨之瘥止已用立效

治乳癰堅方 以水罐中盛醋泔清燒石令熱內中沸止更燒如前少熱內乳清之及冷更燒石內清不

遇三度燒石愈

行義

葱白搗傅取其通竅

柳根溫熨取其解毒

焙楂熱熨取其溫散

醋泔溫漬取其酸斂各

有妙用鄉村無約處宜之

五痔第三

論一首
灸法二首

方二十六首

論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脈痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿血出牝痔者肛腫痛生瘡脈痔者肛邊有瘡瘍痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便圊血隨大便汚衣又五痔有氣痔寒溫勞溼即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如鼠乳在孔中頗出見外妨於更衣鱗甲主之牝痔集驗作酒痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血蛻皮主之腸痔更衣挺出久乃縫母猪左足懸蹄甲主之脈痔更衣出清血蜂房主之五痔皆下節等分隨其病倍其主藥為三分旦以井花水服半方寸七病甚者旦暮服之亦可四五服禁寒冷食猪肉生魚菜房室惟食乾白肉病瘥之後百日乃可通房內又用約導下部有瘡內約瘡串無瘡內孔中又用野葛燒末刀圭內藥中服藥五日知二十日若三十日愈痔痛通忌尊采

行義

痔漏皆由溼熱所致故昔人嘗以雨過溼蒸生菌譬之千金首取血肉之物分治五痔獨不及血痔者以散血之約頗多如犀角馬蹄牛鰐蟲廩之屬皆可取用又以野葛燒灰略入劑中者專取毒

少之生以攻贊疣蜀蕷菜為痔家切禁者惡其傷殘陽氣而之

力也

腹飲下十五九日二若劇者復一服四日肚邊癢止八日膿血盡鼠乳悉瘻滿六十日終身不復發久服益善忌魚肉等

行義 草根木實之可以辟除溼熱者痔家恒取用之如秦光白芷藁本紫參皆風熱藥紫苑實眾厚朴雷丸散結滯藥亂髮猪蹄蟲麩破積血藥獨石南一味為腎家風藥腎主二便特取以祛下焦風毒也

槐子散 治燥溼痔痔有雄雌皆主之方 槐子

乾漆 泰丸 吳茱萸根白皮各四兩

白芷 桂心 黃芩

黃氏

白斂 牡蠣 龍骨 雷丸 丁香 木香 疾藜子 附子各二

右十六味為末蜜丸如

梧子大飲服二十九日三千金翼無白斂深師無黃氏云治若暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有

鼠乳附核者有腸中煩癢者三五年皆殺人主忌飲酒及作勞犯之即發

行義

方中疾藜白芷秦光黃芩除風氣槐子白斂清解毒邪二香桂附吳茱萸根溫散結滯乾漆

雷丸攻逐瘀血牡蠣龍骨黃氏收斂津氣以其寒熱間錯氣血交攻斂散並列故牡痔牝痔氣痔血痔乾痔溼痔咸可治之

小槐實丸 治五痔十年者方 槐子

三斤 白糖 二斤 磬石 硫黃各一大黃 乾漆

龍骨各十兩 右

七味以四味搗篩其二種石細切及糖內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁和約末併手丸如梧子大陰乾酒服二十九日三稍增至三十九

行義

味雖略減而寒熱斂散血氣之药靡不畢具不同蜂蜜而用飴糖者取其專滋穀藏也

槐子酒

治同前

槐子二斗 槐東南枝細剉

一石

槐東南根細剉

三石

右三味內大金中以十六斛水煮取五

斛澄取清更煎取一石六斗炊兩斛黍米上糊二十斤釀之攪令調封泥七日酒熟取清飲適性常令小小醉合時更取滓煮取汁淘米及洗痔不得用水忌生水故也

行義

槐乃虛宿之精寒而不滑兼取三槐益腎清火為痔家之專藥惟中氣虛寒慎用

又方 塗熊胆取瘥止神良一切方皆不及此○又方 七月七日多採槐子熟搗取汁內銅器中重縣密蓋著室中高門上曝二十日已上前成如鼠屎大內穀道中日三亦主瘻及百種瘻○又方 取生槐白皮十兩熟搗丸如彈丸綿裹內下部中此病宜常食萹竹葉及煮羹粥大佳○又方 取鯉魚腸三具以火炙令香縣裏內穀道一食久蟲當出食魚腸數數易之盡三具瘥○一方炙腸令香坐上蟲出經用有效○又方 虎頭 犀角 右一味為末和不中水猪脂大如雞子塗瘻上取瘥

治五痔及脫肛方

槐白皮 二兩 猪脂 半斤 榆子

桃仁 各十粒 巴豆 七粒 薰草 一作薰黃 半兩 辛夷

右十味㕮咀前三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五過蟲死瘻止瘻痛大佳

治五痔方 猪皮 二兩 乾地黃 五兩 大切指薰黃如棗大未熟父子大如雞子大

右三味穿地作孔調和取便熏之口中熏黃烟氣為佳

火氣消盡即停停三日將息更熏之凡三度永瘥勿犯風冷瘻臤將補慎猪難等○又方 取槐根煮洗之○又方 用桃根煮洗之

治五痔方散瘀祛毒 猪皮三味熏痔透毒 槐根取其化蠶 桃根取其散血皆外治法也

蝟皮丸 治痔方亦治漏

蝟皮 一具 磬石 當歸 連翹 乾薑 附子 繢斷 黃芪 酥 二 槐子 三兩

乾地黃 五兩 右十味為末蜜丸如梧子大飲服十五丸日再加至四十九丸集驗方無

衍義 痔漏經久氣血凝故用薑附溫散結滯歸氏續地調和血氣連翹槐子清解熱邪以助蝟皮

磐石滌除毒垢之力

又方 治崩中及痔方 蝟皮 人參 茶芩 白朮 禹餘糧 乾地黃 槐耳 繢斷 各三 清黃

黃氏 當歸 木葉 橘皮 白斂 甘草 酥 二 白馬蹄酒浸一牛角總各四漫籠內消二十首