

一痘瘡房中凡諸臭穢腥香之氣及僧道師巫之人或罵詈呼
怒震驚歌樂掃地對面搔癢對面梳頭之類皆不可不避

一房中欲辟臭穢惟燒辟邪丹或紅乾棗或黃熟香皆佳若蒼
朮之氣則太峻也

一飲食最宜調和無使太過不及或好食何物有不宜者但少
與之以順其意若禁固太嚴使之忿怒恐反助火邪但不可
縱耳至若助火生風及葱蒜泄氣等物皆所當慎

一痘瘡前後大忌猪肉魚酒之類恐惹終身痰欬

一痘瘡平復之後勿與雞鴨蛋食之則傷神

一痘疹退後須避風寒戒水濕如犯其邪則終身欬嗽患瘡無有休日

東垣曰痘瘡宜避一切穢惡氣及外人入房遠行勞汗氣腋下狐臭氣房中淫液氣射香臊羶氣婦人經候諸血腥臭氣硫黃蚊烟氣廁缸便桶氣誤燒頭髮氣吹滅燈燭氣雞毛魚骨氣葱蒜韭薤氣已上皆不可犯須要時常燒乳香之類甘香之氣使之漸聞則營衛氣暢可無創醫陷伏等患

陳氏曰凡痘疹熱渴切不可與瓜柿蜜水等冷物及清涼飲消

毒散等藥恐損脾胃則腹脹喘悶寒戰咬牙而難治○輕變

重者犯房室不忌口先曾瀉飲冷水餌涼藥也重變輕者避風寒常和煖大便稠也

薛氏曰前證若兼吐瀉手足指冷屬內虛寒而外假熱也最忌寒涼若大便不通渴欲飲水則蜜水之類又當用也但當審其熱之虛實可也今北方出痘多有用水無不愈者蓋北方多睡熱坑故也

出不快 三二

陳氏曰凡痘瘡出不快者多屬於虛若誤謂實熱壅盛妄用宣利之藥致臟腑受冷營衛澀滯不能運達肌膚則不能起發

克滿亦不能結實成痂後必痒癢煩躁喘渴而死

薛氏曰前證亦有各經熱盛壅遏而出不快者亦有毒甚痘疔而不能起發者亦有餘毒而潰痒者當細審其因而藥之

景岳曰按此二子之說皆爲有理但此出遲不起之證總是氣血內虛不能速達者爲最多若風寒外閉及痘疔留毒而不出不起者雖亦有之但不多耳再若各經熱盛而壅遏不出者則尤爲最少何也蓋熱盛者毒必盛毒盛者勢必疾速而或密或早無能緩也故凡治此者必當察其熱之微甚以辨虛實再察外邪之有無以辨表裏如無外邪亦無痘疔而火

邪不甚者則盡屬虛證宜從溫補不得雜亂以遺後患也諸治法詳報痘三朝治款中

陷伏 三三

凡看痘之法其出欲盡出不盡者伏也其發欲透發不透者倒陷也其收欲淨收不淨者倒靨也伏惟一證陷有數種凡毒之伏者患在未壯之先其人瘡雖出而熱不少減或煩渴或躁悶此必有伏毒未得全出也陷則患於既壯之後其血漸乾而變黑者謂之黑陷漿膿未成而爲痒癢或破損者謂之倒陷漿膿既成而復濕爛皮破不肯結靨收不乾淨者謂之

倒靨亦陷類也是皆惡候凡治此者使非猛峻之劑安能望其回生時醫欲以尋常之藥救此危病其猶放雀搏鷁驅羊敵虎耳故其輕者宜奪命丹重者宜神應奪命丹則其庶幾乎耳倘服藥後而反增黑色者爲必不治之證

痘之留伏毒不盡出者證有不同當辨治之○有元氣不足而托送無力者此必稟賦素弱飲食素少身無大熱而出有不透卽不足之證也宜十宣散蟬退膏之類加獨聖散主之○若虛而有熱者宜人參透肌散○有毒盛氣滯留伏經絡而出不透者必其人氣體厚濁身有大熱而汗不易出卽皆

有餘之證宜荊防敗毒散主之○若表裏俱實外有大熱內有秘結煩滿而留伏不透者宜雙解散

一乾黑不起而倒陷者當分五證○一則內虛而陽氣不能外達故致出而復沒或斑點白色或見灰黑倒陷者必其人不
能乳食或腹脹內寒或手足冷或吐瀉或寒戰咬牙皆內虛
也速宜溫中輕則十宣散六氣煎甚則陳氏十二味異功散
或九味異功煎外用胡荽酒噴之或更用十全大補湯但得
冷者煖陷者起黑者紅活便是佳兆若服藥後而反加煩躁
昏亂者死○二則毒氣太盛內外薰灼不能盡達於表因而

復陷於裏乃致熱煩躁擾氣喘妄言或大小便不利渴而腹
脹是皆毒氣之倒陷也輕者利小便宜大連翹飲通關散或
四順清涼飲甚者通大便宜承氣湯並外用水楊湯浴之得
利後瘡出則佳更用加味四聖散調治之凡治此者但得陽
氣不敗脾胃溫煖身溫欲飲水者生若加寒戰身冷汗出耳
尻反熱者死○三則外感風寒肌竅閉塞血脈不行必身痛
或四肢微厥斑點不長或變紫黑如癰疹者此倒伏也宜溫
肌散表用桂枝葛根湯加麻黃蟬退或紫草飲外用胡荽酒
噴之但令溫散寒邪使熱氣得行則痘自長矣○四則或因

誤下毒氣入裏而黑陷者先宜六氣煎或溫胃飲以培養胃氣如表有未解者後宜柴葛桂枝湯以疎散於外甚者再加麻黃○五則以房室不潔或爲穢惡所觸而黑陷者宜內服紫草飲子外用胡荽酒噴之或用茵陳薰法并用辟邪丹

一將起發時雖有漿水但色見黑黯者最爲可畏急宜六氣煎加川芎以養血氣血氣旺則毒自散而色自活矣或以十全大補湯合無價散主之

一凡倒靨之證亦須看大便何如若大便秘結而內熱者宜利之以四順清涼飲或三黃丸主之○若大便不實而內不熱

者宜補之以六氣煎或十全大補湯加防風白芷甚而泄瀉者宜陳氏十二味異功散○有雖不泄瀉而虛寒甚者宜九味異功煎並外用敗草散

一治陷伏證有三驗法凡服藥之後但得陷者復腫漸以成膿乃一驗也若原瘡已乾而別於空處另出一層起發成膿漸以收靨者二驗也亦有不腫不出只變自利下去膿血而飲食精神如故者三驗也有三驗者吉無則凶

痒癩抵破

三四

訣云虛則痒實則痛又曰諸痒爲虛此固其辨矣然實卽兼熱

也虛卽兼寒也蓋如瘡瘍之痛必由乎熱今不作痛而作痒此其無熱可知無熱由乎陽虛陽虛便是寒證諸有以初起作痒爲火者皆謬也且凡痘瘡發痒則多爲不起不灌而瀉陷繼之最可慮也故凡治痒之法雖云當補然尤不可不溫惟溫補則營衛和氣血行而痘自起矣痘毒旣起而透則多有作痛尙何痒哉故痘於起發之時則宜痛不宜痒也然痒有數證亦當辨治如左

一痘瘡初見點便作痒者此邪在半表半裏之間而進退遲疑總由元陽無力欲達不能也速當溫補陽氣兼以疎散但使

腠理通暢則痘自起而痒自止矣宜六氣煎加川芎白芷防風荆芥之屬○若虛在血分而色白者宜六物煎或五物煎加減主之

一痘瘡出齊之後但是作痒俱宜保元湯或六氣煎加川芎當歸防風荆芥治之或用十全大補湯或用蟬退膏

一血滲肌膚臃蜚皮肉而作痒者亦以氣虛而然宜保元湯加芍藥當歸以制血或加丁香以治裏官桂以治表表裏俱實自不作痒

程氏曰凡前後痒癩宜保元湯加何首烏牛旁子白芍藥何首

烏須赤白兼用

一痘瘡乾而作痒者宜養血潤燥以五物煎加防風荆芥外用茵陳薰法

一痘瘡濕而作痒者宜補氣去濕以四君子湯加防風荆芥桂枝以解之外用茵陳薰法

一頭面爲諸陽之會若痒而拆破則泄氣最甚速宜六氣煎或十全大補湯加防風荆芥何首烏之屬以培補之但得復腫復灌而飲食如常則無害若痒不止而滿面拆破者必死

一遍身發痒拆破膿血淋漓者宜參芪內托散倍加當歸及白

正荆芥木香使氣和血行其痒自止外以敗草散敷之

一瘡痒潰爛粘衣連蓆難任者內服十全大補湯加防風荆芥外用敗草散

一痘瘡見形而皮肉紅艷起發而皮嫩多水者其後多致痒癩也急須先期調補之

一痘瘡將收而痒者其膿已成其瘡已回邪散而正復營衛和暢故痒也不須服藥但謹護之勿令抓破以致損傷成瘡

一漿膿初化膿未成而混身瘙痒不寧者此惡候也速當溫補氣血用六氣煎六物煎之類加以防風白芷荆芥之屬必令

痒去方保無虞若痒甚不休瘡壞皮脫其毒復陷謂之痒癩
必不能活矣

活勿心書云凡作痒不止用荆芥穗以紙束之用刺痒處以散
鬱邪其痒自止此屢驗之法內服消風化毒湯加參歸以解
之

作痛 三五

痘瘡作痛有實有虛雖曰諸痛爲實然此言亦不可執若身有
大熱而大便秘結煩躁不寧喘脹作渴而爲痛者此實痛也
若無大熱而二便清利脾氣不健衛氣不充營失所養而作

痛者此虛痛也實者宜解毒清火當用解毒湯或四味消毒
飲之類主之虛者宜補養血氣當用保元湯或六物煎之類
主之

頭面腫 三六

經曰熱勝則腫大抵毒盛者必腫毒微者不腫故亦可以腫與
不腫察毒之甚與不甚也然痘瘡應期起發毒必以漸盡出
故頭面亦必以漸浮腫此毒火聚於三陽之分欲化膿漿其
宜然也然止宜微腫而甚腫者大非所宜○若當起發之時

頭面全然不腫必其痘稀磊落毒氣輕淺者然此最吉兆也

頭面全然不腫必其痘毒未發今車治之
一痘以漸起面以漸腫及灌膿收靨而腫以漸消此常候也如
應腫不腫者必其元氣不足應消不消者必其毒氣有餘須
急治之

一有痘未起發而頭面預腫皮光色嫩如瓠瓜之狀此惡毒上
衝之候也又有痘點已見但隱隱於皮膚之中肉日腫而痘
不起者決死○汪氏理辨曰痘起五六日之際有面目先腫
而光亮者是陽乘陰分毒不能發也何也血乃氣之本氣乃
血之標血有不足則根本之力已虧故致虛陽動作其氣妄
行肉分區區不足之血何能載毒而出七日之後傳經已足