

洞天奧旨卷之九

山陰陳士鐸敬之甫號遠公著

曾孫陳鳳翔羽儀持梓

會稽陶式玉尚書號存齋評

玄孫增方溯洞氏校

杖瘡

杖瘡受官刑而成瘡也。氣血有餘易于生合。氣血不足難于化消。倘受刑少者血不凝滯。受刑多者血必穢淤。受刑輕者氣不蕭索。受刑重者氣必敗殘。蓋刑輕刑少。忍痛而斷不叫號。刑重刑多。悲傷而自多涕泣。此氣血所以愈虧。

也倘受刑之先身體原弱而不強則惡血奔心往往有死者必湏活其血而補其氣敗其毒而消其火然後外用膏藥貼之或末藥敷之不至死亡也

調中化淤湯 巫彭真君傳內治杖瘡神效服之無

性命之憂

當歸 五錢 生地 五錢 三七根末 三錢 丹皮 二錢

白芍 三錢 生黃芪 三錢 生甘草 一錢 大黃 一錢

枳殼 三分 虛極者加人參 三錢 水一碗童便一碗

同煎服二劑淤血即散外用末藥膏藥貼之即愈

仙花散 外治杖瘡

鳳仙花葉

搗汁

馬齒莧

搗汁

黃蠟 二兩

葱白

搗汁

松香

二兩

五倍子

爲末

一兩乳香 二錢 將鳳仙

葱莖先搗取汁二碗將黃松香熬膏入倍子末攤

膏貼之自愈

禿瘡

禿瘡乃足太陽膀胱督脈二經受濕熱故生蟲作癢其實亦因父母生兒之前不節色慾或服熱藥浪戰頻頻泄精以致胎中受毒不能卽散而小兒之首受之毒輕者瘡輕

毒重者瘡重既生之後小兒或食煎炒之味或多殮水菓
或多受暑風而頭上禿瘡因而生蟲痂高堆起白屑滿盈
終年累月而不愈矣瘡輕者外治卽痊瘡重者必須內外
兼治庶易愈也世人多不急治所以多昇竟至蟲蝕髮盡
成爲禿子耳

蝸蜂丹

外治禿瘡

蝸牛

十個

黃蜂窠

錢二生

甘草

錢一

白礬

一錢

將蝸牛

搗爛塗禿遍透後將下三味研爲細末猪油調敷

如用熊油調搽更妙

清苴湯 內治禿瘡

玄參 三錢 生甘草 一錢 茯苓 一錢 白芷 一錢

山荳根 五分 紫草 一錢 黃柏 一錢 蔓荊子 一錢

白蒺藜 一半 夏 五分 水煎服四劑後以前方外治

無後患也此方以十歲爲準年小減之

魚臍瘡

魚臍瘡生于肘肚乃手少陰心經也此處屬少海靈道之穴生于小腿肚者乃足太陽膀胱經也此處屬承山飛揚之穴上下二處之瘡其疼痛皆甚初起一二日先用灸法

最易解散心經多氣少血膀胱經多血少氣少血者宜補血以消毒少氣者宜補氣以消毒然氣血雙補而佐之消毒之藥更佐以引經之品何瘡之不速愈乎俗名魚臍疔治法正同耳

化魚湯 巫彭真君傳治魚臍瘡疔不論肘腿俱效

金銀花 一兩 當歸 五錢

生甘草 二錢 青黛 二錢

地榆 二錢 白礬 一錢

生黃芪 五錢 水煎服

陰包毒瘡

陰包瘡生于大腿內腠之上乃足肝經風熱之毒也肝木

多血少氣之經若生此瘡必然疼痛治法必須補氣以解風熱則已潰未潰尤易散也外用膏藥貼之更效如神

黃芪散陰湯 治腿內外股瘡毒疽癰

生黃芪

五錢

柴胡

一錢五分

白芍

五錢

炒梔子

一錢五分

大力子

一錢

甘草

二錢

連翹

一錢

金銀花

一兩

肉桂

三分

薏仁

五錢

半夏

一錢

水煎服

燕窩瘡羊鬚瘡

燕窩瘡生于腦後項之窩乃足太陽兼督脈之經也羊鬚瘡生于下唇下巴骨之處乃任脈之經承漿地閣穴道也

兩處生瘡多是感犯濕氣濕久則熱熱久則毒難化矣于是氣血不通濕熱不散而瘡有經月不愈者在小兒尤多倘內服除濕清熱之味以消太陽在督之毒外用藥搽之或搽之則瘡即結靨而愈矣

除濕清熱散 家傳內治燕窩瘡羊鬍瘡神妙

茯苓 二錢

炙甘草 一錢

白朮 一錢

白芷 五分

蒲公英 一錢

澤瀉 一錢

猪苓 一錢

蒼朮 一錢

羌活

五分

天花粉

一錢五分

水煎服

神異丹 巫真君傳外治燕窩羊鬍瘡最妙

輕粉 一錢
兒茶 三錢
黃丹 二錢
炒黃栢 三錢

枯礬 五分
冰片 三分
各爲末濕則乾摻乾則用麻

油調敷數日卽愈

胎毒瘡戀眉瘡

瘡生于頭上眉上終年終月而不愈皆受母胎之毒也似與禿瘡相同然而禿瘡止生于頭而不生于眉也今頭與眉俱生尤胎毒之重者也故禿瘡可以外治而戀眉之瘡必湏內外兼治倘瘡止生頭上用清首湯妙矣或兒畏湯劑不肯吞服亦可止用蝟蜂丹外治無不愈者若頭眉俱

生必須先服清首湯另用釋眉丹外搽不至踰纏歲月也

清首湯 治胎毒瘡

載禿瘡門

釋眉丹 治戀眉瘡

黃連

五分油調塗

皂礬

一分輕粉一分末

冰片

半分末

麻油少許再調塗之數次全愈或用膠

髓膏亦神效載在奇驗方門

肺風瘡鼻瘡

肺風齕鼻瘡生于鼻面之間乃肺經之病也夫肺開竅于

鼻肺氣不清而鼻乃受害矣鼻既受害遂沿及于面世人不知肺經有病或冷水洗面使熱血凝滯因結于面而生瘡矣治之法必須清肺氣而兼消其風活肺血而再祛其火然後用搽藥外治未有不速痊者也

加味甘桔湯 治肺風齕鼻瘡

桔梗 三錢 甘草 一錢 甘菊 二錢 青黛 二錢

茯苓 三錢 白附子 八分 天花粉 二錢 白芷 五分 水煎服

杏黃散 載後

粉花瘡裙邊瘡

粉花瘡生于人面。窠癭生癢。乃肺受風熱也。此瘡婦女居多。蓋綾面感冒寒風。以致血熱不活。遂生粉刺。濕熱兩停也。裙邊瘡者。亦婦女生于內外足踝之骨。或裙短而不能遮風。又不慎房帷。乃致足寒而濕熱不行。凝滯而生瘡也。粉花瘡輕于裙邊。以上濕易散。上熱易化。而下之濕熱未易消也。故粉花瘡止消外治。若裙邊瘡必兼內治始妙也。

二粉散

載後

大風膏

載後

五色湯

巫彭真君傳內治裙邊瘡

茯苓 二錢
薏仁 三錢
黃柏 一錢
黃芪 三錢

荆芥 一錢
紅花 一錢
烏柏根 三錢
白礬 一錢
水煎服

服數劑外用大風膏調搽自愈

臟毒痔漏瘡

痔瘡生于谷道肛門之邊乃五臟七腑受濕熱之毒而生者也故瘡亦甚多形亦不一有狀似菱角者有狀似蓮花者有狀似穿腸者有狀似鼠奶者有狀似花瓣者有狀似蜂窠者有狀似懸珠者有狀似鉤腸者有狀似核桃者有狀似栗子者有狀似雞冠者有狀似珊瑚者有狀似擔腸

者有狀似垂珠者有狀似雞心者有狀似牛妳者有狀似
羊妳者有狀似串鬻者有狀似翻花者有狀似氣突者有
狀似血射者更有外無形而內苦者有內外俱無形而齊
苦者摠之初生之時形小久則形大矣初有形之時痛尚
可忍久則痛不可忍矣雖痔之形狀甚多而犯濕熱則一
也夫濕熱亦易消之病何愈消而愈痛乎皆因不守禁忌
貪色慾而不止饕食味而無窮遂至痔變爲漏矣痔易治
而漏難治也蓋痔有諸形之異而各無孔竅之破服藥尚
無漏卮之虞一至成漏服飲食則泄氣矣吞藥餌則損血

矣血損氣泄何能成功哉况好色者多墮慾者少欲奏異
績實非易事且肛門糞口上通大小之腸前達任脈後達
督脈其皮肉橫中有直正中有斜一經破損難于生合且
成漏卮損傷皮肉尾閭不開其何能合乎人肯節慾則漏
猶未甚而無如明知故犯者又甚多乎所以漏病之輕重
專分于慾事之多寡大約漏病有八一日氣漏二日風漏
三日陰漏四日冷漏五日色漏俗名痔漏六日血漏俗名
熱漏七日偏漏俗名瘻痞漏八曰痿漏俗名痿腮漏氣漏
者時腫時消疼脹難忍也風漏者孔竅作癢也陰漏者男

婦陰內疼痛出水也冷漏者孔內出白膿也色漏者犯色
流膿流精也血漏者時流鮮血也偏漏者肛門之外生孔
竅出膿血也痿漏者瘡口黑爛出黃黑水也世以治法多
用刀鍼掛線益增疼痛反耗氣血若不節食斷色未有能
生之者或用薰洗點搽之藥多有愈者然內無藥餌療之
亦虛歲月矣人能絕嗜慾慎氣腦澹滋味內服丸散外用
洗敷雖老人尚易奏績矧中年者哉漏瘡多生于肛門谷
道然亦有生于身上面上手足之上者此皆生他疽他毒
久已收口不慎色慾泄精以傷化氣血一泄不已又泄又

不已至于三泄而瘡乃成管終年流水流膿變成漏矣此等漏瘡較谷道肛門者少輕惟生于胸膈者頗重必須大補氣血斷慾半載加之補漏神丹服之則愈

瑜羊丸

仲景張真君傳治痔瘡各痔無不神效

地榆

二兩

當歸

三兩

羊蹄後壳

三副
土炒

共爲末飯爲

丸日三服于末飲食飯前服之每服三錢一月卽

愈不再發地榆出臟之濕熱也當歸補新血也羊

蹄設直達于直腸故用此爲使且此物亦去濕熱

故相濟成功