

幼科指掌全

解經書屋



幼科指歸全



敘

萬物襍然於天地間靡不藉

培以生長也人為萬物之貴

且藉於源培其不當比羣物而

更重歟重其何重之以財也不

重於既生之後亦不重於初生



北京中医药大学图书馆版权所有

之日必也重於未生之先焉
人當未生之先則形無影迹
何濟之溢何培之此說未免鑿
矣此也蓋左氏之自為所培
女當其胎胎在腹節飲食慎字
具毋傷淫佚勿過憂怒各一而

胎前培之道雖前培其外而
培其胎此慎重胎元先宜
於其母令其氣血清和根基
厚及至分娩而後再加以
弄乳擦洗哭睡在得法來
不易生而易育縱或有病亦易



治耳夫人之初生於地也如水

上之泡草根之露由地七情

以之擾外去其味八珍之侵此

有風涼濕燥熱迷等怔毒腫此

先於胎中稟受其所以來也

而不詳其所以平日滋培若何



而盈浪以治所謂唾病則減唾
矣宜懼乎乍投生門旋歸地府
也至於望色察紋並要週轉以
及三指之脈亦已分別十餘則
誼陰平國或撮引成主或融泰
臆解或此未盡明他復詳論彈



心竭力於覓掛一漏萬特用
為津梁可也茲彙症尤多科極
大因期余於乾隆丙午裁托跡
京師受託宣事七功編茲彙
會通授梓行世因時旨他聘但
行波校對未確言盡不克亥取



汝携板南還坡未續刷茲復詳
示正訛彙函付墨自知庸之陋
而謬存仁壽之心不禁由天
教一得之愚爾八十老人無田

平鼎書



北京中医药大学图书馆版权所有

幼科指歸卷一目錄

小兒下生慎重看養之法

小兒初生逐次蒸裏轉運十二經絡法

小兒蒸裏已週治論

小兒一週之後治論

面部正色當合四時參觀論

氣色生尅治法論

按計蒸裏論

預防疳風法

辨芽兒裏蒸不洩治法

蘇防飲

荊蘇飲

清風涼膈飲

大清涼飲

開鬱散驚飲

戒乳母自慎調攝論



觀面部辨色主證并圖

三指脈法

一歲以後看虎口三關脈手指圖

觀十三指圖形主證

第卷二目錄

體認急驚慢驚慢脾風說

急驚風證辨

慢驚風證辨

驚風諸症治法

加減瀉青方

加減瀉白方

加減瀉黃方

加減瀉心方

益黃散

人參安胃方

平胃散

四君子湯



錢氏異功散

二陳湯

上^清追風化痰丸

天麻防風散

溫脾飲

加減參蘓飲

惺惺散

清胃飲

黃芩清肺飲

清火安神飲

十全丹

鉤藤飲

加減抱龍丸

五淋散

和保湯

濟生犀角地黃湯

滋腎飲

人參平肺飲

加減參麥飲

白朮散



龍胆瀉肝湯

抑肝散

梔子散肝飲

柴胡清肝飲

小柴胡湯

蕪荑散

保生蛔虫方

溫中丸

宣明柴胡飲

歸脾湯

八珍湯

十全大補湯

十全丹

蟾蜍丸

柳華散

牛黃丸

治重舌疔方

發搐症

癩癧症

胎孩鬼眼法



五臟虛實寒熱

五臟相勝症

通論幼科用藥之宜

名辨驚風癲癇病名

治癰症此方

通經升解湯

清風豁痰飲

清火散解方

固元散大方

扶正清解方

地龍散解丸

甘遂治癰丸

治此癰痰盛方

沉香天麻方

久癰連綿不除方

虎睛丸

牛黃散解丸

紫河車丸

消痞肥兒丸



幼科指歸卷一

南城曾

鼎香田氏輯訂

小兒下地慎重看養之法

小兒生時胞衣隨胎而下者最妥否則胞衣後下將兒抱好用紙撚燒衣痕帶斷下以草紙墜住胞衣小兒即用荷葉熬水候溫洗擦水不可熱亦不可太冷用舊紬入水浸濕擦兒自上至下順行輕擦不可橫擦恐傷內氣速行爲妙恐其受寒燈火不可亂用前胸兩乳肚腹萬不宜用速令色裹令其安睡後哭哭後睡听其自然切不可動之哭則清氣升睡則濁氣降胸腹之間上下左右氣貫通俟解過胎屎對週一日夜方可開乳倘



南京中醫藥大學圖書館版權所有

開乳過速胎元惡氣留積在中多有臍風驚搐胸滿五癇等症
若已過一日夜則胎中穢惡俱逆解與哭升降俱清氣血易調
然後開乳不唯生下少病長大亦且心靈開乳之前先用青細
布一塊茶浸輕緩洗擦舌上正中兩旁牙根上下唇吻勿令吞
下其布擦一下即洗淨再擦之洗三遍仍令復睡醒後再用一
次即用真雅州野連一分無則改用雲連酒炒乾一次乳炒乾
二次連要去蘆加葱白一寸用河水蒸好至過一日一夜方可
服之時宜溫喂以小茶匙半匙停刻又喂半匙緩之喂以五匙
而止再令其睡醒後再喂一匙將乳緩之喂以五匙不可過多
听其熟睡醒來仍前再喂一時服三次夜亦如是吃乳時必要

坐起端抱斷不可側卧倒吃每早俱要洗擦口舌牙根小兒雖
賴乳養總不宜過多時時吃之俟過蒸變之一次候清粒漸旺
畧加其乳亦不可過恐成乳積再兒食乳或有睡時即要去乳
切勿含于口內至爲內傷萬難救治尤難解者時人多以貢墨
開乳不知墨乃油烟製成血見黑則止小兒胎中惡血未淨心
血未開即用墨止之塞其心竅閉其血道何從生發爲害不甚
大乎一週之內人知小兒不令過寒不知不可過熱則受害
更甚即如抱裙一物刻經日晒火烘必須歇去熱氣然後用之
若盛夏烈日晒過尤必置地下稍歇沾土氣方不受暑即有
人逆太陽地走至切不可令近小兒身邊恐聞暑氣歸于兒腹