

景岳全書痘疹詮烈集

目錄

卷之四十三

痘瘡

上

總論

一

初辨痘證

二

論脉

三

形色情性

四

日期

五

五臟證

六

分氣血

七

辨虛實寒熱

八

部位吉凶

九

痘形痘色吉凶

十

吉證

十一

凶證

十二

怪痘形證

十三

死證日數歌

十四

發熱三朝辨吉凶

十五

報痘三朝辨吉凶

十六

起痘三朝辨吉凶

十七

灌膿三朝辨吉凶

十八

結靨三朝辨吉凶

十九

落痂後辨吉凶

二十

痘瘡上論列方

二十一

卷之四十四

痘瘡

中

總論治法

二二

熱證論治

二三

發熱三朝治欵

二四

報痘三朝治欵

二五

起發三朝治欵 二六

灌膿三朝治欵 二七

結靨三朝治欵 二八

靨後落痂治欵 二九

痘後餘毒發熱 三十

禁忌 三一

出不快 三二

陷伏 三三

痒瘍抓破 三四

作痛 三五

頭面腫 三六

痘疔黑陷 三七

飲食 三八

咽喉口齒 三七

痘瘡中論列方 四十

痘瘡下

總論吐瀉 四二

嘔吐 四二

泄瀉 四三

寒戰咬牙 四四

煩躁 四五

喘急 四六

聲音 四七

驚搐 四八

昏睡 四九

腰痛 五十

腹痛 五一

腹脹 五二

厥逆 五三

發渴 五四

失血 五五

發痧 五六

潰爛 五七

多汗 五八

夾疹 五九

夾班 六十

晝夜啼哭 六一

大小便閉 六二

目證 六三

痘癰痘毒 六四

疳蝕瘡 六五

痘藥正品 六六

痘家藥忌 六七

痘瘡下論列方 六八

痘一證俗曰天瘡原其所出實由胎毒內藏而復因時氣外
觸其毒乃發故傳染相似是亦天行痘癘證也但考之內經
則止言瘍疹即今痘疹之屬也故自越人仲景元化叔和諸

痘瘡

吐瀉

泄瀉

嘔吐

寒戰咬牙

藥水藥忌
六八

藥水藥忌
六八

藥水藥忌
六五

藥水藥忌
六六

目翳
六三

藥水藥忌
六四

痘疹初起
六一

大小便閉
六二

痘疹
正六

痘疹
六十一

痘疹
正六

痘疹
正六

景岳全書 卷之四十三 烈集

痘疹論

曾稽 張介賓 曾卿著

曾稽 曾超 謙菴訂

痘瘡

總論

一

痘瘡一證。俗曰天瘡。原其所由。實由胎毒內藏。而復因時氣外觸。其毒乃發。故傳染相似。是亦天行疫癘證也。但考之內經。則止言瘍疹。卽今班疹之屬也。故自越人仲景。元化。叔和。諸

公皆無一言及痘可見上古本無是證而今則何以有之愚
謂近代之毒必以醇酒五味造作太過較古人之恬淡相去
遠矣或者未信余言弟觀藜藿膏粱之家卽有不同今之北
虜亦不出痘原其所由實由是耳豈果彼無胎毒耶故凡多
遭此害者當以余言熟味之

一痘瘡變幻百出虛中有實實中有虛要非曲學偏見者可以
窺其堂室若目力心思一有不到則害不小矣設或知證而
不知形則無以洞其外知形而不知脈則無以測其內知脈
而不知本則無以探其源知本而不知因則無以窮其變知

因而不知藥則無以神其治只此數事今醫果能全之否設有不能而強以爲能則致害於人獲罪於天能無畏乎故余于痘疹一門畱心旣久積驗已多因蒐採先哲之最精於此者如文中陳氏仲陽錢氏立齋薛氏羅田萬氏晨峯程氏東臬徐氏收齋友氏并其他襍錄等書有述其舊者有發其未發者有剖其疑似者有因涉歷而吐其心得者盡我愚衷集而成帙痘疹玄秘似無由此

初辨痘證

二

痘疹發熱大抵初時與傷寒相似然傷寒之邪從表入裏故見

各經之證痘疹之毒則從裏出表故見五臟之證如呵欠悶
頓肝證也乍涼乍熱手足稍冷多睡脾證也面燥腮赤欬嗽
噴嚏肺證也驚悸心證也飢涼耳冷腎證也○又觀心窩有
紅色耳後有紅筋月中含淚或身熱手指皆熱惟中指獨冷
乃知是痘證也便當察其虛實隨證治之

辨痘歌

五指稍頭冷驚來不可當若逢中指熱必定是傷寒中指獨自
冷麻痘證相傳女右男分左分明好細看

看耳歌

兩耳紅筋痘必輕紫所起處重重沉沉急須用藥相攻治十個難求三五生

看痘法

凡初看痘法以紙燃蘸油照其顆粒次以手摸面頰如紅色隨手轉白隨白轉紅謂之血活生意在矣若指之太白舉之不紅是謂血枯縱疎亦危○又看目睛神光口唇舌尖紅活如常無燥白之色乃爲吉兆自可無憂此觀痘疹之大驗

察脈法

凡看痘之法一見發熱卽當先察其脈蓋凡痘瘡將出者未見

形迹必先發熱既見發熱脉必滑數但微見滑數有神而不失和緩之氣者其痘必輕而少若滑數加倍而猶帶和緩者其痘必多而重尙亦無害若滑數之甚又兼弦躁或乳急無神而全無和緩之氣者其痘必甚而危故余於初熱時便能斷其吉凶人多驚服而不知所窺在脉也凡診此之法但全握小兒之手而單以拇指診之亦最易也看疹之法此爲第一而今醫多不知之亦以古人之未之及耳

認豆法

凡痘瘡緊小克實者名曰珍珠痘此則易壯易靨高大飽滿者

名曰大痘此則早壯而遲收四圍起而中心陷者名茱萸痘平
扁不突者名曰蒸餅痘此則有凶有吉稀者輕密者重

論脈三

痘自發熱以至起脹毒從內出陽之候也脈宜浮大而數不宜
沉細而遲自貫膿收靨以後毒已外解陰之候也脈宜和緩
不宜洪數又曰痘瘡之脈中和爲貴不可過於躁疾或見微
小故曰脈靜身涼者生脈躁身熱者死又陽病得陰脈者死
大抵四時以胃氣爲本胃氣者以四時之脈而皆兼和緩卽
胃氣也蓋滑數浮洪爲太過太過爲實實者邪氣實也弦遲

微弱爲不及、不及爲虛、虛者正氣虛也。設以太過不及之脈而中無和緩之氣，是皆死候之脈。故曰：人無胃氣則死。

形色情性 四

凡天行痘疹之時，有於未出之先，察其形色情性，可以預知吉凶也。○一觀其色，如面顏紅白明潤，與平日同，而無變者，吉。如忽見紅赤而太嬌，或晄白而無彩，頓然改變，異於平時者，凶。又如額有青紋，目有赤脈，口有黑氣，耳有塵痕者，皆大凶之兆。○二觀其形，凡精神暢爽，動止便利，語言清亮者，無病之吉也。如精神衰弱，動止遲留，言語低微，異於平時者，凶。又

原具壽相者吉。如有天相。則凡頭破顱解。項小脚細。聲微目無精彩。或睛光露神。啼聲斷續。無喜無情。而自語自笑。聰慧太早。肉浮骨嫩者。皆不吉之兆。○三觀情注。凡未發熱時。忽生喜心。若與父母愛戀。不忍捨者。及聞見怪異言語妄誕者。皆凶兆也。

日期 五

痘瘡大約之數。發熱三日。報痘三日。起脹三日。貫膿三日。結靨三日。共十五日。乃大率常數。此其正也。惟痘密毒甚者。常過其期。痘疎毒微者。常不及期。固有不可一例拘者。但得痘色

明潤根窠紅活飲食二
妨設有當出不出當起
其證或爲元氣虛弱不
能運行則補其元氣或爲雜證攻剝
不能通貫則去其雜證
又六日以前毒發未盡有雜證者常
也六日以後毒該盡出
雜證當除而不除者爲逆須詳辨而
急治之

五臟證

痘疹二證古人有云痘自
裏而出於臟其毒深故久執而難出
爲重疹自表而出於腑其毒淺故暴熱而易出爲輕余謂此

說未必然也。蓋痘疹皆出於臟腑。未有表裏不相通者。但出於腑者在痘亦輕。出於臟者在疹亦重。所以凡是疹子必發熱。至五六月而後出。不可言易。且疹子多屬肺經。豈肺經非臟耶。

一心經痘證。心主火。凡紅赤煩渴。或上竄咬牙者。心臟熱也。心熱者。導赤散。心虛者。人參麥門冬。生地黃當歸之類。煩渴邪盛者。葛根解毒湯。○脾經痘證。多有吐瀉腹痛者。訣云。發熱肚中痛。斑瘡腹內發。多防未透。發少更防癰。可見瘡疹腹痛。乃爲惡候。當察腹痛吐瀉各條治之。○肺經痘證。凡發熱