

增注類證活人書卷十一

此一卷首論咳逆傷寒咳逆此證極惡仲景經中
不載孫真人云咳逆遍尋方論無此名稱深窮其
狀咳逆者噦逆之名蓋古人以咳逆爲噦耳大抵
咳逆者古人所謂噦是也哕者今人所謂乾嘔是
也

二十七

問咳逆

咳逆者仲景所謂噦者是也

乙芮切
逆氣

噦胃寒所生傷

寒本虛攻其熱必噦又云傷寒大吐下之極虛復發
汗者其人外怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以

今名哕逆別
於咳噦令人
易曉胃寒宜
橘皮乾薑湯
陳皮乾薑湯
中本通云

竹英之有根

香散方竹茹湯治陽證也○本事方第八卷治傷寒

候咳逆豆蔻湯治陰證咳逆丁香茴香肉豆蔻等藥
若陽證不可用○凡咳逆多有先熱而喫生冷或涼
藥多相激而成蓋陰陽二氣相搏林人之僕本發大
熱以涼藥下之想大甚咳逆四五日竟至於服丁香
稊蒂而后却再以小柴胡之屬解其餘熱遂愈下后
蓋有身熱不解○治傷寒咳逆後二方出撫州華蓋
山周先生惟一備急方香附子橘核各半兩
細剉用酒半盞先將藥在石銀器內炒漸漸滴酒炒
藥焦黃色研細末每二錢水一小盞煎至八分細細
旋呷服○一方單用香附子末○又方大蒜頭二箇

煨動研爆入白薑末丸得為度研和如梧桐子大搗薤菜

自然汁吞下二十圓病退再服一十五圓

〔六十八〕

問發黃

病人寒濕在裏不散熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與

宿穀相薄鬱蒸不消化故發黃

漢贊南方暑濕近夏瘴熱蓋瘴者黃也古

人以黃為瘴濕熱相薄民多病瘴甚為跗腫也

然發黃與瘀血外證及脉俱

相似但小便不利為黃小便自利為瘀血要之發黃

之人心脾蘊積發熱引飲脉必浮滑而緊數若瘀血

證即如狂大便必黑此為異耳凡病人身體發熱頭

面汗出身無汗劑頸而止渴引水漿小便不利如此

必發黃茵陳蒿湯_芎三加五苓散_芎六也

茵陳蒿湯十分五苓

散五分三件拌和每服一錢溫水調下日三服病人服湯得小便利如皂莢

汁赤一宿腹減則黃從小便中出也古人云治濕不

利小便非其治也

大抵發黃者瘀熱在裏由小便利而致之也

梔子蘗皮

湯_芎辛麻黃連翹赤小豆湯_芎三可選而用之又方

傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搐一字許入鼻

中出黃水甚驗卽用茵陳蒿湯調五苓散服之最良

○又問白虎證亦身熱煩渴引飲小便不利何以不

發黃荅曰白虎與發黃證相近遍身汗出此爲熱越

白虎證也頭面汗出頸以下都無汗發黃證也○又

問太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何太陽中濕也仲景云傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之卷第八
問十○又問病人脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時咳嗽者何也少陽中風也小柴胡湯主之卷五

八十九

問發狂

發狂有二證陽毒發狂畜血如狂其外證與脉皆不同病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脉實潮熱獨語如

此辨陽毒發狂
及血瘧發狂最
常而血瘧三表
證不寒熱不欲
飲水脉微而沈
粗二無不知其
為瘧因伏大熱
之病或從陰氣
血之毒水在膏
黃卷等論誤也
推之小腹硬滿
由便利大便黑

見鬼狀此陽毒也

治藥方在
二十一問

病人無表證不發寒熱

唇燥但欲嗽水不欲入咽其脉微而沈小腹鞭滿小

便反利大便必黑身黃發狂此血證諦也

病人如熱
狀煩滿口

燥其脉反無熱此為陰伏其血證審矣仲景云太陽
病不解熱結膀胱其人如狂其血自下者愈若外不
解者尚未可攻當先解其表宜桂枝湯正方一外已解
但小腹急結者乃可攻之屬桃仁承氣湯主之正十四

大抵傷寒當汗不汗熱畜在裏熱化為血其人喜忘

而如狂血上逆則喜忘血下畜則內爭甚者抵當湯

芎藭抵當圓芎藭輕者桃仁承氣湯正十四犀角地黃

湯雙士須取盡黑物為效

夫血熱畜在膀胱經若用
抵當湯更須仔細審其有

無表證若有畜血證而外不解亦未可便用抵當湯
先用桂枝湯以解其外緣熱在膀胱太陽經故也

即不發狂而微
 熱熱者是蓄血
 證宜犀角地黄
 湯加黃芩桃仁
 蘇木或加風桃
 仁承氣湯去黃芩
 風化硝末甘竹末
 陳皮桑椹元末
 桃仁承氣湯末

○又有火邪發驚狂者醫以火於卧牀下或周身用
 火迫劫汗出或熨而成火邪其人亡陽煩躁驚狂卧
 起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯去芍
 桂枝甘草龍骨牡蠣湯去芍藥主之
凡炙及燒鍼後證
似火劫者並用切
法治之金匱風引湯尤良柴
胡加龍骨牡蠣湯更捷正三十三

九十一 問發班

發班有兩證溫病發班
熱病發班溫毒發班者冬月觸冒寒毒

至春始發或已汗下表證未除毒氣未解故發班黑

膏主之難主或冬月溫暖人感乖戾之氣至春初為

積寒所折毒氣未得泄迫天氣暄暖溫毒始發肌肉

班爛癰疹如錦紋而咳心悶嘔清汁葛根橘皮湯

齒屢用之驗黃連橘皮湯亦佳

齒五廣州褚倅子班如壞梨齧熱病

發班者與時氣發班同或未汗下或已汗下熱毒不

散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚遂發班瘡癰疹如

錦紋俗呼瘡麤素問謂之𦑔

發班者下之太早熱氣乘虛故也下之太遲熱

留胃中赤發班服熱藥過多亦發班微者赤班出五死一生劇者黑班出十死一生

大抵發班

不可用表藥表虛裏實若發汗開泄更增班爛也皆

當用化班湯

難三

玄參升麻湯

難五

阿膠大青湯

六猪膽梔子湯

難四

或與紫雪大妙可下者與調胃

承氣湯

正四十三暑月陽氣重者常宜體候才有赤點如蚊蚤咬却急治之

○又有陽毒

發班見十九問二十一問宜參酌之

〔平二〕 問讞語

病人有讞語有鄭聲二證鄭聲爲虛當用溫藥自通
湯主之〔平七〕讞語爲實當須調胃承氣湯主之〔平三〕
服調胃承氣而讞語止或更衣者停後服不爾再與
之仲景云實則讞語虛則鄭聲鄭重也重語也世多
不別然讞語鄭聲亦相似難辨須更用外證與脉別
之若大小便利手足冷脉微細者必鄭聲也大便秘
小便赤手足溫脉洪數者必讞語也以此相參然後
用藥萬全矣大抵傷寒不應發汗卽讞語

仲景云傷寒四五日

脉沈而喘滿沈為在裏反發其汗津液
越出大便為難表虛裏實實則譫語
譫語屬胃和

中則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯然亦有

合病譫語者
三陽合病腹滿身重難以轉側口

下宜白虎
有胃實譫語者
病人身熱汗出大便

湯
有胃實譫語者
胃實宜調胃承氣湯

大承氣
或發汗多亡陽譫語者
發汗多

亡陽
譫語者不可下此為津液不和與柴胡桂枝湯

正三
和其榮衛以通津液後自愈恐人作燥屎攻之

慎不可
有下利譫語者
下利譫語有燥屎也調胃承

攻也
有下利譫語者
氣湯

有下
後譫語者
傷寒八九日下之胸滿煩驚小

便不利
譫語身重不可轉側者

柴胡
加龍骨
有婦人熱入血室譫語者
婦人傷寒發

壯
日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無

犯胃氣及上二焦速用小柴胡湯主之

三十九
若行湯

頁登舌人書上

遲熱入胃令津燥中焦上焦不榮成血結胸狀須當
針期門也婦人中風發熱惡寒經水適來入血室也
當刺期門隨其實而取之已上二焦熱結在期門也
若犯胃氣晝夜譫語喜忘小腹滿小便利屬抵當湯
證中
先立
○又問仲景云無犯胃氣何也荅曰熱因經水
適來乘虛入室故血室有熱遂令譫語當以小柴胡
解之
三先
卽與胃實譫語不同胃實有燥糞故宜調
胃承氣湯下之
五三
若血實有熱譫語非胃家實仲
景恐人作胃實攻之故曰無犯胃氣也大抵譫語是
熱屬陽而反見陰證者逆

九十二 問吐血

傷寒吐血由諸陽受邪熱初在表應發汗而不發汗

熱毒入深結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者

抵當圓芳輕者桃仁承氣湯西西兼服犀角地黃

湯雙六三黃圓雙六

九十三

問腹痛

腹脹滿附

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛是有表復有裏

仲景所以用桂枝加芍藥湯主之芳痛甚者加大

黃

正芳三桂枝加芍藥即是小建中也太陰脉弱自利

故也下利者先難經云痛為實大抵痛宜下

仲景云發汗不

煎芍藥十餘沸難經云痛為實大抵痛宜下

仲景云發汗不

二證有熱痛有冷痛尺脉弦腸鳴泄利而痛者冷痛



也小建中湯主之三十七仲景云陽脉濇陰脉弦法當

腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯小柴胡湯

黃芩加芍藥陰證腹痛即四逆散三十八通脉四逆加芍藥三十九

藥湯四十腹痛小便不利者真武湯四十一關脉實腹

滿大便秘按之而痛者實痛也桂枝加大黃湯四十二

黃連湯四十三大承氣湯主之四十四又問腹脹滿者

何也陰陽不和也桔梗半夏湯最良四十五仲景論太

陽證發汗後腹脹滿也厚樸生薑半夏甘草人參湯

四十六下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚樸湯四十七

吐後腹脹滿者與調胃承氣湯四十八少陰病六七日

腹脹不大便者急下之宜承氣湯苦三

卒四 問煩躁

傷寒煩躁太陽與少陰經為多

蓋太陽與少陰為表裏陽明經

或因不大便中有燥屎故煩躁耳

仲景云病人不大便五六日遶臍痛

煩躁發作有時者此有燥屎也宜承氣湯大抵得病

二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭小便利尿

定鞭以小承氣湯苦三少少與微利之然有病已差

尚微煩必大便秘當問其小便日幾行若小便少津

液當還入胃大抵陰氣少陽氣勝則熱而煩故太陽

不須攻也

經傷風多煩而躁也

仲景云太陽傷風服桂枝湯正

枝湯又云太陽傷風脉浮緊發熱惡寒身疼痛無汗

而煩躁者大青龍湯主之苦三又云傷寒二三日心

中悸而煩者小建中湯主之苦三又云傷風發熱六

七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐五苓

散主之

散主之正六又云傷寒得病無熱但狂言煩躁不安
精氣不與人相當但與五苓散二大錢服之當與新
汲井水飲一升許卽以指刺喉去之隨手愈然而太
陽證自汗心煩若小便數者又不可用桂枝表也

陽虛陰盛亦發煩躁陽氣弱爲陰所乘而躁故少陰

病亦煩躁

少陰病二三日已上心煩不得卧黃連阿膠湯主之

正六少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

正五少陰病下利六七日欬而

滿心煩者猪膚湯主之正五少陰下利六七日欬而

嘔渴煩不得眠猪苓湯主之正七少陰病惡寒而

蹇時時自煩欲去衣被大柴胡湯下之正五學者

當以外證與脉別之

寸關浮數身熱而煩者屬太陽也尺寸俱沈手足厥逆自利而

煩者屬然有汗之而煩者

仲景云大陽病發汗後大少陰也然有汗之而煩者汗出胃中乾煩躁不得眠

欲得飲水者少少與之令胃中和則愈若脉

正六十六有下之

而煩者

仲景云下之後發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔乃渴無表證脉沈微者乾薑附子

湯主之（五十三）又云發汗吐下後虛煩不得眠心中懊
懣者梔子豉湯主之（五十五）發汗若下之病仍未解煩
躁者茯苓四逆湯主之（五十八）又有病已解而反微煩者此由病新
差不勝穀損穀則愈（五十九）先用小柴胡湯（三十九）和其榮衛
中然後以調胃承氣湯（五十三）以通津液得尿而解小柴胡不

五 問下利者

傷寒下利多種須辨識陰陽勿令差互（三）陽下利則

利手足溫少陰厥陰下利身不熱以此別之大抵下

利挾太陽脈證便不得用溫藥俗醫但見下利便作

陰證用溫熱藥鮮不發黃生斑而死也（六）太陽陽明合病必下利葛根湯

主之

下利而頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾其脈浮大而長者是其證也

太陽少陽

合病自下利黃芩湯主之（六）若嘔者黃芩湯加半