

訂補明醫指掌卷之九

仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從臯參補
子繩山邵達校訂

婦人科一切諸病與男子同惟經水帶下血崩胎產等症不同故古人另立婦人科以別之

○經候一

歌婦人天癸有常經血滿衝任匝月行不及期來知是熱過期血少自分明若然色淡因痰滯熱極多來紫黑形氣滯未行先作痛虛時行過腹中疼去多不住加涼血來少無疼大補榮經閉要推虛寔候血枯氣膈熱痰因

論天經者常也然衝任二脈為經脈之海血氣之行外循經絡內榮藏腑氣血調適運行不息一月之間衝任血溢而行經云月事以時下此常經也其或太過不及或多或寡或繁或淡則失其常候而為之病也故有虛寔冷熱之殊

善治者必審其因而調之復令充其元氣以復其初斯無病患也○按褚氏云女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或潰而入骨或變而為腫寇氏亦云室女經閉成癆

者多由積想在心故也王節齋云婦人經脈不行多因脾胃傷損不可便作經閉血凝輕用通經破血之藥遇有此症便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋之藥傷其中氣以致血

少而不行者只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥脾旺則能生血而經自行矣又有飲食停滯致損脾胃者亦宜消食補脾若脾胃無病果有血塊凝結者方宜行血通經

脈經曰寸關調如故而尺脈絕不至者月水不利當患少腹引腰痛氣滯上攻胸臆也○寸口脈浮而弱浮則為虛弱則無血○關脈沈主月水不利腹脹滿○尺脈滑血氣寔婦人經脈不利○少陰脈弱而微微則血少弱則發熱

○虛

經候行過而作痛者血氣俱虛也八珍湯經水過期而行血不足也四物湯加黃芪陳皮經水不調而血色淡黃者

一血少也四物湯加人參黃芪香附腹中痛再加新艾阿膠血氣受傷或生育多而瘦弱經閉不行四物加桃仁紅花一血少也四物湯加人參黃芪香附腹中痛再加新艾阿膠血氣受傷或生育多而瘦弱經閉不行四物加桃仁紅花四物湯此方為婦人室女補血之要藥也○當歸二錢熟地黃錢川芎半錢白芍藥錢半○右剉一劑水二

益煎八分服加減法詳血症。

八珍湯

此湯大補氣血兩虛。一名八物湯。○白朮錢二 白茯苓錢一 人參五錢 甘草錢八 當歸錢一 熟地黃

錢一

川芎半錢

白芍藥半錢

○右剉一剉。水二大鍾。煎至八分。空心服。

熱感

經水不及期來者。血熱也。四物湯加黃芩黃連柴胡香附。經水來而血色紫黑者。丹溪云。血紫黑熱極從火化故也。

經水未必多。或作痛。四物湯加黃芩黃連黃柏倍芍藥。經水去多。十數日行不止。此血熱也。三補丸加莎草根敗龜

板荊芥生地柴胡。

三補丸

治三焦熱火之要藥。使火邪退而血自清。○黃連三錢去毛炒

黃芩三錢炒

黃柏三錢去皮炒褐色

○右為極細

末蜜丸。白湯下。加山梔名梔子金花丸。

痰多

痰多佔住血海地位。因而下多。目必漸昏。星芩丸。肥人經閉。是痰隔導痰湯。即二陳湯加南星。加黃連川芎。瘦人

經閉是氣滯。四物湯前方見

加木香枳殼香附桃仁紅花。經水過期色淡。痰也。二陳湯加川芎當歸貝母天花粉。

臨行腹先痛。氣滯血凝也。四物湯加玄胡索蓬朮枳殼木香桃仁香附。

星芩丸

治女人脂肥痰多。佔住血海。因而下多者。○南星製四兩 蒼朮未泔浸四兩

川芎四兩

香附重便浸三日炒四兩 ○右為

細末蒸餅糊丸。如菜豆大。每服百丸。白湯送下。

二陳湯

此湯治痰之都管。但引用不同。隨症斟酌。○陳皮半錢

半夏一錢炒

茯苓一錢去皮

甘草錢六

○右剉一剉。

水二鍾。生姜三片。煎至八分。空心溫服。

帶下二

歌婦人帶下為何因。風寒氣熱。乘胞門。精氣累滯于帶脈。因而帶下得其名。淫痰下注或濕熱。赤白須將氣血分。

論夫帶下者。由濕痰流注于帶脈而下濁液。故曰帶下。古方以為起于風寒氣熱之所傷。或不避風邪。入于胞門。或中

經脈。留傳藏府而發。或傷于五藏。而見五色之帶。但專用燥熱治之。其謬甚矣。機要以赤者熱入小腸。白者熱入大

腸其本寔熱鬱結不散則為赤白帶下。多用寒涼攻下之劑。東垣以血少復亡其陽。故白滑之物下流。亦有濕痰流注于下焦。或腎肝陰淫之濕盛。或緣驚恐而木垂土位。濁液下流。或思慕為筋痿。所謂二陽病也。多用補劑而兼升提。丹溪專主濕熱下注。故以化痰而兼去濕之劑。古人立論。殆盡病情。而治法無定。後學弗知所措。不能無疑。大抵屬痰與熱者居多。陰寒者十無一二。學者仍須精察虛寔遲數之脈。細審寒熱濕痰之症。治之斯無執一之患也。

寒

白帶腥臭。多悲不樂者。寒也。陽氣極虛。桂附湯。婦人赤白帶下。脈息沈微。腹痛。陰中亦痛。經水愆期。子宮虛冷。不能成孕者。元戎六合湯。

桂附湯

治婦人白帶腥臭。多悲不樂。大寒之症。○肉桂錢 附子炮三錢

知母酒炒五分

黃柏酒炒五分

甘草錢五

升

元戎六合湯

治婦人帶下。腹中疼痛。陰中亦痛。即四物湯。方見前。加肉桂附子。各五分。食前煎服。

虛

白帶久不止。臍腹冷痛。陰中亦痛。經水不止。或因崩後脈弱無力。痠痛。東垣固真丸。產後去血過多。經水不調。白帶如傾。淋瀝腥穢。衛生湯。

東垣固真丸

治白帶久不止。臍腹冷痛。陰中亦然。○白石脂燒赤一錢 柴胡酒製一錢 黃柏去皮酒炒一錢 當歸身錢二

白芍藥錢一

乾姜炮四錢 白龍骨煨二錢 右為細末。水煮糊丸。如桐子大。每十九空。心下。

衛生湯

治帶下不止。脈微而弱。臍腹疼痛。○白芍藥兩三 當歸身兩三 黃芪蜜炙兩錢 甘草兩一。○右剉一劑。水二盞煎。

至八分。空心服。

熱

內熱脈數。赤白帶下不止。枸杞根一兩。生地黃五兩。酒一斗。煮至三升服。赤白帶內火盛。陰虛煩熱。二黃三白丸。益母草末酒調服。或白芷散。

二黃三白丸

治白帶。因七情所傷而脈數者。

○扁柏酒蒸五錢

黃柏炒五錢

香附醋炒一兩

白芍藥炒一兩

白朮炒一兩

黃連炒五錢

椿皮炒二兩

白芷二兩

○右為末。粥丸如梧桐子大。每服七十九丸。米湯送下。

海螵蛸二枚

○為末。酒送下。

白芷散

治女人赤白帶下。火熱內盛。

○白芷二兩

胎髮一團

海螵蛸二枚

○為末。酒送下。

濕痰

濕痰結注于下。白帶淋漓。先以小胃丹開導閉鬱。後用白朮丸。濕痰下注。半夏南星海石炒黃柏蒼朮樗根皮青黛

香附滑石蛤粉陳皮茯苓。

小胃丹

取膈上濕痰熱積。以意消息之。欲利空心服。○先花半兩

甘遂半兩

白芍半兩

白朮半兩

白朮半兩

乾

大戟半兩

大黃一兩

黃柏三兩

共為細末。粥丸如梧桐子大。白湯送下。

白芍半兩

白朮半兩

白朮半兩

白朮丸

治赤白帶。先以小胃丹開導。後用此補之。

○白朮二兩

黃芩五錢

白芍五錢

紅白葵花半錢

○右為極細末。蒸餅糊丸。空心煎四物湯下五十丸。

末。蒸餅糊丸。空心煎四物湯下五十丸。

濕熱

肥人白帶。陰戶痛。身黃皮緩。身重。陰中如水濕也。升陽燥濕湯。濕而挾熱者。大便或泄或閉。小便便澀。脈寔而氣盛。濕

熱者。十棗湯下之。

升陽燥濕湯

治白帶。陰中痛。身重如山。身黃皮緩。

○黃芩錢一

柴胡分

防風錢一

甘草分

陳皮分

良姜錢一

乾姜錢一

郁李仁錢一

白葵花錢一

○右剉一劑。水二鍾。煎至八分。空心服。

大戟分五

芫花分五

棗十枚

○古用水二鍾。煎八分。溫

服。以利為度。

崩漏三

歌婦人何故有崩中。只為勞傷任與衝。經為氣虛無約制。故令暴下若山崩。因寒因熱因勞損。帶補兼升自有功。

論夫婦人氣血調和。則經水依期而至。何崩漏之有。若勞動過極。藏府俱傷。衝任之脈。氣虛不能約制。其經血故忽然暴下。若山崩然。故曰崩中。丹溪云。血崩症有因勞損而致者。有挾熱者。有挾寒者。有因氣血不足者之不同。當辨明

而治之

〔脈經〕曰婦人漏血下赤白。日下血數升。脈急數者死。遲者生。婦人漏下赤白不休。脈小虛滑者生。大緊是數者死。

勞損

因勞損衝任脈虛。血非時下。臍腹冷痛。崩中脈遲。伏龍肝散。先因勞役脾胃虛損。氣短氣逆。自汗身熱。懶食。大便或泄或閉。體倦無力。崩中不止。當歸芍藥湯。勞損氣血。參芪當歸。帶升提之。約治之。

伏龍肝散 治勞傷氣血。衝任脈虛。以致崩中不止。○伏龍肝一兩 赤石脂一兩 麥門冬一兩 甘草五分 川芎三分

當歸芍藥湯 乾姜六錢 肉桂兩半 艾葉三兩 熟地黃兩四 ○右每服四錢。水煎服。

當歸芍藥湯 治崩漏不止。氣短氣逆。自汗乏力。○黃芪一錢 白朮一錢 甘草一錢 蒼朮一錢 白芍一錢

熟地黃五分 陳皮五分 當歸身酒洗 生地黃三分 柴胡二分 ○右用水煎服。

虛而扶熱

氣血兩虛。四物湯加參芪。崩不止。小蓳湯。荊芥散。如聖散之類。選而用之。血虛甚者。四物湯加焦姜。崩不止者。白芷。

百草霜。檳榔。灰之類。腎虛不能鎮相火而崩者。涼血地黃湯。陽盛陰虛。血熱沸溢。黃芩湯。經漏下。血脈虛洪。其血紫。

黑。此熱極反。煎水化制之。故紫色成塊。熱之極也。生地黃散。或四物湯經方見前加黃芩黃連黃柏知母。

小蓳湯 治氣血兩虛。內熱太甚。崩中不止。○小蓳葉汁一盞 生地黃汁一盞 白朮兩半 ○入水一盞。煎至半盞。溫服。

荊芥散 治女人崩中不止。○荊芥油打一味不拘多少 麻一兩 ○末之。每服三錢。童便下。

如聖散 治血崩。○檳榔存性 烏梅一兩 乾姜錢兩五 ○右為末。每服二錢。烏梅酒調下。空心時服。

生地黃散 治女人經漏下。血脈洪。血色紫黑成塊。○生地黃錢 熟地黃錢 枸杞子錢 天門冬錢 柴胡八分

黃連一錢 白芍藥八分 地骨皮一錢 甘草七分 黃芩錢 黃芪錢 下血加地榆錢 ○右剉作一劑。水二大。

鍾煎至一鍾。空心溫服。

涼血地黃湯 治因陰虛。不能鎮守相火。以致崩漏。○黃芩三分 荊芥三分 蔓荊子三分 黃柏二分 知母二分

炒黃連一錢 羌活五分 柴胡三分 升麻二分 防風三分 生地黃半錢 當歸五分

甘草五錢 紅花二錢 右剉一劑水二鍾煎八分空心溫服
黃芩湯 治內熱涼血分。○黃芩二錢 芍藥半錢 甘草一錢 剉一劑水煎服

必挾寒濕

崩挾寒濕 升麻除濕湯 崩中。臍腹冷痛。脈遲弱。身寒。伏龍肝散。方見前

升麻除濕湯

治漏下惡血。由飲食失節。水濕所致。○羌活一錢 柴胡一錢 蒼朮一錢 黃芪一錢 防風一錢

○胎前四

甘草一錢

升麻一錢

藁本一錢

蔓荊子一錢

獨活一錢

當歸一錢

剉一劑水煎服

防風一錢

黃芪一錢

防風一錢

防風一錢

歌胎前眾疾要須知。惡阻當從痰火推。胎上湊心胸脹悶。子懸。芩朮炒山梔。妊娠漏下。名胎漏。血熱而成。或氣虛。胎動

芎歸及膠艾。安胎順氣。勿教遲。子淋。須覓安榮散。胎水還當用鯉魚。腫滿遍身。如水氣。但煎防己。自寬舒。足跌浮腫

身無恙。皺脚安胎。腹痛分虛寒。寒熱溫清可辨之。子癰急用羚羊角。大腹皮。五月以來。煩燥甚。子煩。知母麥冬。醫妊

妊兒。暈芎歸荊芥。奇。泄瀉砂蒼人。二白。熱須芩朮倍之。宜。風寒感冒。參蘇飲。不解。黃龍湯。勿疑。胸滿本方。加枳桔

熱而無汗。葛根。裡熱甚。時暈胎散。熱極。譫言。解毒。施。脈遲。四逆理中。治。熱瀉。柴芩半夏。除。汗吐下溫。須仔細。安胎

為主。勿差池。清脾。瘧。須除半。四獸祛邪。更補脾。痢疾。香連湯。有驗。胃風止痢。補其虛。傷風咳嗽。參蘇飲。去半。加芩

杏白皮。便閉不通。大腹散。小溲不利。用冬葵。怔忡恍惚。心驚悸。氣悶。喧呼。大聖。祛。心痛。火龍湯。可定。腰疼。通氣。更誰

知。達生散。可將胎束。欲服。須當九月時。

論

天婦人妊娠。貴乎衝任之脈旺盛。元氣充足。則飲食如常。身體壯健。色澤不衰。而無病患相侵。故月水以時下。始能

受孕。血氣充實。則可保十月滿足。分娩無虞。母子堅牢。何疾之有。若血氣不充。衝任之脈虛弱。則經水愆期。豈能受

孕。縱然得孕。則胞門子戶虛寒。而受胎不寔。或衝任之脈虛。而挾熱。輕則胎動而不安。重則三五月而即墮。遇陽

月分而墮者。火能消物也。更兼以外挾六淫之邪。內因七情之氣。或飲食太過。致傷中州。或淫慾無度。內損元氣。如

斯之類。鮮有不致疾者也。故凡胎娠眾疾。必先以安胎為主。驅疾次之。蓋病去則胎自安。胎固則病自愈矣。

胎陰搏于下。陽別于上。血氣調和。有子之象。手之少陰。其脈動甚。尺按不絕。此為有孕。少陰屬心。心主血脈。腎為胞門。

脈應于尺或寸脈微闊滑尺數往來流利如雀之啄或診三部浮沈一止或平而虛當問月水婦人有病而無邪脈此孕非病所以不月男女之別以左右取左疾為男右疾為女沈寔在左浮大在右右女左男可以預剖離經六至沈細而滑陣痛連腰胎即時脫血癡瘕急而大者生虛小弱者即是死形半產漏下革脈主之弱即血耗立見傾危○懷妊六七月脈寔大牢強弦急者生若沈而細者死

惡阻

妊婦二三月以來吐逆不食心虛煩悶者名曰惡阻人參橘皮湯主之丹溪云肥人惡阻因痰二陳湯加黃芩白朮竹茹貝母去半夏瘦人是火前方再加黃連山梔仁

人參橘皮湯

治妊婦三月惡阻吐逆不食煩悶赤茯苓

白朮

麥門冬

厚朴

橘皮

甘草

人參

甘草

竹茹

右剉一劑水二盞

加生薑五片煎至八分

空心溫服

子腫

妊婦五六月以來浮腫如水氣者名曰子腫俗呼為琉璃胎是也防已湯主之妊婦面目俱浮身腫如水氣急而虛者白朮散

防已湯

治妊婦通身腫滿如水氣喘促小便不利○防已

桑白皮

赤茯苓

紫蘇

木香

生薑三片水二盞煎服

白朮散

治妊婦面目俱浮身腫如水氣急而虛者○白朮

生薑皮

大腹皮

陳皮

細末每服二錢米飲調下

子煩

妊婦五六月乃少陰君火以養精六七月乃少陽相火以養氣平素有火人內外之火相感而作煩燥悶亂不安者名曰子煩麥門冬湯或安神丸

麥門冬湯

治妊婦五六月煩悶不安名曰子煩○麥門冬

防風

茯苓

黃芩

竹葉

安神丸

治胎孕陰煩熱○黃連

砂一兩

生地黃

甘草

當歸身

右為末蒸餅

糊丸如黍米大硃砂為衣每服五十九

必漏胎

妊娠經血不時而來者名曰漏胎氣虛者四君子湯加黃芩阿膠血虛者四物湯加白朮黃芩黃連益母草主之

四君子湯

治胎漏大補氣虛○白朮錢半人參二錢

白茯苓一錢甘草錢一

右剉一刺水二盞煎八分溫

服加減見脾胃症內四物湯見前經候條下

必皺脚

婦人妊娠七八月以來胎氣漸粗兩足浮腫頭目不浮者名曰皺脚平胃散懷孕五六月兩足腫上腿膝或足指間

出黃水名曰水氣天仙藤散

平胃散

除濕行氣消腫安胎○蒼朮一斤

陳皮兩十二

厚朴兩十二

甘草六兩

末之每服二錢入鹽一捻白湯

調下或用水煎服

天仙藤散

治妊娠三月以後兩足浮腫步履艱難○天仙藤先畧炒

香附兩六兩

陳皮六兩

烏藥五兩

甘草兩四

末之每服三錢姜三片木瓜三個紫蘇三葉煎服

必子懸

妊娠至四五個月以來君相二火養胎平素有熱故胎熱氣逆胎上湊心不安胸膈脹滿名曰子懸嚴氏紫蘇飲加

炒山梔黃芩香附之類

嚴氏紫蘇飲

治胎氣不和上湊心腹脹滿疼痛○大腹皮一兩

川芎一兩

白芍藥一兩

陳皮一兩

紫蘇一兩

當歸兩

人參兩

甘草兩

每服四錢生薑三片葱白一莖水二盞煎八分服

必子淋

婦人因酒色過度內傷胞門或飲食積熱水道秘澀小便淋瀝澀痛者名曰子淋安榮散虛者六味丸或參朮飲內

熱而淋者五淋散

安榮散治妊娠小便澀少名曰子淋○麥門冬三錢

通草三錢

滑石三錢

當歸五錢

燈心五錢

甘草五錢

人參二錢 細辛二錢 〇右為細末每服二錢白湯調下。

六味丸 治妊娠因虛以致水道不通淋瀝澀痛。〇山藥二兩 熟地黃三兩 山茱萸二兩 白茯苓二兩 丹皮

參朮散 治妊娠轉胞。〇四物湯六錢加人參一錢 白朮一錢 半夏八分 陳皮八分 甘草七分 姜水煎服。

五淋散 治妊娠小便不通淋瀝澀痛。〇赤茯苓半兩 赤芍藥半兩 山梔仁半兩 生甘草半兩 當歸五錢 加黃芩五錢 每服五錢空心水煎服。

〇子產

妊娠病瘧名曰子瘧。熱多寒少者清脾飲去半夏寒多熱少者人參養胃湯去半夏虛者四獸飲或勝金丹截之。

清脾飲 治妊娠瘧疾去半夏。〇柴胡二錢 半夏一錢 黃芩一錢 白朮一錢 陳皮一錢 茯苓八分 厚朴

八分 青皮七分 草果六分 甘草四分 〇姜三片 棗二枚水煎熱服。

人參養胃湯 治妊娠瘧寒多熱少。〇人參一錢 藿香葉一錢 厚朴一錢 蒼朮一錢 米泔 茯苓二錢 陳皮

五分 草果六分 半夏八分 甘草五分 〇加烏梅一個 生薑三片 水二盞煎服。

四獸散 治孕婦虛瘧久不得愈必用此藥主之。〇人參一錢 白朮一錢 陳皮二錢 白茯苓八分 甘草五分

草果八分 半夏六分 棗子三枚 烏梅三個 生薑三片 〇水二盞煎八分溫服。

勝金丹 治婦人懷孕瘧疾不已此截之。〇川常山酒蒸 雞心檳榔一兩 〇右為細末醋糊丸如菟豆大未發前

三更時先吞三十丸至五更時再吞十五丸俱用好酒冷送下。

〇胎動

婦人胎動不安已有所見者芎歸湯加阿膠斷艾無所見者安胎飲元氣虛者加人參白朮如氣不順者本方加砂

仁大腹皮斷艾香附枳殼。

芎歸湯 一名芎藭湯。一名佛手散。〇川芎一錢 當歸一錢 〇水二盞煎八分空心服。

安胎飲 治婦人胎不安氣不利。〇紫蘇一錢 當歸身一錢 白朮一錢 條黃芩一錢 川芎八分 陳皮五分

香附六分 白芍微炒 甘草五分 大腹皮六分 砂仁炒六分 〇水煎溫服。

胎水

婦人胎孕至五六個月。腹大異常。胸腹脹滿。氣逆不安者。此胞中蓄水也。名曰胎水。若不早治之。決然生子手足軟短。形體殘疾。或生下即死。此症人多不識。鯉魚湯治之。以泄其水。

鯉魚湯

治妊娠腹大異常。若不早治。必致母子難保。○當歸酒浸三錢 白芍藥三錢 白茯苓四錢 白朮五錢 右剉二劑。用鯉魚一個。不拘大小。破去鱗腸。白水煮熟去魚。每服用魚汁盞半。生姜七片。陳皮少許。同前藥煎至一盞。空心時服。如水未盡。再令服之。

子瘡

婦人妊娠三五個月以來。忽然失音。不能言語者。名曰子瘡。歧伯曰。無治也。當十月復。乃胎氣使然。非藥可療。直待分娩後。即能自言也。

兒暈

婦人妊娠七八月以來。忽然卒倒殭仆。不知人事。頃刻即甦者。名曰兒暈。葛根湯。若氣血兩虛。因而卒倒者。八珍湯加黃芪。古見前經 候條下

葛根湯

治婦人妊娠二三個月。忽然卒倒殭仆。○葛根三錢 麻黃連節三錢 桂枝二錢 芍藥酒炒二錢 甘草炙二錢 生姜三片 棗二枚 水煎服。覆取微汗。

泄瀉

妊娠泄瀉不渴。小便清白者。三白散加砂仁厚朴蒼朮甘草。若泄瀉腸垢。小便赤澀。煩渴內熱者。黃芩湯加白朮木通茯苓。腹痛加芍藥砂仁黃連。俱炒。

三白散

治孕婦泄瀉。益氣健脾。和中養胃。○白朮炒三錢 白芍藥酒炒三錢 白茯苓錢五分 右剉作一劑。水二鍾煎至一鍾。空心溫服。黃芩湯。見崩漏條下。

痢疾

妊娠痢疾。初起腹中痛。後重裏急者。香連化滯湯。熱甚下迫窘痛。裏急者。黃芩芍藥湯。日久不止。元氣漸虛者。胃氣

湯香連丸

香連化滯湯

治孕婦積滯不行。裡急後重。頻欲上閤。○青皮錢炒一 陳皮錢炒一 厚朴姜炒一錢 枳實錢炒一 黃芩錢炒一
黃連錢炒一 當歸酒洗一錢 白芍錢炒一 滑石二錢 枳榔八分 木香五分 甘草四分 ○右剉作一劑。用

水二大盞。煎至八分。空心時溫服。

黃芩芍藥湯

治妊婦痢疾。腹瀉口渴。後重裡急之症。○白芍藥一錢 當歸二錢 黃連去脂酒炒一錢二分 黃芩二錢
肉桂四分 枳榔八分 木香六分 甘草四分 大黃生用量人虛 用水二盞。煎至一盞。溫服。

胃氣湯

治孕婦久痢。元氣虛耗。日夜頻併無度之症。○人參二錢 白朮錢半 當歸酒洗一錢 白茯苓去皮一錢 川芎一錢
肉桂四分 白芍藥一錢二分 水煎溫服。

香連丸

治妊婦痢疾。久而不已。此方主之。甚驗。○黃連許傾八碗內泡一時取出同炒去萊莢用黃連 木香四兩
火規○右俱為末。用雞子清少許。入醋糊丸。每服三錢。

二便不通

孕婦大小便不通者。乃藏府積熱所致也。四物湯方見 加枳實厚朴黃芩。若小水不通者。胞中有熱故也。冬葵子湯

冬葵子湯

治妊婦小便不利。身重惡寒。起則頭眩。○冬葵子兩半 茯苓二兩 末之。每服三錢。米湯調下。

腰痛

妊婦腰痛。最為緊要。蓋女人胞胎繫于腰。故腰痛酸急者。胞欲脫腎。必欲產也。若對閉氣不行。腰痛者。通氣散。腎虛

腰痛者。青娥不老丸。大抵要固胎為主。

通氣散

治孕婦因對閉。或氣滯。腰內疼痛。○補骨脂不拘多少 右末之。先嚼胡桃肉一個。空心溫酒調下二錢。

青娥不老丸

治妊婦因腎虛腰痛。或風寒乘之。○杜仲姜炒 破故紙炒 胡桃肉二十 右末之。蒜四兩搗爛。為丸如桐子大。每服三十九酒下。

腹痛 妊婦腹痛。須辨其寒熱虛實。寒者脈遲。理中湯加砂仁香附。熱者脈數。黃芩芍藥湯方見 加白朮桂枝。虛者。乃血滯

不能養胎。脈無力。四君子湯。方見前加炒芍藥當歸。寔者。香殼湯。大便不通。加厚朴芍藥黃芩。

理中湯。治孕婦瀉胃寒氣。腹中疝痛。必用此湯主之。○人參二錢 白朮錢半 乾姜錢半 甘草錢一

右剉一劑。生薑三片。水二大盞。煎至八分。空心服。

香殼湯。治妊娠氣不清爽。心腹脹滿或痛。為寔也。○香附錢半 枳殼錢四 末之。每服二錢。白湯送下。

心腹痛

妊娠心痛。非心痛也。乃胎氣上升所致。名曰子懸。用順氣養血安胎飲。又有客熱客寒。若客熱犯胃而痛者。二陳湯

火龍湯。治婦人妊娠心痛。因客寒邪氣犯胃而作。○艾葉五錢 鹽炒 茴香五錢 川練肉五錢 ○右剉作二劑。水二

大盞。煎至八分。空心時熱服。

草薺薺丸。治孕婦寒邪犯胃。心腹疼痛。必用此丸。○草薺錢一 薺錢四 益智仁八分 白僵蚕八分 甘草生

各三分 當歸身六分 青皮六分 去分 廣陳皮八分 人參八分 黃芪八分 吳茱萸八分 神曲四分 姜黃四分 柴胡四分

半夏五分 姜製五分 澤瀉六分 麥芽六分 桃仁七分 去分 ○右為末。蒸餅丸。如桐子大。每服三十九。白湯下。

怔忡

妊娠怔忡。脈亂驚悸不安。夜卧不寧。恍惚氣急促者。大聖散。血少神虛。心不寧者。益榮湯。火盛者。安神丸。虛而心不

寧。怔忡者。定志丸。

大聖散。治孕婦因驚而發。使心神不定。恍惚怔忡。○川芎一兩 黃芪蜜炙 當歸酒浸 木香雨一 人參去

甘草炙一 白茯苓一兩 麥門冬一兩 ○右剉一帖。每用七錢。生薑七片。水二盞。煎八分。空心服。

益榮湯。治孕婦心神不寧。怔忡驚悸。恍惚悲憂。○當歸二錢 黃芪蜜炙 遠志去心 酸棗仁炒熟 茯神去木

紫石英八分 木香八分 柏子仁炒熟 人參去 白芍藥八分 甘草炙三 ○右剉一劑。水二大鍾。生薑三

片。煎八分。空心溫服。

安神丸。抑火寧心。安神定志。妊娠患此。必用此丸。○黃連兩半 硃砂一兩 生地黃一兩 當歸身酒浸 酒俱用

甘草錢五○末之蒸餅丸如黍米大硃砂為衣

定志丸 治婦人妊娠心虛不足恍惚多忘之症○遠志去心一兩

人參去苗一兩

蒲黃 二兩

白茯苓去皮三兩

石末之蜜

九梧子大辰砂為衣每三十九米湯下

必咳嗽

妊娠咳嗽因外感風寒者參蘇飲去半夏加桑皮杏仁火乘肺金而咳嗽者二陳湯方見經候條下去半夏加黃芩黃連枳

壳桔梗貝母有痰加瓜蒌仁前胡桑白皮

參蘇飲 治孕婦外感風邪咳嗽痰涎鼻塞聲重○紫蘇葉 一錢

陳皮去白一錢

前胡 七分

白茯苓去皮七分

枳壳炒微

分以桔梗分半夏七分乾葛分人參去苗六分

甘草 四分

木香分三

○生姜三片水煎服

必中風

妊娠中風頭項強直筋攣語塞痰涎壅盛人事不省者名曰子癇羚羊角散中風筋攣強直不知人事昏悶口牽者

舉輕古拜散主之

羚羊角散

治妊娠中風頭項強直語言蹇澀○羚羊角打碎五分

川獨活分五

酸棗仁炒熟五分

五加皮 五分

薏苡仁

分五防風去苗五分

當歸酒洗五分

川芎 五分

茯神 五分

杏仁 五分

木香半二分

甘草半二分

○劉一劑水二盞煎

八分不拘時服

舉輕古拜散 治婦人胎前產後中風俱用此湯○荊芥穗焙○末之每用二錢豆淋湯調服

必傷風

妊娠傷風頭痛語塞聲重咳嗽甚至發熱者參蘇飲去半夏取微汗如肺火旺感風熱不清壅熱于肺亦有頭痛身

熱鼻塞聲重咳嗽音啞流涕之候雙解散去大黃朴硝石膏

雙解散

治孕婦一切風熱之症又名防風通聖散○防風 一錢

當歸 二錢

川芎 八分

白芍藥炒八分

薄荷分

山梔炒黑八分

黃芩炒八分

大黃量虛定用

石膏去之一錢

桔梗 八分

白朮 二錢

連翹 仁 七分

荊芥 七分

滑

石七分

麻黃分

芒硝去之五分

○右剉一劑水二盞葱白一莖煎至八分空心溫服

必傷暑

妊娠正當炎暑。忽冒暑氣。煩渴悶亂不安。香薷飲加黃連白朮人參。或十味香薷飲。渴甚熱極者。加麥冬五味子石膏黃芩知母天花粉。

香薷飲 治孕婦傷暑。渴悶不安。身熱煩燥之症。○香薷二錢 白扁豆一錢 厚朴炒一錢 甘草五分 右剉一劑。

水二盞。煎至八分。冷服。或加黃連一錢。

十味香薷飲 治妊娠中暑。益氣和中。安胎保孕。○香薷一錢 扁豆八分 白朮八分 茯苓八分 陳皮八分 厚朴一錢 甘草五分

厚朴一錢 甘草五分 木瓜五分 人參六分 黃芪七分 水二鍾。煎八分。冷服。

必傷食

妊娠傷食。胸滿脇痛。脈右手寸口緊盛。枳朮湯加山查麥芽神曲黃連厚朴。如傷冷物而胸膈劣悶。欲吐脈遲。本方加砂仁木香丁香。嘔吐加生薑。

枳朮湯 治孕婦飲食過度。致傷胃氣。胸膈膨脹。○木香六分 陳皮八分 檳榔八分 桔梗七分 甘草五分 白朮炒三 紫蘇葉六分 五靈脂炒一錢 肉桂五分 半夏姜製七分 白茯苓六分 枳殼炒八分 右剉一劑。水二鍾。姜三片。煎八分。空心服。

必安胎

婦人內原有熱。繼而受孕。以致內火旺盛。胎氣不安。丹溪安胎丸。氣血虛而不能營養。胎氣不安者。紫蘇飲。方見前

加砂仁枳殼木香行其氣。

安胎丸 妊娠四五月。常墮不安。內熱甚故也。○白朮二兩 沈水黃芩二兩 末之。粥丸。下五十丸。

必束胎

妊娠七八月以來。胎肥大者。宜束其胎。達生散。若奉養太過。安逸之人。膏粱身肥。胎又不運。必然難產。須服瘦胎散。氣不運動者。枳殼散。

達生散 又名束胎散。至八個月服十數帖。甚效。○大腹皮三錢 白朮炒一錢 白芍藥一錢 紫蘇莖葉八分

人參五分 陳皮五分 甘草五分 當歸酒洗二分 右剉一劑。加葱五莖。黃楊腦七個。水二鍾煎服。春加川芎。夏

加黃芩。秋冬加砂仁枳殼。瘦胎散。奉養太過。以致胎肥。預服此藥。可使易產。○血餘即髮灰錢半 當歸酒洗一錢 川芎一錢 白芍藥一錢

木香一錢 甘草一錢 枳殼錢炒一 乳香五分另研 水二鍾煎八分。食前溫服。

枳殼散。瘦胎抑氣易產。凡有孕婦肥胖者。宜預服之。○枳殼炒四兩 甘草二兩 末之。湯調食前服。

胎寒

婦人懷孕。不守禁忌。縱恣口腹。過食生冷。瓜桃梨果。及當風取涼。以致胎冷不安。胸腹脹滿。或痛。腸中虛鳴。胎孕冷

伏。四肢拘急。使泄欲死。安胎和氣飲主之。

安胎和氣散。治孕婦過食生冷。當風取涼。胎寒之症。○訶子炒一錢 白朮炒各三錢 陳皮五分 良姜炒一錢五分 木香

五錢 白芍藥一錢 陳米錢半 甘草五分 右剉一劑。水二大盞煎至八分。加姜汁三匙。熱服。

胎熱

妊娠將及臨月。兩眼失明。不見燈火。頭痛暈。腮頰腫。不能轉項。此肝經熱毒上攻。乃是姜椒熱酒。葷腥炙燂。熱積于

中也。消風散。天門冬飲或四物湯 加荆芥防風黃連黃芩。

消風散。治婦人妊娠。多食辛辣厚味之物。此湯主之。○荆芥穗一兩 甘草一兩 川芎一兩 羌活一兩 人參

去一兩 茯苓去皮一兩 僵蚕炒一兩 防風一兩 藿香葉一兩 蟬蛻炒一兩 陳皮一兩 厚朴一兩 白芍藥一兩 右為末

每服二錢。荆芥湯或茶湯調下。

天門冬飲。治妊娠蘊熱。忽然兩目失明。內熱煩燥。○天門冬二分 知母二分 益母草子二分 五味子一錢

白茯苓一錢 羌活一錢 人參一錢 防風一錢 水二盞煎一盞溫服。

傷胎

婦人因頓仆腰腹疼。或胎上搶心。去血腹痛。阿膠斷艾丸。妊娠從高墜下。或為重物所壓。觸動胎氣。腹痛下血。胃虛

嘔逆。縮砂仁二錢炒為末。酒調下。或佛手散。即胎動條內

明醫指掌

卷九

阿膠斷艾丸

即四物湯。加阿膠炒一錢。艾葉炒一錢。甘草炙一錢。作一劑。水二盞。酒半盞。煎一盞。空心熱服。

必死胎

婦人舌青黑。及胎上冷者。子已死。或指甲青。脹悶甚者。口中作屎臭。先以平胃散方見前散投朴硝半兩。酒與水各半鍾煎服。如胎化血水下。鹿角散下死胎。

鹿角散 治孕婦因傷寒熱病。以致胎死腹中。○鹿角屑一兩。入葱豉煎服。

必傷寒

妊娠外感寒邪。頭痛身熱無汗。輕則參蘇飲方見前去半夏。重則十神湯汗之。汗後熱不解者。黃龍湯。若胸滿嘔逆口苦。或寒熱往來。本方加枳殼桔梗。發熱無汗。不得汗。本方加乾葛。煩渴再加天花粉。胸滿加枳殼黃連。如自汗身熱煩渴。唇焦舌燥。謔語。人參白虎湯。大熱煩渴。錯語呻吟。乾嘔。黃連解毒湯。熱甚不退。胎動不安者。單胎散。如五六日不解。大便不通。不惡寒反惡熱。或日晡潮熱。微惡寒者。大柴胡湯去半夏。服後仍不通。煩熱感甚。小承氣湯。如六七日汗下後不解。病傳陰分。手足冷而脈細小者。理中湯加人參。

十神湯 發散瘟疫。及時感風寒。○川芎一錢 甘草七分 麻黃去節一錢 紫蘇一錢 升麻八分

赤芍藥八分 白芷一錢 陳皮八分 香附一錢 右剉一劑。生薑三片。葱白三枚。水煎熱服。取微汗。

黃龍湯 治妊娠及新產後傷寒。和解退熱之藥。○柴胡二錢 黃芩五分一錢 人參一錢 甘草五分 ○右剉作一劑。

生薑三片。水二盞。煎一盞。空心熱服。

人參白虎湯 治妊娠傷寒。身熱自汗。煩渴唇焦。○石膏五錢 知母二錢 人參一錢 甘草一錢 ○右剉一劑。加

粳米一撮。水二盞。煎八分。不拘時服。

黃連解毒湯 治傷寒大熱煩渴。錯語呻吟。乾嘔。○黃連炒二錢 黃芩炒一錢 山梔子炒一錢 黃蘗炒一錢 ○右剉一劑。水

二盞。煎八分。溫服。

大柴胡湯 治孕婦傷寒。陽明症六七日。大便難。帶表。○柴胡二錢 黃芩一錢 半夏一錢 白芍藥八分 枳實炒一錢 芍藥炒一錢 右剉一劑。姜三片。棗二枚。水二盞。煎八分。溫服。

大黃