

巢氏病源



重刊巢氏諸病源候總論卷三十一

癭瘤等病諸候

凡十五論

癭候

癭者由憂恚氣結所生亦曰飲沙冰沙隨氣入於脈搏頸下而成之初作與癭核相似而當頸下也皮寬不急垂槌槌然是也恚氣結成癭者但垂核槌槌無脈也飲沙水成癭者有核癭癭無根浮動在皮中又云有三種癭有血癭可破之有息肉癭可割之有氣癭可具針之

養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令人作癭

病動氣增患

癩候

癩者皮中忽腫起初梅李大漸長大不痛不痒又不結強言癩結不散謂之爲癩不治乃至壘大則不復消不能殺人亦慎不可輒破

腦濕候

腦濕謂頭上忽生肉如角謂之腦濕言腦濕氣濕蒸衝擊所生也

黑痣候

黑痣者風邪搏於血氣變化生也夫人血氣充盛則皮膚潤悅不生疵瘕若虛損則黑痣變生然黑痣者是風邪變其血氣所生也若生而有之者非藥可治面及體生黑點爲黑痣亦云黑子

赤疵候

面及身體皮肉變赤與肉色不同或如手大或如錢大亦無痒痛謂之赤疵此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也

白癩候

白癩者面及頸項身體皮肉色變白與肉色不同亦不痒痛謂

身且精流
卷三十一
二
之白癩此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也

癩瘍候

癩瘍者人頸邊有曾前掖下自然斑剝點相連色微白而圓亦有烏色者亦無痛痒謂之癩瘍風此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也

疣目候

疣目者人手足邊忽生如豆或如結筋或五個或十個相連肌裏粗強於血謂之疣目此亦是風邪搏於肌肉而變生也

鼠乳候



鼠乳者身面忽生肉如鼠乳之狀謂之鼠乳也此亦是風邪搏於肌肉而變生也

多忘候

多忘者心虛也心主血脈而藏於神若風邪乘於血氣使陰陽不和時相并隔乍虛乍實血氣相亂致心神虛損而多忘養生方云丈夫頭勿北首臥神魂不安多愁忘

嗜眠候

嗜眠者由人有腸胃大皮膚澀者則令分肉不開解其氣行則於陰而遲畱其陽氣不精神明爽昏塞故令嗜眠其湯熨針石

別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云踦踞交兩手內並腳中入且兩手急引之愈
久寐精氣不明交腳踦踞凡故言踦踞以兩手從內屈腳中入
左手從右跌跪上入左足隨孔下右手從左足跪上入右足隨
孔下出抱兩腳急引兩手極引二通愈久寐精神不明久行則
不睡長精明

又云一手拓頰向上極勢一手向後長舒急努四方顯乎當一
時俱極勢四七左右換手皆然拓頰手兩向共頭欹側身二
七去臂膊風眠睡尋用永吉日康

鼾眠候

鼾眠者眠裏喉咽間有聲也人喉嚨氣上下也氣血若調雖寤寐不妨宣暢氣有不和則衝擊喉咽而作聲也其有肥人眼作聲者但肥人氣血沈厚迫隘喉間澀而不利亦作聲

體臭候

人有體氣不和使精液雜穢故令身體臭也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方云以手掩口鼻臨目微氣久許時手中生液速以手摩面日常行之使人體香

狐臭候

人腋下臭如葱豉之氣者亦言如狐狸之氣者故謂之狐臭此皆血氣不和蘊積故氣臭

漏腋候

腋下常濕仍臭生瘡謂之漏腋此亦是血氣不和爲風邪所搏津液蘊瘀故令濕臭

丹毒病諸候

凡十三論

丹候

丹者人身體忽然焮赤如丹塗之狀故謂之丹或發手足或發

腹上如手掌大皆風熱惡毒所爲重者亦有疽之類不急治則痛不可堪久乃壞爛去膿血數升若發於節間便之四支毒入腸則殺人小兒得之最忌

白丹候

白丹者初發痒痛微虛腫如吹軫軫起不痛不赤而白色由挾風冷故使色白也

黑丹候

黑丹者初發亦痒痛或燥腫起微黑色由挾風冷故色黑也

赤丹候

赤丹者初發軫起大者如連錢小者如麻豆肉上粟如鷄冠肌理由風毒之腫故使赤也亦名茱萸丹

丹軫候

丹軫者肉色不變又不熱但起隱軫相連而微痒故謂爲丹軫也

室火丹候

室火丹候初發時必在腓腸如指大長三二寸瘦色赤而熱是也

天竈火丹候



天竈火丹發時必在於兩股裏漸引至陰頭而赤腫是也

廢竈火丹候

廢竈火丹發時必在足趺上而皮色赤者是也

尿竈火丹候

尿竈火丹發於胃腹及臍連陰頭皆赤是也

燍火丹候

燍火丹者發於臂亦在於背皮色赤是也

癘火丹候

癘火丹者發於脾而散走無常處著皮赤是也



螢火丹候

螢火丹者發於髀至脅皮赤是也

石火丹候

石火丹者發通身似纈目突如粟是也皮色青黑

腫病諸候

凡十七論

諸腫候

腫之生也皆由風邪寒熱毒氣客於經絡使血澀不通壅結皆成腫也其風邪不作者腫無頭無根浮在皮上如吹之狀也不赤不痛或腫或散不常腫其寒氣與血相搏作者有頭有根色

赤腫痛其熱毒作者亦無正頭但急腫久不消熱氣結盛壅則爲膿其候非一故謂之諸腫

風腫候

凡人忽發腫或著四支或在胷背或著頭項水牢如畔大虛腫
回回如吹之狀不痛不赤著四支者乃欲不遂令人煩滿短氣
身體寒冷皆由冬月遇溫風入人肌裏至春復適大寒風不得
出氣壅肌間不自覺至夏取風涼濕氣聚不散而成腫久不瘥
氣結盛生熱乃化爲膿血並皆爛敗則殺人右手關上脈浮而
虛者病腫



卒風腫候

人卒有腫不痛不赤移無常處而兼痒由先無患偶腠理虛而逢風所作也

風毒腫候

風毒腫者其先赤痛飈熱腫上生癩漿如火灼是也

毒腫候

毒腫之候與風腫不殊時令人吐熱其邪毒甚者入腹殺人

毒腫入腹候

此候與前毒腫不殊但言腫熱不盛入腹故也毒入腹之時先

令人勑嗇惡寒心煩悶而嘔逆氣急而腹滿如此者殺人

惡核腫候

惡核者內裏忽有核累累如梅李小如豆粒皮肉燥痛左右走身中卒然而起此風邪挾毒所成其亦似射工毒初得無常處多惻惻痛不卽治毒入腹煩悶惡寒卽殺人久不瘥則變作瘦

腫核候

凡腫挾風冷則不消而結成核也

氣腫候

氣腫者其狀如癰無頭虛腫色不變皮上急痛手纔著便卽痛



此風邪搏於氣所生也

氣痛候

人身忽然有一處痛如打不可堪耐亦乍走身間發作有時痛發則小熱痛靜便如冰霜所加故云氣痛亦由體虛受風邪所侵遇寒氣而折之邪氣不出故

惡脈候

惡脈者身裏忽有赤絡脈起龍嵒聚如死蚯蚓狀看如似有水在脈中長短皆逐其絡脈所生是也由春冬受惡風入絡脈中其血瘀結所生久不瘥緣脈結而成瘦