

醫宗秘髓 卷六

花溪老人虞

搏天民輿

錢塘徐開光振公校

靜觀居士程

林雲來閱

海昌陳彛則子奇訂

諸氣証 三十六

經曰百病皆生於氣。是氣也。在外則衛護皮毛充實。腠理在內則導引血脉調和。陰陽周流。一身運行不息。源出中焦。總統於肺。曷常病於人也。惟夫七情之交攻五志之間發。於是爲冷氣滯氣逆氣上氣之諸

症作焉。其原皆由於肺受火邪。氣得上升之化。有升
無降。河間所謂五志過極。卽爲火。丹溪所謂氣有餘
便是火也。治之之法。當分有餘不足。治之有餘者邪。
氣有餘也。宜行之不足者正氣不足也。宜補之。冷氣
宜溫之。必明知身受寒氣。口食冷物。方作冷治。如病
人自覺冷氣從下而上。此上升之氣。自肝而出。中挾
相火。自下而上。其熱爲甚。乃火極似水。陽亢陰微。非
真冷也。氣滯宜開之。氣上宜降之。氣在胸臆爲痞滿。

刺痛伏梁等証。二陳加黃連、枳實、桔梗、瓜蒌仁、木香。
氣在下焦爲奔豚七疝等症。二陳加桃仁、山查、橘核。
茴香、川練、荔枝。氣在兩脇攻築作痛。二陳加青皮、白
芍、柴胡、胆草。氣在中焦爲痞滿脹急。二陳加木香、枳
榔、厚朴、枳殼。或平胃散以平其敦阜之氣。惟婦人胎
前產後一切氣疾。但用四物湯爲主。加疏利行氣藥。
大抵男子屬陽。得氣易散。是以男子之氣病常少。治
宜調氣以養血。女人屬陰。遇氣多鬱。故女人之氣病

常多。治宜調血以和其氣。此治氣之大旨也。又按人
身上有七氣。宗氣。榮氣。衛氣。中氣。元氣。精神。冲和之
氣。上升之氣。惟宗氣尤爲一身之主。起自氣海。下一
寸五分。上出於胃。輸散於五臟六腑。若宗氣不虛。雖
病不死。凡病人危篤之甚。而喘息奔急者。是宗氣將
絕。有出而無入也。

脉經曰。脉滑者多血。少氣。濇者少血。多氣。大者血氣
俱多。脉來大而堅者。血氣俱實。小者血氣俱少。脉

來細而緩者血氣俱虛。代者氣衰。細者氣少。
浮而絕者氣欲絕。辟大而滑中有短氣。尺脈濇
而堅爲血虛。氣實尺脈細而微血氣俱不足也。
劉立之曰下手脈沉便知是氣。沉極則伏。濇弱難
知其或沉滑氣兼痰飲病也。

[illegible]

諸氣方

清膈丸

治濕熱氣滯

黃芩

黃連

五錢

香附

一兩五錢

蒼朮

二兩

右末用瓜蒌仁搗爛如泥和丸梧子大白湯下

三四十丸

正氣天香散

治婦人一切諸氣作痛

烏藥

一錢五分

香附

二錢

陳皮

紫蘇

乾姜

二錢

木香檳榔丸

見痢

藟子降氣湯 治氣不升降痰涎壅塞作痛

當歸

前胡

厚朴

炙甘草

五分

肉桂

三分

陳皮

七分

半夏

藟子

一錢

加姜

煎服

一陳隨症加減

治諸氣

方見証內

平胃散

見

平乾阜之氣

四物湯

見中風

治婦人胎前產後

一切氣痰作

本方加肅利行氣

反壯方

治諸氣作痛并小腸氣痛惟婦人不可服

流番

檀香

乳香

去油

丁香

廣木香

一錢

麝香

三分

透明硃砂二錢用甘草湯煮過研極細末飛去

黃土以一錢為衣蜜丸菜豆大每用一丸噙舌

上化下隨氣上下用

土外不調度主不調

黃土以一粒得木家大飛且大飛與一木命而

要即本何二矣出日中故道也此通明力

觀

三

觀

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

疝氣証

三十七

疝有七症○寒水筋血氣○狐癰○專主肝經○與腎經無干○
子和七疝辨之詳悉○但一例施以攻下之法○其言非
是○古方自素問而下○皆以爲寒○以寒主收引○經絡得
寒○則收而不行○所以作痛○東垣丹溪獨斷以爲濕熱
在經○鬱而至久○又得寒氣外來○不得疏散○是以作痛○
此發前人所未發○故治法宜祛逐本經之濕熱消導
下焦之瘀血○而以寒因熱用之法○立方處治其濕熱

又當分多寡而治。濕則腫多。癰亦是也。又有因痰飲
食積死血鬱結爲痛。及因水氣作腫者。亦有挾虛而
發者。其脉沉緊而豁大無力是也。當以參朮爲主。佐
以疏導藥。

七疝見証

寒疝者。囊冷堅硬如石。陰莖不舉。或控睪丸而痛。得
之於坐卧濕地。或寒月涉水。或值雨雪。或坐卧磚石
或風冷處。使內行房久而無子。宜用溫劑。

水疝者腎囊腫痛陰汗時出或囊腫狀如水晶或癢而搔出黃水或小腹按之作水聲得之於飲水醉酒使內勞汗出而遇風寒濕之氣聚囊中故水冷令人爲水疝宜當逐水

筋疝者陰莖腫脹或潰而爲濃裏急筋縮或莖中作痛痛極則癢或挺縱不收或出白物如精隨溺而下得之於房術勞傷及邪術所使宜降心火血疝者狀如黃瓜在少腹兩傍橫骨兩端約紋中俗

名便癰得之重感春夏大燠勞於使內氣血流溢滲入腠囊留而不去結成癰腫膿少血多宜用和血之劑

氣疝者其狀上連腎脬下及陰囊多得於號泣忿怒而脹則氣鬱致然號泣怒罷卽氣散者是也宜用散氣之劑或小兒亦有此疾俗名偏墜得之於父年老或少年多病陰痿精怯強方入房因而有子稟胎病也此症難愈

如狐者狀如仰瓦卧則入少腹行立則出復入囊
如狐晝出穴而溺夜入穴而不溺此病出入往來上
下正與狐相類也亦與氣疝大同小異宜用逐氣流
經之劑

癰疔者其狀陰囊大如升斗不癢不痛是也得於地
氣卑濕故江淮之間多有之宜用去濕之劑女子陰
戶凸出雖亦此類乃熱則不禁故也不可便認爲虛
寒而溫之補之本名曰瘕宜以苦藥下之以苦堅之

金匱要畧曰寸口脉弦弦則衛氣不行則惡寒緊則不欲食緊弦相搏則爲寒疝跌陽脉浮而遲浮則爲風虛遲則爲寒疝繞臍作痛發則自汗出手足厥寒其脉沉弦者烏頭湯主之

疝氣方

治疝通用加減効方

川練子 一錢

青皮

玄胡

橘子

八分

陳皮

小茴

柴胡

七分

胆草

黃柏

山查

神麴

五分

荔枝

二個打碎

加姜一片

失疝加吳萸

一錢

烏頭

八分

去黃柏

水疝加猪苓澤瀉蒼朮荔枝核

疝氣