

景岳全書卷之二十六必集

雜證謨

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

頭痛

經義

五藏生成篇曰頭痛顛疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入
腎○心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰

經脉篇曰膀胱足太陽也是動則病衝頭痛目似脫項如拔

脉解篇曰陽明並於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹
腫也

通評虛實論曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也

著至教論曰三陽獨至者是三陽並至並至如風雨上爲巔疾
下爲漏病

脉要精微論曰來疾去徐上實下虛爲厥巔疾○推而下之下
而不上頭項也

平人氣象論曰寸口之脉中手短者曰頭痛

脉要精微論曰厥成爲巔疾○顛痛刺手陽明與顛之盛脉出

血○顱痛刺足陽明曲周動脈見血立已不已按人迎於經立已○項痛不可俛仰刺足太陽不可以顧刺手太陽也

寒熱病篇曰陽迎頭痛胸滿不得息取之人迎○足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項中兩筋間

雜病篇曰厥挾脊而痛者至頂頭沈沈然目眈眈然腰脊強取足太陽腦中血絡

奇病論帝曰人有病頭痛以數歲不已此安得之名爲何病岐伯曰當有所犯內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒

亦痛病名曰厥逆帝曰善

厥病篇曰真頭痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治

論證 共二條

凡診頭痛者當先審久暫次辨表裏蓋暫痛者必因邪氣久病者必兼元氣以暫病言之則有表邪者此風寒外襲於經也治宜疎散最忌清降有裏邪者此三陽之火熾於內也治宜清降最忌升散此治邪之法也其有久病者則或發或愈或以表虛者微感則發或以陽勝者微熱則發或以水虧於下而虛火乘之則發或以陽虛於上而陰寒勝之則發所以暫

病者當重邪氣久病者當重元氣此固其大綱也然亦有暫
病而虛者久病而實者又當因脉因證而詳辨之不可執也
一頭痛有各經之辨凡外感頭痛當察三陽厥陰蓋三陽之脉
俱上頭厥陰之脉亦會於巔故仲景傷寒論則惟三陽有頭
痛厥陰亦有頭痛而太陰少陰則無之其於辨之之法則頭
腦額顳雖三陽俱有所會無不可痛然太陽在後陽明在前
少陽在側此又各有所主亦外感之所當辨也○至若內傷
頭痛則不得以三陽爲拘矣如本經所言下虛上實過在足
少陰巨陽若厥病篇所論則足六經及手少陰少陽皆有之

矣奇病論曰腦者陰也髓者骨之克也凡痛在腦者豈非少陰之病乎此內證外證之異所不可不察也

厥病篇義
詳類經

論治 共五條

一外感頭痛自有表證可察蓋其身必寒熱脉必緊數或多清涕或兼咳嗽或兼脊背痠痛或兼項強不可以左右顧是皆寒邪在經而然散去寒邪其痛自止如川芎細辛蔓荊子柴胡之類皆最宜也若寒之甚者宜麻黃桂枝生薑蔥白紫蘓白芷之類隨其虛實而加減用之

一火邪頭痛者雖各經皆有火證而獨惟陽明爲最正以陽明

胃火盛於頭面而直達頭維故其痛必甚其脉必洪其證必
多內熱其或頭腦振振痛而兼脹而絕無表邪者必火邪也
欲治陽明之火無如白虎湯加澤瀉木通生地麥冬之類以
抑其至高之勢其效最速至若他經之火則芍藥天花苓連
知栢龍膽梔子之類無不可擇而用之但治火之法不宜佐
以升散蓋外邪之火可散而去內鬱之火得升而愈熾矣此
爲忌也

一陰虛頭痛卽血虛之屬也凡久病者多有之其證多因水虧
所以虛火易動火動則痛必兼煩熱內熱等證治宜壯水爲

主當用滋陰八味煎加減一陰煎玉女煎之類主之○火微者宜六味地黃丸四物湯三陰煎左歸飲之類主之

一陽虛頭痛卽氣虛之屬也亦久病者有之其證必戚戚悠悠或羞明或畏寒或倦怠或食飲不甘脉必微細頭必沉沉遇陰則痛逢寒亦痛是皆陽虛陰勝而然治宜扶陽爲主如理陰煎理中湯十全大補湯補中益氣湯之類皆可擇用或以五福飲五君子煎加川芎細辛蔓荊子之類以升達陽氣則最善之治也

一痰厥頭痛諸古方書皆有此名目然以余論之則必別有所

因但以頭痛而兼痰者有之未必因痰頭痛也故兼痰者必
見嘔惡胸滿脇脹或欬嗽氣粗多痰此則不得不兼痰治之
宜二陳湯六安煎和胃飲平胃散加川芎細辛蔓荊子之類
主之○如多痰兼火者宜用清膈煎或二陳湯六安煎加黃
芩天花粉之類主之火甚者加石膏亦可○如多痰兼虛而
頭痛者宜金水六君煎或六君子湯加芎辛之類酌而用之
○東垣治痰厥頭痛惡心煩悶頭旋眼黑氣短促上喘無力
懶言心神顛倒目不能開如在風雲中頭苦痛如裂身重如
山四肢厥冷不得安卧如范天驥之妻因兩次下之而致頭

痛者用半夏白朮天麻湯

述古 共三條

活人書云頭痛者陽證也太陽證頭痛發熱惡寒無汗麻黃湯
有汗桂枝湯若已發汗未發汗頭痛如破者連翹蔥白湯不
止者葛根蔥白湯○陽明證頭痛不惡寒反惡熱胃實也調
胃承氣湯○少陽頭痛小柴胡湯○太陰少陰並無頭痛之
證○仲景只有厥陰一證吳茱萸湯

東垣曰金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣
者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內

皆上額交巔上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽有餘則瀉不足則補汗之則愈此傷寒頭痛也○頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也○心煩頭痛者病在耳中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也○如氣上不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也○如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也○有真頭痛者甚則腦

盡痛手足寒至節死不治○有厥逆頭痛者所犯大寒內至
骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛○凡頭痛每以
風藥治之者總其大體而言之也高巔之上惟風可到故味
之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異
○故太陽頭痛惡風脉浮緊川芎薑活獨活麻黃之類爲主
○陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實者升麻葛根白芷
爲主○少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡爲主○太陰頭
痛必有痰疾體重或腹痛爲痰癖其脉沉緩蒼朮半夏南星
爲主○少陰頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥

其脉沉細麻黃附子細辛爲主○厥陰頭項痛或吐痰沫厥
冷其脉浮緩吳茱萸湯主之○血虛頭痛當歸川芎爲主○
氣虛頭痛人參黃芪爲主○氣血俱虛頭痛調中益氣湯少
加川芎蔓荊子細辛其效如神○半夏白朮天麻湯治痰厥
頭痛藥也○清空膏乃風濕熱頭痛藥也○薑活附子治厥
陰頭痛藥也○如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治○
先師嘗病頭痛發時兩頰青黃眩運目不欲閉懶言身體沉
重兀兀欲吐潔古曰此厥陰太陰合病名曰風痰以局方玉
壺丸治之更炙俠谿穴卽愈是知方者體也法者用也徒執

體而不知用者弊體用不失可謂上工矣

立齋曰久頭痛多主於痰痛甚者乃風毒上攻有血虛者有諸經氣滯者有氣虛者有四氣外傷者有勞役所傷者有可吐者有可下者當分虛實寒熱兼變而治之若夫偏正頭風久而不愈乃內挾痰涎風火鬱遏經絡氣血壅滯甚則目昏緊小二便秘澁宜砭出其血以開鬱解表余嘗治尚寶劉毅齋但怒則兩太陽作痛先用小柴胡加茯苓山梔子後用六味丸以生腎水而再不發○譚侍御每頭痛必吐清水不拘冬夏喫薑便止余作中氣虛寒用六君子當歸黃芪炮薑而瘥

○商儀部勞則頭痛余作陽虛不能上升以補中益氣湯加
蔓荊子而痊

簡易方

硝石散

治風寒入腦頭痛不可當

因九七

一方 用生蘿蔔汁仰臥注兩鼻孔數年之患一注即愈

灸法

神庭

上星

後頂

百會

風池

以上諸穴隨灸一處可愈

頭痛論列方

麻黃湯 散一

桂枝湯 散九

葛根葱白湯 散三二

白虎湯 寒二

四物湯 補八

蓮鬚葱白湯 散三三

平胃散 和十七

和胃飲 新和五

補中益氣湯 補三二

二陳湯 和一

六安煎 新和二

十全大補湯 補二十

五福飲 新補六

玉女煎 新寒十二

小柴胡湯 散十九

六味地黃湯 補一二二

清膈煎 新寒九

理中湯 熱一

五君子煎 新熱六

滋陰八味煎 新寒十七

理陰煎 新熱三

六君子湯 補五

加減一陰煎 新補九

三陰煎 新補十二

吳茱萸湯 熱一三八

金水六君煎 新和一

左歸飲 新補二

羌活附子湯 熱三五

局方玉壺丸 和百五

調中益氣湯 補三二

調胃承氣湯 攻三

半夏白朮天麻湯 和十五

論外用備方

川芎散 散六二
頭風

川芎散 散六三
風熱